

Fondazione Diabete To
Museo del Diabete
Libri Antichi
50

30
15



B323

PHARMACOPŒA TAURINENSIS

Nunc primum edita

J U S S U

AUGUSTISSIMI REGIS.



AUGUSTÆ TAURINORUM. M. DCCXXXVI.

In Ædibus Academicis, apud Joannem-Baptistam Chais
Typographum Regium.

THE NATIONAL GEOGRAPHIC

MAGAZINE

FOR THE PEOPLE

VOLUME 1

NUMBER 1

1890



WILLIAM MORRIS

NEW YORK

1890



AUCTORUM PRÆFATIO



*Uamquam Medicinalis Codicis editionem, quem Taurinenses Pharmacopœi, caterique in hac regione universa sequerentur, utilissimam ac prope necessariam fore majores nostri existimaverint; tamen, cum ejusmodi magnum ac perdifficile opus esse animadverterent, posteris id omnino relinquendum putarunt. Nos etiam in ea dudum cogitatione versati, eademque rei difficultate absterri sumus; Et, quam multorum sæpe consilij impulsu refugimus provinciam, jubente demum AUGUSTISSIMO REGE suscepimus. Qui enim medicamentarios codices eos tradunt in manus hominum, unde arbitrio suo arripiat quisque quod velit; rem minime arduam aggre-
di, unumque Scriptoribus commune discrimen
subi-*

P R Æ F A T I O :

*subire videntur. Tales vero officinalia pharmaca
seligendi, preparandi, & una commiscendi ratio-
nes, tamquam leges, constituere, quibus observan-
dis astringi omnes debeant, qui artem eam profiten-
tur; hoc multi sane consilij, & laboris, idemque
plenum periculi negotium est. Plurima nos quidem
ex ijs medicamentis, quorum antiquus & frequens
hic usus esset, nihil temere immutantes, retinere stu-
duimus; vana quædam & inania, vel noxia reje-
cimus; alia ab optimis Medicis commendata addi-
dimus; insuper tum Galenica, ut ajunt, tum chy-
mica conficiendi brevem rectamque viam docere;
atque omnia denique ad certum quemdam ordinem
redigere conati sumus: quæ utinam Doctorum &
experientium virorum judicio probentur. Sed quan-
do hac provide considerateque acta esse videantur,
qui fieri tandem potest, ut eorum vitemus convicia,
qui copiam, & quasi silvam multiplicium rerum
mixture, varietateque confertissimam requirant?
qua nihil ad morbos humani corporis innumerabiles,
tamque inter se dissimiles utilius, nihil commodius
esse arbitrentur. Sint aliqua licet in compositis phar-
macis, quorum inopiam immerito reprehenderint;
plura hi nihilominus in Sirupis, Electuarijs, Pulve-
ribus, Pilulis, Trochiscis, & reliquo genere toto de-
side-*

P R Æ F A T I O.

siderabunt. Hos autem, si qui sunt, ex quorum animis tam penitus insita opinio evelli non queat, ad Pharmaceuticas Bibliothecas, & amplissima quædam Dispensatoria, vel Antidotaria, ut vocant, vetera & nova mittamus. Quid, si alij e contrario vel nimia in hunc librum nos contulisse dicant? quippe qui diuturna experientia noverint perpaucis, delectisque remedijs feliciter percurari ægros & convalescere. Profecto inutilia quæcumque nobis visa essent, in communi tamen existimatione, usuque posita, non prorsus omnia abiecimus. Ecquis vero ea funditus tollere, tantaque hujus credulitatis errorem ab hominum mentibus depellere umquam potuit? Neque ætate nostra, qui renovandis Pharmacopœis sapientes doctissimique viri operam dedere, eadem repudianda omnino esse censuerunt. Ac talia demum innocua fere medicamenta sunt, quæ propter nominis aut usus antiquissimi auctoritatem hic retinenda duximus; vel tantummodo commemoravimus, & ad proprias classes idcirco retulimus, ut eadem, si quis usurpare aliquando velit, componendi normam in promptu habeat. Atque hæc in primis, quemadmodum tradidimus, non magno opere sumptuque comparantur, ut inanes quædam Aquæ stillatitiæ, quæ pro veteri consuetudine frequentius adhi-

hi-


P R Æ F A T I O.

hibentur. Ex simplicibus quoque litterarum ordine distributis in prima parte Operis non pauca sunt, quibus certe quidem carere possumus; sed omnium, quæ in medicinalibus numerantur, utilis cognitio est. Itaque synonyma, quibus opus esset, passim adjecimus; tum plerisque exteris eas notas, quibus sincera & optima a pravis falsisque discernantur: quod junioribus saltem Pharmacopœis percommodum fore arbitramur. Porro Simplicibus nonnullis, ad præcavendos errores, apposita dosis est, non ea quidem summa, sed quæ adulto homini fere conveniat; itemque Compositis, consueta licet dosis maneat ijs etiam, quorum ratio utcumque immutata est; ne Pilulis quidem exceptis, in quibus vini spiritum, quominus mucorem ex vetustate contrahant, in sirupi locum subrogavimus.

De ceteris, quæ hic admonenda esse videntur, nimis longum est singulatim dicere, minimeque necessarium. Etenim, cur, alijs medicamentis posthabitis, alia recepinus; cur in his preparandis & componendis a vulgari more nonnumquam defleximus, facile intelliget quisquis medicinalium rerum peritus ad hunc Commentarium attente perlegendum accesserit. Idemque erratis veniam eo libentius dabit, quod nunc primum difficile hoc opus edendum nec
spon-

P R Æ F A T I O :

Sponte nec ambitiose suscepimus . Nostriſ autem imitanda poſteris exterarum nationum exempla relinquimus , apud quas antiqui Codices ejuſmodi ſemel ac ſæpius correcti auctioresque in lucem prodierunt . Quamquam noſtrorum quidem hominum cura operaque hunc longe meliorem , utilioremque patriæ , nihilo tamen ampliorem auguramur .



Appra-


*Approbatio Taurinensis Medicorum Collegii
deprompta ex Actis ejusdem
Die XXII. Mart. MDCCXXXVI.*

CUM ex mandato Collegii Doctores quattuor de-
lecti *Pharmacopæam Taurinensem* diligenter reco-
gnoverint; iidem Medicamentorum tum Simplicium,
tum compositorum accuratam descriptionem, atque
eadem præparandi facilem utilemque normam in so-
lemni Doctorum conventu commendarunt. Quapro-
pter hujus Operis editionem, quod ab omnibus jam-
diu expetitur, cunctis suffragiis Collegium appro-
bavit.

Papanti.

V. Fantonus Med. Fac. Præses.

Se ne permette la stampa :
Morozzo per S. E. il Sig. Marchese Zoppi Gran Canc:



PHARMACOPŒÆ TAURINENSIS PARS PRIMA,

*In qua Simplicia cujusque generis Medicamenta
litterarum ordine servato recensentur: Peregrina
insuper ex precipuis eorumdem notis pleraque
describuntur.*

A



BIETIS rubræ Coni, & Resina.

ABROTONUM mas angustifolium
majus,

Abrotonum vulgare.

ABSINTHIUM Ponticum latifolium,
seu Romanum Officin.

Absinthium vulgare majus.

ABSINTHIUM Ponticum tenuifolium incanum.

ABSINTHIUM Alpinum candidum humile,
Vulgo Genepi.

A

ACACIA

ACACIA vera, seu Ægyptia

Succus è fructu immaturo Spinæ Ægyptiæ expres-
sus, & densatus, ponderosus, compactus, luci-
dus, coloris rufi, saporis austeri. Hæc autem Aca-
cia vera in Officinis nostris obsolevit, cui Nostras,
vel Germanica subrogari solet.

ACACIA Germanica

E prunis silvestribus immaturis elicitus succus est,
atque inspissatus.

ACANTHUS fativus,

Branca Ursina.

ACETOSA arvensis lanceolata.

ACETOSA rotundifolia hortensis.

ACETOSELLA.

ACETUM vini.

ACMELLA,

Atemella, Atmella.

Folia hujus Plantæ Ceylanicæ subacria sunt, foliis
Lamii, aut Urticæ longiora.

ACONITUM salutiferum,

Anthora.

ACORUS verus.

Radix hæc, quæ pro Calamo aromatico substituitur,
albida sit, suaveolens, subamara, fungosa, &
fractu difficilis, non cariosa.

ACTE,

Sambucus.

ADEPS

Anatis,

Equi,

Gallinæ,

Gallinæ ,
 Hominis ,
 Muris alpini ,
 Suis ,
 Taxi ,
 Viperæ ,
 Vulpis .

ADIANTHUM album fol. Filicis ,
Filicula Fontana.

ADIANTHUM Aureum .

ADIANTHUM fol. Coriandri ,
Capillus Veneris.

ÆGAGROPILUS, vel Ægagropila
 Pila ovalis , aut rotunda , sæpius oblonga , admo-
 dum levis , plerumque ex rufo obscuri coloris ,
 fragmentis , & fibrillis herbarum coagmentata sub
 involucro coriaceo.

ÆS.

AGALLOCHUM, *vide* Lignum Aloes.

AGARICUS, vel Agaricum

Probatur albus , levis , friabilis , sapore primum
 subdulci , mox subamaro , tandem acri.

AGNI casti Semen.

AGRIMONIA.

ALBUM Græcum ,
Stercus Canis.

ALCHIMILLA,
Stellaria.

ALCIS Ungula .

ALKEKENGI Fructus'.

ALLELUIA,

Acetosella.

ALLII hortensis, seu sativi Radix.

ALOE Soccotrina;

Epatica,

Caballina.

Soccotrina, quæ ad usum internum cæteris præstantior, lucida esse debet, sicca, friabilis, amarissima, odore non ingrato. Integra ad fuscum colorem, pulverata ex flavo ad subrubrum vergat.

ALSINE media, seu vulgaris,

Morsus Gallinæ.

ALTHÆA.

ALUMEN Rupeum

Laudatur Romanum, translucens, albidus coloris, qui ad subrubrum inclinet.

AMARACUS,

Majorana.

AMBRA cineracea, seu *grisea* vulgo.

Optima censetur ea, quæ sordium expers est, levis, cinerei coloris ad fuscum vergentis, odoris grati, & suavis, maculis tum subnigris, tum albidis signata, quæ demum igni admota instar cæræ liquefcit.

AMBUTUA, V. Pareira brava.

AMMI, vel Ammeos

Oblongum semen nonnihil inflexum, striatum, Cumino minus, & pallidius. Mundum sit, nutritum, sapore acri subamaro, odore ad Origanum accedente.

AMMONIACUM Gummi

In grummos concretum sit, mundum, extrinsecus flavum, intus album, & lucidum, subamarum, Castorei, Galbanique odorem quodammodo referens; quod digitis tractatum, vel modice calefactum facile mollescat.

AMOMUM racemosum.

In folliculis Avellanam fere æquantibus, ac tripartitis semina continentur aspera, & quasi triquetra, quorum color obscurus ad purpureum inclinat: odor aromaticus est, sapor acer ad Caphuram accedens.

AMURCA,

Fæx Olei.

AMYGDALÆ amaræ:

AMYGDALÆ dulces.

AMYLUM.

ANACAMPSEROS,

Fabaria.

ANACARDIUM.

Deligendus hic fructus ponderosus, externo cortice subnigro, lævi, ac lucido, interno autem citrino, quo nucleus albidus saporis subdulcis, & inter utrumque corticem glutinosus, ex nigro rufi coloris, lucidusque liquor inclusus sit.

ANAGALLIS aquatica,

Beccabunga.

ANAGALLIS phœniceo flore.

ANAGALLIS cœruleo flore.

ANETHUM hortense.

ANGELICA major, seu sativa,

Bohemica.

Bohemica.

Oblonga hæc radix est capite crasso, ex quo radiculæ pollicares, aliæque tenuiores producuntur. Sit recens, extrinsecus fusca, intus albida, odore aromatico, sapore acri cum levi quadam amaritudine.

ANGUR IÆ Fructus, & Semen.

ANIME Gummi

Resinosum, in superficie albidum, veluti farina aspersum, intus fere citrinum, lucidum, odore, dum contrectatur, Elemi, dum uritur, Olibano quodammodo simili.

ANISI vulgaris Semen

Sit nutritum, mundum, suaveolens, sapore subacri, & subdulci.

ANISUM stellatum, seu Sinenſe.

Capſulæ fragrantæ quinque, ſex, ſeptemve inſtar radiorum uno petiolo ſimul junctæ ſunt, quibus grana continentur oblonga, ſeminis Lini fere ſimilia, cortice lævi, lucido, tenui, maculis ſubnigris diſtincto. Ejusmodi ſemen ſapore, odoreque Aniſum vulgare ſuperat.

ANONIS, ſive Ononis.

ANTHORÆ, ſeu Antithoræ Radix.

ANTHOS,

Rosmarinus.

ANTIMONIUM

Adhibendum præcipue Hungaricum purum, nitidum, ex longis, ac lucidis radiantibus ſtriis conflatum.

APES.

APIUM

APIUM dulce.

APIUM hortense, seu Petroselinum vulgo.

APIUM Macedonicum, V. Petroselinum Macedonicum.

APRI Dens.

AQUILEGIA.

ARABICUM Gummi, V. Gummi Arabicum.

ARCIUM,

Bardana.

ARGENTINA,

Potentilla.

ARGENTUM.

ARGENTUM vivum:

ARGILLA.

ARGYRITIS,

Lithargyrium Argenti.

ARI Radix.

ARISTOLOCHIAE longæ)

rotundæ) Radix:

tenuis)

ARMORACIA,

Raphanus rusticanus.

ARTHANITÆ Radix.

ARTHEMISIA vulgaris major:

ARUNDINIS fativæ Radix.

ASA, vel Assa dulcis, V. Benzoinum.

ASA, vel Assa fætida

Ex pluribus grumis subrubris coacta, acris, & amara, gravem, & alliatum odorem spirans.

ASARI Folia, & Radix.

ASCLEPIAS,

ASCLEPIAS,

Vincetoxicum.

ASELLI,

Millepedæ.

ASPALATHUS, V. Lignum Rhodium.

ASPARAGUS.

ASPHALTHUS, V. Bitumen Judaicum.

ASPLENIUM,

Ceterach Officinarum.

ASTACI fluviatiles,

Cancris fluviatiles.

ATRIPLEX hortensis,

Spinachia vulgaris.

AVELLANÆ Lignum, & Nuclei.

AVENÆ vulgaris, sive albæ Semen.

AURANTIÆ, vel Arantiæ Mali, Folia, Flores,
Fructus.

AURICULA Judæ,

Fungus sambucinus.

AURUM.

AXUNGIA, V. Adeps.

B

B

ACCÆ Ebuli,

Hederæ,

Juniperi,

Lauri,

Myrti,

Rhamni Cathartici,

Sambuci.

BA-

BALANUS myrepfica

Avellanæ nucis magnitudinem habet, subtilem corticem, & pelliculam fungosam, qua nucleus includitur albus, pinguis, & subdulcis.

BALAUSTIA,

Mali Punica silvestris Flores.

BALSAMINA mas,

Momordica vulgaris.

BALSAMITA,

Mentha Græca.

BALSAMUM Ægyptium,

De Mecca,

Judaicum,

Syriacum.

Balsamelaum

Resinosus liquor, ut ajunt, odoris acuti, & jucundissimi dum recens est, idemque albidus, vel subflavus; cum vero inveteravit, spissus, tenax, rufus, subamarus, & subacris. Hoc enim genuinum, minimeque fucatum Balsamum plane rarissimum est.

BALSAMUM Copaiba, vel Copaliba

Liquor oleosus, pallidus, vel subflavus, limpidus, Terebinthina minus tenax, sapore acri subamaro, odore fragrante.

BALSAMUM Peruvianum album

Resinosum, limpidum, acre, Peruviano nigro glutinosius, odoreque præstantius. Quod recens, subflavum est; verus autem rubescit.

BALSAMUM Peruvianum nigrum

Instar syrupi viscosum est, sapore acri; ex rufo ad fuscum

fuscum colorem, odoreque ad Styracem calamitam accedit.

BALSAMUM Peruvianum siccum

In cucurbitis ad nos deferitur concretum, pingue, perlucidum, & rufum, suavi odore, vix ulla acritudine.

BALSAMUM Tolutanum, seu de Tolu

In modum Terebinthinæ tenax, Mali citrei odorem quodammodo spirat; color ejus subrubeus, acritudo fere nulla.

BARBA Capræ floribus compactis,

Ulmaria.

BARBA Hirci,

Tragopogon.

BARDANÆ Radix, & Semen.

BASILICUM,

Ocimum citratum.

BDELLIUM

In lacrymas concretum sit, odoratum, subamarum, pingue; confractumque luceat, & calore mollescat. Illud reiiciatur, quod in glebas coactum, quod nigrum, & sordidum.

BECCABUNGA.

BECHION,

Farfara.

BELLIS minor, seu pratensis.

BENZOINUM,

Belzoe,

Benjoinum

Probatur sincerum, lucidum, suaveolens, sine acritudine,

tudine, ex flavo ad subrubrum colorem vergens;
albis frustulis interpersis, quæ contractas Amygda-
las referant.

BERBERIS, seu Oxyacanthæ Fructus.

BETA alba, vel pallescens.

BETONICA.

BETULÆ Aqua, & Cortex.

BEZAAR, seu Bezoar

Orientalis in superficie lævis est, & nitidus, figuræ;
& magnitudinis diversæ. Ex plurimis lamellis con-
stat, quarum aliæ super alias positæ sunt, iisdem-
que extrinsecus politis, ac splendentibus, intus stria-
tis: color varius, ut plurimum ex atro, vel pallido,
quandoque cinereo ad subviridem colorem incli-
nans: sapor, odorque nullus. Occidentalis fere al-
bidus, aut cinereus, fragilior, & ex multis etiam
laminis sibi invicem incumbentibus conflatus. Uter-
que in centro cavus est, ubi paleæ, pili, diversæ-
que res aliæ inclusæ sunt; quibus præcipue notis na-
tivi ejusmodi Lapides a factitiis discerni solent.

BEZOAR Germanicum, V. Ægagropilus.

BISMALVA,

Althæa.

BISTORTÆ Radix.

BITUMEN Judaicum

Purum sit, ponderosum, siccum, graveolens, sub-
nigrum, & splendidum.

BOLUS Armenia,

Orientalis,

Pinguis, ponderosa, subrubra, lucida, foliacea, quæ
labiis,

labiis , aut linguæ apposita prompte adhæret.

BOMBACIS Semen.

BOMBYCUM Folliculi,

Sericum crudum.

BORAX nativa

Sit pura , crySTALLINA , pallida , & subviridis , saporis
nitrosi.

BORRAGO.

BOTRYS.

BOTUA, vel Butua, V. Pareira Brava.

BRANCA Ursina.

BRASSICA sativa,

Caulis.

BRUNELLA,

Consolida minor.

BRUSCI, sive Rusci Radix, & Semen.

BRYONIÆ Radix.

BUFONES.

BUGLOSSUM vulgare, seu angustifolium majus.

BUGLOSSUM Latifolium,

Borrage.

BUGULA,

Consolida media.

BUNIAS,

Napus sativa dulcis, vel silvestris,

BURSA Pastoris major.

BUXI Lignum.



C

CACAO.

Laudatur id præcipue, quod *Caraque* majus vulgo appellatur, fusco, & subrufo colore, maturum, recens, crassum, pingue, & subamarum.

CÆPA vulgaris.

CALAMINARIS Lapis

Alius cinereus, alius subruber, lineisque albidis distinctus, qui præstantior censetur.

CALAMINTHA montana vulgaris.

CALAMUS aromaticus Officinarum, V. Acorus verus.

CALCANTHUM,

Vitriolum.

CALENDULÆ, seu Calthæ Flores.

CALX viva.

CAMPHORA

Candida, crystallina, friabilis, valde odorata, acris, & subamara, ita ignis tenax, ut semel accensa non facile extinguatur; atque adeo volatilis, ut igne leni tota penitus sublimetur. Dosis a granis quatuor ad octo.

CANCRI fluviatiles.

CANELLA alba

Cortex albidus exteriori involucri spoliatus, in longos tubulos convolutus, acer, aromaticus, fragrans. Ita nimirum talis cortex rarissimus a quibusdam auctoribus describitur; cujus loco utimur Costo corticoso.

CA-

CANELLA Ceylanica, V. Cinnamomum.

CANNABIS fativæ Semen.

CANTHARIDES.

CAPILLUS Veneris.

CAPPARIS Radix, & Flores nondum aperti, vulgo
Fructus.

CAPRIFOLIUM.

Matrisylva.

CAPSICI Fructus.

CARABE, V. Succinum.

CARANNA, sive Caragna.

Resina hæc eligatur tenax, ex cinereo ad subviridem
colorem vergens, amara, suaveolens dum accen-
ditur. Vetustate exarescit, & friabilis fit.

CARDAMINDUM,

Nasturtium Indicum.

CARDAMOMI majoris Semen.

CARDAMOMUM minus

Siliqua membranacea triangularis tribus donatur cel-
lulis, quibus semina exigua, angulosa, tenui, &
albida pellicula involuta includuntur, coloris rufi,
odoris aromatici, saporis acris. Præstantior ea, quæ
integra, gravis, nec rugosa est.

CARDIACA.

CARDUUS benedictus,

Carduus sanctus.

CARDUUS stellatus,

Calcitrapa.

CARICÆ,

Ficus passæ.

CARLINÆ acaulos magno flore Radix.

CAROBÆ

CAROBÆ Officinarum.

CARPOBALSAMUM

Bacciformis fructus, Pipere paullo major, & aliquantulum oblongus, rugosus, tenuique pediculo instructus. Recens sit, gravis, nucleum albidum, & pinguem continens, odoris aromatici suavis, saporis subacris piperati.

CARTHAMI Officinarum Semen.

CARVI Semen.

CARYOPHILLATÆ Radix.

CARYOPHILLI hortensis Flores.

CARYOPHILLUS aromaticus

Sit capite globoso, circumpositis quatuor apiculis, colore subrubro fusco, sapore acri aromatico, odore fragrante, & quo compresso oleosum quiddam eliciatur.

CASCARILLA

Cortex resinofus convexa parte cinereus, concava ferrugineus, lucidus, fractu difficilis, levi odore aromatico, & dum comburitur, Moschum redolens, gustu denique acer, & paullulum amarus.

CASSIA fistula,

Alexandrina,

Optima est Ægyptia, recens, siliquis crassis, ponderosa, haud resonans dum concutitur, cortice tenui, & lævi.

CASSIA lignea,

Odorata,

Cinnamomo crassior, fractuque difficilior, intus lucida, atque ferruginea, saporis acris, & subdulcis.

Diu

Diu manfa mollitur omnino, & glutinosa fit, lignosa parte vix ulla superstita.

CASTOREUM

Duobus folliculis in summa eorum parte junctis constat, in quibus materia continetur cerosa, inflammabilis, ex rufo ad obscurum colorem vergens, quæ tractu temporis induratur, & fragilis fit. Castorei odor gravis est, sapor subacer, & subamarus. Ex Russia allatum cæteris præstantius.

CATAPUTIA major.

CATECHU

Eligendum est compactum, lucidum, subnigrum, quod in ore detentum lique scat, saporeque primum subamaro, ac styptico, postea subdulci gustum afficiat.

CATELLI.

CAUDA EQUINA.

CAUDA Porcina,

Peucedanum.

CAULIS.

CENTAURIJ majoris Radix.

CENTAURIUM minus.

CENTINODIA.

CERA alba, & citrina.

CERASA sativa rubra, & acida.

CERASA silvestria nigra, & dulcia.

CEREFOLIUM,

Chærefolium.

CERUSSA.

CETERACH.

CHA-

CHALYBS.

CHAMÆACTE,

Ebulus.

CHAMÆCISSUS,

Hedera terrestris.

CHAMÆDRYS.

CHAMÆLEON albus,

Carlina acaulos magno flore.

CHAMÆMELI vulgaris Flores.

CHAMÆPITYS lutea vulgaris.

Iva arthritica.

CHEIRI Flores.

CHELÆ Cancrorum.

CHELIDONIUM majus.

CHELIDONIUM minus.

CHERMES, seu Kermes

Sit recens siccatum, integrum, nutritum, rubicundum, lucidum, & sordium expers, saporis subamari, odoris grati.

CHINACHINA.

Hujus Corticis mediocris crassitudo sit, superficies interior lævis, exterior scabra, & passim incana; idemque compactus deligatur, & quemdam mucorem redolens, saporis subamari, & styptici, coloris ad Cinnamomum accedentis; quique non facile, nec sine aliquo strepitu frangatur.

CHINA Radix

Crassa est, tuberosa, & nodosa. Alia, quæ facile conciditur, coloris ex pallido rubri, Carnosa in Officinis nostris appellatur; alia, quæ dura,

C

magis

magis gummosa, lucida, subnigra, aut rufa est, Petrosa, aut Semipetrosa dicitur.

CHRYSOCOLLA, V. Borax.

CHRYSITIS,

Lithargyrium Auri.

CICERBITA aspera, & lævis.

CICHORIUM sativum, & silvestre:

CICLA Officinarum,

Beta alba, vel pallescens.

CICUTA major.

CINNABARIS nativa.

Laudatur ea, quæ lapillorum formam habet, superficiem lævem, & splendentem: confracta micat, ut vitrum, nullasque strias exhibet; pulverata eximie rubet. Hujus purgandæ ratio duplex docetur pag. 65. Dosis autem a granis decem ad viginti.

CINNAMOMUM

Cortex cannulatus, subrufus, odoris fragrantis, saporis initio subdulcis, tum acris, & grati.

CITRAGO,

Melissa hortensis.

CITREUM Malum.

CITRULLUS,

Anguria.

CLEMATIS Daphnoides,

Vinca Peruvina.

CNICUS sativus,

Carthamus.

CNICUS silvestris,

Carduus benedictus.

COCCI

COCCI Orientales,

Coccula Officinarum

Recentes deligantur, qui pinguem nucleum subflavum contineant. Hic enim vetustate ita extenuantur, ut vacua fere putamina remaneant.

COCCINELLA, vel Cochinilla

Sicca, ponderosa, extrinsecus albida, intus rubra sit; ac dentibus trita salivam rubicundo colore inficiat.

COCHLEARIA.

COCHLEARIA folio cubitali,

Raphanus rusticanus.

COCHLEÆ terrestres,

Limaces testaceæ.

COLOCYNTHIS

Levis, alba, & cortice denudata præcipue deligi solet. Usus ejus in Trochiscis Alhandal.

COLOPHONIA,

Quæ sic appellata est Fæx Terebinthinæ post elicited spiritum & oleum, sicca & tamen pinguis deligatur, translucens, subrufa; quæ autem nigra, ac nimium friabilis, minus probanda.

CONCHA margaritifera,

Mater Perlarum.

CONI Abietis,

Cupressi,

Pini.

CONSOLIDA major.

CONSOLIDA media.

CONSOLIDA minima,

Bellis minor.

CONSOLIDA minor.

CONSOLIDÆ regalis Semen.

CONTRAYERVA Hispanica,

Drakena Radix

Oblonga, nodosa, extrinsecus rufa, intus albida, odoris aromatici, saporis subacris, & paullulum amari. Sit recens, densa, gravis, non cariosa.

CONTRAYERVA tuberosa Indica, subrotunda, fulvo colore, cortice scabro.

CORALLINA

Integra, & munda sit, Musci formam habens, sub dentibus stridula, colore cinereo & subviridi, sapore falso, odore Concharum.

CORALLIUM album,

rubrum.

CORIANDRIMajoris Semen.

CORNI Fructus.

CORNU Cervi,

CORTEX Guaiaci, V. Guaiaci Cortex.

CORTEX Peruvianus, V. Chinachina.

CORTEX Winteranus

Crassus, cannulatus, integumento cinereo fungoso, inæquali, pluribus rimis hiante, intus solidus, densus, pallidus, acer, aromaticus, fragrantissimus. Ejus loco, qui rarissimus omnino est, adhibetur Costus corticosus, & a nonnullis Canella alba, quam spurium Corticem Winteranum appellant.

CORYLUS,

Avellana.

COSTUS Arabicus,

Amarus

Amarus Officinarum.

Radiciſ hujus forma, qualis fere Helenii. Optima cenſetur, quæ extrinſecus ex cinereo ad ruſum, intrinſecus ad flavum colorem vergat, fungoſa, & fractu difficilis, ſaporis acris, ſubamari, aromatici, odoris fere violacei.

COSTUS corticoſus, ſeu dulcis Officinarum
Convolutus, craſſus, ex ruſo ad flavum, quandoque ad cinereum colorem inclinans, ſaporis acris quaſi piperati, odoris aromatici.

COTONEUM, ſeu Cydonium Malum.

CRANIUM Humanum.

CRASSULA,

Fabaria.

CREPITUS Lupi.

CRESCIO,

Naſurtium aquaticum.

CRESPINUS,

Berberis.

CROCUS Indicus, V. Curcuma.

CROCUS ſativus.

CUBEBAE

Recentes ſint, odoræ, nucleo oleoſo præditæ, ſapore acri aromatico.

CUCUMERIS ſativi Semen.

CUCUMERIS ſilveſtris, ſeu aſinini Radix, & Fructus.

CUCURBITAE longæ flore albo Fructus.

CUCURBITAE majoris Folia, & Semen.

CUMINI, vel Cymini Semen.

CUMI-

CUMINUM pratense,

Carvi.

CUPRESSI Nuces.

CUPRUM,

Æs.

CURCUMA

Radix dura admodum, & tuberosa, quæ Zingiberi formam, & odorem quodammodo refert. Sit gravis, densa, intus lucida, & crocea.

CUSCUTA major.

CUSCUTA minor,

Epithymum.

CYANI Flores.

CYCLAMEN,

Arthanita.

CYNOGLOSSI Radix.

CYNORRHODON, seu Cynosbatos.

CYPERI longi odorati Radix.

CYPERUS rotundus

Radix Olivæ figura, cortice subflavo, ductisque in orbem zonis distincto, substantia albida. Sit compacta, non cariosa, odore gravi ad Nardum accedente, sapore acri subamaro.

CYTINI,

Punicæ sativæ Flores.

D

DACTYLI Indi, V. Tamarindi.
DACTYLUS

Sit

Sit recens, pinguis, maturus, & subdulcis.

DAUCUS Creticus

Oblongum, exile, villolum, striatum, incanum
semen est; idemque eligatur mundum, odoratum,
sapore acri aromatico.

DELPHINIUM,

Consolida regalis.

DENS Leonis latiore folio;

Taraxacum.

DIAPENSIA,

Sanicula Officinarum.

DICTAMNI albi Radix:

DICTAMNUS Creticus,

Folia sint lanuginosa, & odorata, summitates flo-
ridæ.

DORONICI Radix.

DRACUNCULUS hortensis.

DRACUNCULUS polyphyllus,

Serpentaria major.

DRAKENA Radix, V. Contrayerva Hispanica.

E

EBULUS.

EBUR.

EBUR fossile, V. Unicornu fossile.

ECHINUS terrestris.

ELECTRUM, V. Succinum.

ELEMI.

Resina hæc pinguis sit, ex albo ad subviridem colo-
rem

rem vergens, flavisque sparsim maculis signata;
odoris aromatici gravis, &, dum comburitur, fragrantis.

ELLEBORUS, V. Helleborus.

ENDIVIA sativa, seu vulgaris.

ENULÆ Campanæ Radix.

EPITHYMUM.

EQUISETUM,

Cauda equina.

ERINACEUS,

Echinus terrestris.

ERUCA tenuifolia flore luteo.

ERVUM verum,

Orobis semine majore.

ERYNGII vulgaris Radix.

ERYSIMUM vulgare.

ESULÆ minoris Radix.

EUPATORIUM Græcorum,

Agrimonia.

EUPHORBIIUM

In guttas concretum sit, pallidum, pellucidum;
sapore acerrimo exurente.

EUPHRAGIA.

EXUVIÆ Viperarum.

F

FABÆ majoris Flos, Semen, Siliquæ.

FARINA Avenæ,

Cicerum;

Cicerum,
 Fabarum,
 Fœni Græci,
 Hordei,
 Lini,
 Lupinorum;
 Orobi,
 Secalis,
 Tritici.

FARINA volatilis.

FARFARA.

FEL Taurinum.

FEL Terræ,

Centaurium minus.

FERRUM.

FEX Olei.

FICUS passæ.

FILICIS fœminæ, & maris Radix.

FILICIS floridæ Radix.

FILIPENDULÆ vulgaris Radix.

FLORES quatuor cordiales Officinarum;

Borraginis,

Buglossi,

Rosarum rubrarum,

Violarum.

FLOS Terræ,

Noctoch.

FŒNICULUM porcinum;

Peucedanum.

FŒNICULUM dulce Officinarum.

D

FŒ-

FŒNICULUM tortuosum, V. Sefeli Massiliense.

FŒNI Græci Semen.

FOLIA Orientalia, V. Senna.

FOLIUM Indum, V. Malabathrum.

FOLLICULI Bombycini, seu Serici.

FORMICÆ majores.

FRAGARIA.

FRAMBŒSIA,

Rubus Idæus.

FRAXINELLA,

Dictamnus albus.

FRAXINUS.

FULIGO.

FUMARIA.

FUNGUS Laricis, V. Agaricum.

FUNGUS Melitensis, V. Fungus Typhoides.

FUNGUS pulverulentus,

Crepitus Lupi.

FUNGUS Sambuci.

FUNGUS Typhoides tuberosus.

Melitenses, qui ad nos deferuntur hujusmodi Fungi;
aridi, oblongi, & fere capitati sunt; extrinsecus
ferruginei coloris, intus subrufi, vel fusci, eorum-
que subsalsus, ac terrestris sapor est.

FURFUR.

G

GALANGA minor

Radix tuberosa, extrinsecus ductis in orbem palli-
dis

dis funiculis , velut in plures zonas distincta . Tota est rufa , sapore acri , & styptico , odore fragrante aromatico .

GALANGA major

Minore crassior est , minus odorata , minus acris , colore autem magis diluto .

GALBANUM

Sive in guttas Olibano fere similes , sive in massam coactum , deligatur flavum , resinosum , purum , pingue , nec valde tenax , nec penitus aridum ; odore gravi , sapore acri subamaro .

GALEGA vulgaris .

GALEOPSIS ,

Urtica iners flore purpureo .

GALLA Nostras .

GALLA Orientalis

Probatur gravis , densa , intus lucida , & subnigra .

GENEPI ,

Absinthium Alpinum candidum , humile .

GENISTÆ junceæ Flores , & Semen .

GENTIANÆ majoris Radix .

GIN-SENG

Oblonga radix auricularis digiti , vel calami scriptorii crassitie , interdum bifida , ambientibus signata rimulis , subflava , solida , insipida primum , mox subdulcis cum levi quadam acritudine , & amaritie , odore suavi . Rarissima est , maximoque pretio venditur .

GLANS Unguentaria , V. Balanus Myrepfica .

GLUTEN Piscium .

GLYCYRRHIZA filiquosa,

Liquiritia.

GOSSIPIMUM,

Bombax Officinarum.

GRAMINIS Canini arvensis Radix.

GRANA Paradisi,

Cardamomi majoris Semina.

GRATIOLA.

GROSSULARIA non spinosa,

Ribes Officinarum.

GUAIACI Cortex

Probatur tenuis, durus, ex pluribus lamellis tenuissimis conflatus, qui ex cinereo, vel cæruleo ad subviridem colorem vergat, intus lucidus, & fractu difficilis.

GUAIACI Gummi

Mundum sit, colore subnigro rubente, perlucidum, friabile, suaveolens dum incalescit, sapore acri.

GUAIACI Lignum

Solidum, densum, resinosum est, & in aqua demergitur; lucidum quoque, & suaveolens dum calefcit; exteriori parte buxei coloris, interiore subnigra.

GUMMI Ammoniacum, V. Ammoniacum Gummi.

GUMMI Anime, V. Anime.

GUMMI Arabicum

Eligendum est nitidum, siccum, pellucidum, insipidum, quod aqua facile dissolvatur.

GUMMI Caranna, V. Caranna.

GUMMI Elemi, V. Elemi.

GUMMI

GUMMI Gutta

Probatur siccum, purum, lucidum, colore flavo sub-
rufo, quod vini spiritu prorsus dissolubile sit. Dosis
a granis quatuor ad octo.

GUMMI Hederæ, V. Hederæ Gummi.

GUMMI Juniperi, V. Juniperi Gummi.

GUMMI Lacca, V. Lacca.

GUMMI Sagapenum, V. Sagapenum.

GUMMI Tacamahaca, V. Tacamahaca.

GUMMI Tragacanthum, V. Tragacanthum.

GUTTA Gamba, V. Gummi Gutta.

H

HÆMATITES

Sit gravis, purus, nitidus, oblongis fibris cuspidatis
constans, cui pulverato satura rubedo accedat.

HALANDAL, V. Colocynthis.

HALICACABUM,

Alkekengi.

HERA arborea.

HERA terrestris.

HERÆ Gummi

Sit purum, perlucidum; obscuro colore subrubro,
sapore subamaro, odore gravi, intus nitore vitreo.

HELENIUM,

Enula Campana.

HELLEBORI ^{albi}) Radix.
 ^{nigri})

HEL-

HELXINE,

Parietaria.

HEPATICA Fontana.

HEPTAPHYLLUM,

Tormentilla.

HERBA Paralysis,

Primula veris.

HERBÆ quinque Capillares Officinarum:

Adiantum album,

Capillus Veneris,

Ceterach,

Lingua Cervina,

Polytrichum.

HERBÆ quinque Emollientes Officinarum:

Althæa,

Beta,

Malva,

Mercurialis,

Viola.

HERMODACTYLUS Officinarum.

Tuberosa hæc radix albida sit, ponderosa, sine carie, sapore subacri.

HERNIARIA,

Polygonum minus.

HIPPOLAPATHUM,

Rhabarbarum Monachorum.

HIPPURIS,

Cauda Equina.

HIRCI montani Sanguis concretus:

HIRUNDINARIA,

Cheli

Chelidonium majus.

HIRUNDINES.

HISPIDULA.

HORDEI Semen.

HORMINUM,

Sclarea.

HYACINTHUS Lapis.

HYDRARGYRUS,

Argentum vivum.

HYDROPIPER,

Persicaria urens.

HYOSCYAMUS albus,
niger.

HYPERICUM vulgare.

HYPOCISTIS.

Concretus hic Succus niger, lucidus, gravis sit, arenularum expers, sapore acido austero, sine empyreumate.

HYSSOPUS.

I

JACOBÆA.

JALAPPA

Extrinsecus subnigra sit, intus cinerea & subrufa, solida, fractu contumax, & in plures circulos dispositis resinosis partibus nitens; quæ in ignem iniecta flammam facile concipiat. Dosis a drachma dimidia ad drachmam unam.

IBISCUS,

Althæa.

ICH-

ICHTYOCOLLA,

Gluten Piscium.

JECORARIA,

Hepatica Fontana.

IMPERATORIÆ Radix.

INTYBUS,

Endivia.

INULA,

Enula Campana.

IPECACUANHA

Radix Americana calamo scriptorio plerumque ex-
lior, tortuosa, superficie inæquali, fusco, vel albi-
do colore, vel cinereo ad rufum inclinante. Eliga-
tur crassa, compacta, resinosa.

IRIS Florentina

Cortice denudata radix, alba, compacta, gravis &
intus lucida sit, odore violaceo, sapore paullulum
acri & subamaro, non cariosa.

IRIS vulgaris, sive silvestris.

IVA Arthetica, sive Arthritica,

Chamæpitys lutea vulgaris.

JUIUBÆ.

JUNCUS odoratus, V. Schoenanthum.

JUNIPERI vulgaris fruticosæ Lignum, & Baccæ.

JUNIPERI Gummi

In lacrymas oblongas concretum, sincerum, niti-
dum, translucens, albidum, & cum inveterascit
subflavum, odoris, dum accenditur, fragrantis.

JUPITER,

Stannum.

JUS-

JUSQUIAMUS,

Hyoscyamus.

K

KARABE, V. Succinum.

KERMES, V. Chermes.

KINAKINA, V. Chinachina.

L

LABDANUM, seu Ladanum

Probatur leve, pingue, resinofum, subamarum, colore fusco, quod tactu facile mollescat, & dum accenditur, gratum odorem spiret.

LACCA in ramulis

Pellucida, inæqualiter granosa eligatur, intus cavernosa, quæque dentibus trita rubicundo colore salivam inficiat.

LACERTÆ virides:

LACTUCA hortensis.

LACTUCA silvestris,

Scariola.

LAMIUM album,

Urtica iners flore albo.

LANA succida.

LAPATHI acuti Radix.

LAPATHUM hortense latifolium,

Rhabarbarum Monachorum.

LAPIS Bezoardicus, V. Bezoar.

E

LAPIS

LAPIS Calaminaris, V. Calaminaris Lapis:

LAPPA major,

Bardana major.

LAVANDULÆ Spicæ florentes:

LAURUS tenuifolia.

LAURUS vulgaris latifolia:

LENTISCI Lignum

E Chio delatum, & ponderosum præcipue commendatur; cujus corticis color cinereus, vel fuscus in subrufum, albida substantia solida, & compacta in flavum vergat. Quandoque Mastices lacrymæ passim cortici inhærescunt.

LEPORIS Pili, & Sanguis.

LEUCANTHEMUM,

Chamamelum vulgare.

LEUCOIUM luteum vulgare,

Cheiri.

LEVISTICUM,

Siler montanum.

LICHEN arboreus.

LICHEN petræus latifolius,

Hepatica Fontana.

LIGNI sancti Cortex, V. Guajaci Cortex:

LIGNUM Aloes

Omnino rarissimum est, cujus tamen nomine appellari solent in Officinis quædam lignorum fragmenta, quæ magnitudine, gravitate, & colore inter sese differunt. Illud autem genuinum censetur, quod ponderosum, durum, versicolor, pingue, & subamarum sit, ac, dum comburitur, suavem odorem spiret.

LIGNUM fœniculatum, V. Sassafras.

LIGNUM Nephriticum, V. Nephriticum Lignum.

LIGNUM Pavanum, V. Sassafras.

LIGNUM Rhodium,

Cyprium,

Rosaceum,

Radix lignosa, nodosa, densa, solida, pinguis, subflava, fabamari saporis, odorisque rosei.

LIGNUM sanctum, V. Guajacum.

LIGUSTICUM,

Siler montanum.

LILII Convallium Flores.

LILIUM album.

LIMACES testaceæ.

LIMONES,

Mala Limonia.

LINGUA Canina,

Cynoglossum.

LINGUA Cervina Officinarum,

Scolopendrium.

LINI sativi Semen.

LIQUIRITIÆ Radix.

LIQUIRITIÆ Succus concretus

Sit densus, lucidus, ac dulcis: contrectatus facile mollescat, & in ore detentus prorsus liquetur.

LITHARGYRUS, seu Lithargyrium Auri,

Argenti.

LITHOSPERMUM,

Milium Solis.

LUCII Piscis Mandibulæ.

LUJULA,

Acetosella.

LUMBRICI terrestres,

Vermes terrestres.

LUNA,

Argentum.

LUNARIA Botrytis.

LUPINI Semen.

LUPULUS.

LYCOPERDON vulgare;

Crepitus Lupi.

M

MACIS.

Medium hoc Nucis moschatae involucri subrufi coloris sit, odoris grati aromatici, saporis subacris, & jucundi.

MACROPIPER, V. Piper longum.

MAJORANA vulgaris.

MALABATHRUM, seu Folium Indum Officinarum

Lauri vulgaris folio amplius est. Nervi tres a petiolo ad apicem folii producuntur. Densum est, fractu contumax, glabrum, splendens, subviride.

MALICORIUM,

Granatorum Cortex.

MALI Granatae sativae Flores, & Fructus.

MALI Granatae silvestris Flores.

MALI Persicae Flores, & Nuclei.

MALVA vulgaris.

MALUM

MALUM Aurantium Vulgare,
Lusitanicum,
Sinense.

Citreum,
Citreum Florentinum odoratissimum, vul-
go *Cedrato*.

MALUM Cotoneum, vel Cydonium.

MALUM Limonium.

MANDRAGORA.

MANNA

Calabrica laudatur, recens, granosa, albida, sin-
cera, saporis subdulcis, quæ facile aqua dissolvatur.

MARGARITÆ

Eligantur tam Orientales, quam Occidentales, can-
didæ, & pellucidæ, quæ tum cito in pulverem re-
digantur, tum aquam lactescentem efficiant.

MARRUBIUM album vulgare.

MARS,

Ferrum.

MARUM

Cum raro ad nos deferatur, ejus loco Majorana uti-
mur.

MASTICHE, vel Mastice,

Resina Lentisci

Optima ex Chio, quæ sincera, translucens, odora,
& friabilis sit, tum in oleo facile lique scat.

MATER Perlarum.

MATRICARIA vulgaris.

MATRISYLVA.

MECHOACANNA

Crassa

Crassa Radix , albida , circulis distincta , sapore farinaceo , odore nullo. Improbanda est acris , subamara , & cariosa. Exhibetur a scrupulis duobus ad quatuor.

MEDULLA cruris Bovis,
Cervi,
Vituli.

MEL Hispanicum:

MEL Nostras.

MELILOTUS vulgaris flore luteo.

MELISSA hortensis.

MELONIS Fructus , & Semina:

MENTHA cataria ,

Nepeta.

MENTHA sativa , vel hortensis,

MENTHA silvestris,

Mentastrium.

MENYANTHES,

Trifolium fibrinum.

MERCURIALIS.

MERCURIUS,

Argentum vivum?

MESPILI vulgaris Fructus.

MEU , vel Meum Athamanticum

Oblonga Radix capite barbato , digitum fere crassa , vel amplius ; extrinsecus subnigra , intus albida , & subflava . Probatur recens , cujus odor aromaticus , sapor acer , & subamarus.

MILII Solis Semen .

MILLEFOLIUM vulgare .

MILLE-

MILLEGRANA major,
Herniaria.

MILLEGUETA,
Cardamomi majoris Semen.

MILLEPEDÆ.

MINIUM.

MOMORDICÆ vulgaris Fructus.

MORI nigræ Fructus.

MORSUS Diaboli,
Succisa.

MOSCHUS.

Laudatur is, qui admodum olet, ex rufo ad obscurum colorem inclinans, subamarus, arenularum expers, nec valde humidus, nec siccus omnino.

MUMIA Officinarum

Pura sit, compacta, subnigra, lucida, odore gravi, non ingrato.

MUSCERDA,

Stercus Murium.

MUSCUS arboreus villosus.

MUSCUS aureus, seu capillaris,
Adiantum aureum.

MUSCUS marinus, V. Corallina.

MUSCUS terrestris clavatus,
Lycopodium.

MYRISTICA Nux, V. Nux Moschata.

MYROBALANI quinque:

Citrina densa, carnosae, gravis, angulosa.

Bellerica rotunda, ponderosa, rufo cortice, pulpa abundans, qua inclusum est ossiculum. Che-

Chebula omnium maxima, oblonga, paullulum rugosa, colore fusco, cortice crasso, officulo oblongo.

Emblicæ subrotunda figura, obscurusque color.

Quod in pulpa includitur os angulosum, persæpe deest in hac Myrobalano, quæ raro integra ad nos defertur.

Inda oblonga, parva, nigra, rugosa, densa, & dura; plerumque caret officulo.

MYRRHA

In lacrymas concreta sit, concolor, & resinosa, quæ confracta albidas intus micas habeat: lucida etiam, odora, pinguis, & amara.

MYRTUS latifolia communis.

MYXA, V, Sebesten.

N

NAPI dulcis fativæ, vel sylvestris Semen.

NARDUS Celtica,

Spica Celtica.

NARDUS Indica

Oblonga radix, in modum spicæ comosa, fibris convolutis, levis, colore fusco subrufo, aromatica, subacris, & paullulum amara.

NARDUS Italica,

Lavandula.

NASTURTIUM aquaticum.

NASTURTIUM hortense.

NASTURTIUM Indicum.

NENU-

NENUPHAR,

Nymphaea.

NEPETA.

NEPHRITICUM Lignum.

Exterior Ligni pars pallida, & subflava; interior obscura, solidior, gravior, & subamara. Huic Ligno peculiare illud est, quod aqua ex eodem infuso colorem varium referat; si enim in vitreo vase ad solis radios spectetur, flava; e contraria parte cærulea apparet.

NERIUM,

Oleander.

NICOTIANA,

Tabacum.

NIGELLÆ flore minori simplici Semen.

NISI, V. Ginseng.

NITRUM.

NOSTOCH,

Cœlisolium,

Flos Terræ.

NUCLEI Persici.

NUCLEI Pinei.

NUMMULARIA.

NUX Avellana, seu Corylina,

Ben, V. Balanus Myrepica,

Cupressi,

Juglans.

NUX Moschata, seu Nucista

In superficie cineracea, intus subrufa; albidisque venis distincta. Sit gravis, odorata, non cariota.

F

NYM-

NYMPHÆÆ Radix, & Flores.

O

OCIMUM citratum.

OCULI, seu Lapilli Cancrorum

Albidi sint, orbiculati, ex lamellis compositi, altera parte convexi, ubi sulculi ramosi apparent; altera compressi, & circulatim sinuosi, ut rudem quamdam sigilli formam referant.

OCULI Populi,

Populi Gemma.

OLEANDER.

OLEUM Olivarum;

Commune.

OLEUM Petræ, V. Petroleum.

OLIBANUM

In guttas concretum sit albidas, pellucidas, & pingues, saporis amari, odoris, dum accenditur, suavis.

ONONIS, seu Anonis.

OPHTALMICA,

Euphrasia.

OPIUM

Eligendum est compactum, sordium expers, fuscum, lucidum, graveolens, subamarum, & inflammabile: cavernosum vero, nigrum, acerrimumque reiiciendum. Exhibetur a grano dimidio ad granum unum.

OPOBALSAMUM, V. Balsamum Ægyptium.

OPOPANAX

In

In croceos grumos coactus, friabilis, facile in aqua
liquefcens, fapore acri, amaro; gravique odore ad
Galbanum accedente.

ORCHIS,

Satyrium.

ORIGANUM vulgare.

OROBİ Semen.

OSMUNDA foliis lunatis,

Lunaria Botrytis.

OSMUNDA regalis,

Filix florida.

OS Sepiæ.

OSTEOCOLLA.

OXALIS minor,

Acetosa arvensis lanceolata.

OXALIS fativa,

Acetosa hortensis.

OXYACANTHA,

Berberis.

OXYLAPATHUM,

Lapathum acutum.

OXY S flore albo,

Acetosella.

P

PÆONIÆ maris Radix, & Semen.

PÆONIÆ fœminæ Flores.

PALMULA, V. Dactylus.

PANIS porcinus,

Arthanita.

PAP AVERIS albi Capita, & Semina.

PAP AVERIS erratici, rubri, seu rhœados Flores.

PARADISI Grana,

Cardamomi majoris Semina.

PARALYSIS herba,

Primula veris.

PAREIRA brava

Tortuosa Radix pollicari, & amplius, interdum brachiali crassitudine, extrinsecus fusca, aut nigricans, intus subpallida, paullulum dulcis, & subamara.

PARIETARIA.

PARONYCHIA.

PARTHENIUM,

Matricaria.

PASSULÆ majores,

Passula Damascenæ.

PASSULÆ minores,

Passula Corinthiacæ.

PAVONIS Stercus.

PEDICULARE Granum, V. Staphisagria.

PENTAPHYLLUM,

Quinquesolium.

PERFORATA,

Hypericum.

PERICLIMENUM,

Matrisilva.

PERLÆ, V. Margaritæ.

PERSICARIA mitis maculosa.

PERSICARIA urens,

PERSONATA,

Bardana.

Bardana.

PERVINCA;

Vinca pervinca.

PES Cati Officinarum;

Hispidula.

PETASITES major vulgaris:

PETROLEUM

Limpidum sit, tenue, subflavum, odoris bituminosi
acuti, saporis subacris subamari.

PETROSELINUM,

Apium hortense.

PETROSELINUM Macedonicum

Exile Semen oblongum, leve, striatum, ex fusco ad
subviridem colorem vergens. Mundum sit, nutri-
tum, odore aromatico, sapore acri, & subamaro.

PETUM,

Tabacum.

PEUCEDANI Radix.

PHU,

Valeriana.

PHYLLITIS,

Lingua Cervina.

PICEA Latinorum,

Abies rubra.

PILA marina.

PILOSELLA major repens hirsuta.

PIMPINELLA sanguisorba.

PINGUEDO, V. Adeps.

PINI Nuclei, Resina, Strobili.

PIPER longum

Sit ponderosum, albida superficie granosa, aroma-
ticum, & acerrimum.

PIPER

PIPER nigrum, & album.

Utrumque probatur, quod bene nutritum, ponderosum, parum rugosum, intus albidum, saporis acris, & fervidi aromatici, odoris fragrantis acuti.

PIPER Indicum,

Capsicum.

PISTACIA.

PITYUSA,

Esula minor.

PIX Burgundica

Ex albido ad citrinum colorem vergat; mollis, & pinguis sit in modum ceræ, odore non ingrato.

PIX navalis.

PIX nigra, cujus loco navalis adhiberi solet.

PIX Refina,

Resina pinea.

PLANTAGO angustifolia,

Quinquenervia.

PLANTAGO latifolia.

PLUMBUM.

POLII montani Summitates floridæ.

POLYGONATUM latifolium,

Sigillum Salomonis Officinarum.

POLYGONUM majus,

Centinodia.

POLYGONUM minus,

Herniaria.

POLYPODII querni Radix.

POLYTRICHUM Officinarum,

Trichomanes.

POMA

POMA curtispendula fragrantia.

POMPHOLIX

Quod raro inveniri soleat, ejus loco Tuthia adhibetur.

POPULI Gemmæ, sive Oculi.

PORRI sativi Radix.

PORTULACA sativa, seu latifolia.

POTENTILLA.

PRASSIUM album,

Marrubium album vulgare.

PRIMULA veris flore luteo simplici.

PRUNA Damascena.

PRUNELLA,

Consolida minor.

PRUNI silvestris Flores, & Fructus.

PSYLLII Semen.

PULEGIUM vulgare, seu latifolium.

PULMONARIA arborea,

Lichen arboreus.

PULMONARIA maculosa latifolia.

PUMEX.

PUNICA,

Malus Granata.

PYRETHRUM

Sit ponderosum, fractu difficile, sapore acerrimo.

PYROLA rotundifolia major.

Q UERCULA,
Chamædrys.

QUERCUS.

QUIN-

QUINQUEFOLIUM.

QUINQUENERVIA.

R

RADICES quinque Aperientes Officinarum:

Apii dulcis,

Asparagi,

Brusci,

Fœniculi,

Petroselini.

RANARUM Sperma.

RANÆ aquaticæ.

RANUNCULUS minor,

Chelidonium minus.

RAPÆ sativæ Radix, & Semen.

RAPHANI hortensis Radix, & Semen.

RAPHANI rustici Radix.

RAPUM Terræ,

Arthanita.

REGINA Prati,

Ulmæ.

RESINA pinea.

RESTA Bovis,

Anonis.

RHABARBARUM, Rha, vel Rheum

Sit grave, odorum, sine carie, intus versicolor, rubrisque intermistis venis ad carneum colorem accedens, quod salivam croceo colore mansum intingat, & gustu subamarum, ac stypticum percipiatur. Dosis

a scrupulis duobus ad quatuor.

RHABARBARI Monachorum Radix:

RHAPONTICUM

Adhibendum est Orientale, vel Thracicum, faciem habens Rhabarbari, magis tamen oblongum, & rufum, minusque crassum. Levi quadam acritudine, amaritie, lentore, & astrictione gustum afficit, atque in eo transversim secto circuli radiati cernuntur.

RHEUM, V. Rhabarbarum.

RHUS Obsoniorum, V. Sumach.

RIBES Officinarum,

Ribesii Fructus ruber.

RICINUS,

Cataputia major.

ROSA alba.

ROSA Damascena.

ROSA pallida.

ROSA rubra.

ROSA silvestris, seu canina,

Cynorrhodon.

ROSMARINUS.

RUBI Idæi spinosi Fructus, qui *Frambæsia* vulgo appellantur.

RUBI vulgaris Fructus, Mori silvestres dicti.

RUBIÆ Tinctorum Radix.

RUMEX,

Lapathum acutum.

RUSCUS,

Bruscus.

UTA Capraria,

Galega.

RUTA hortensis latifolia.

RUTA muraria.

S

SABADILIA;

*Sabadilli,**Sabaidilla.*

In folliculo Delphinii siliquæ non multum absimili;
triquetro, subrufo continentur Semina tria oblonga,
nonnihil curva, extrinsecus nigra, intus albida, sa-
poris acris, & amari.

SABINA.

SACCHARUM album,

rubrum,

candum, vel cantum.

SAGAPENUM

Optimum est, quod purum, nitidum, & in guttas
concretum, extrinsecus fulvas, intus albidas, sapore
acri, odore gravi, & alliato.

SAL Ammoniacum, vel Armoniacum

In superficie cineraceum, intus crystallinum, can-
didum purum, & siccum, gustu salsum, & pera-
cutum.

SAL commune.

SAL gemmæ.

SAL marinum,

Sal commune.

SAL Nitri,

Nitrum.

Nitrum.

SALIX Amerina,

Agnus castus.

SALIX vulgaris alba arborescens.

SALSA Parilla

Sit flexilis, non cariosa, nec pulverulenta dum frangitur; & assulatim facile scindatur; cujus substantia candida, parvumque meditullium. Quæ crassior est maxime probanda.

SALVIA hortensis.

SALVIA vitæ,

Ruta muraria.

SAMBUCUS vulgaris:

SAMBUCUS humilis,

Ebulus.

SAMPSUCUS,

Majorana vulgaris.

SANDARACA Arabum, V. Juniperi Gummi.

SANGUIS Draconis.

In grumos puros, lucidos, fragiles, & admodum rubicundos hoc Gummi concretum sit.

SANICULA Officinarum.

SANICULA Alpina,

Auricula Urfi.

SANTALUM, vel Sandalum album:

SANTALUM citrinum

Eligendum est solidum, ponderosum, sine carie, subflavum, & odoriferum.

SANTALUM rubrum

Solidum sit, densum, grave, in aqua subsidens, ru-

bicundo colore obscuro : idemque mansum nec gustu dulce sit, nec salivam intingat.

SANTONICUM

Mundum sit, recens, pallidum, & subviride, gravi odore aromatico, sapore acri & amaro.

SAPONARIA vulgaris, seu lævis.

SARCOCOLLA

Gummi leve, friabile, spongiosum, lucidisque micis intermixtum, gustu subamarum, cum quadam dulcedine. Quod recens pallidum est, vetustum non-nihil rubet.

SARSA Parilla, V. Salsa Parilla.

SASSAFRAS.

Ligno præcellit Radix, quæ cortice extrinsecus cinereo, intus rubro obtegatur. Ipsa autem lignosa Radix ponderosa sit, subrufa, Foeniculi odorem spirans, sapore subdulci, & subacri.

SATIRII Radix.

SATUREJÆ fativæ Summitates.

SATURNUS,

Plumbum.

SAXIFRAGÆ Radix.

SCABIOSA vulgarismajor.

SCAMMONIUM

Syriacum, seu ex Alepo delatum cæteris præstantius habetur; sitque purum cinerei obscuri coloris, lucidum, leve, friabile, resinofum, subamarum, graveolens; idemque madidis contrectatum digitis albescat. Illud rejiciendum, quod acre admodum sit, nigrum, durum, fractu contumax, & ponderosum.

Exhi-

Exhibetur a granis decem ad quindecim.

SCARIOLA.

SCHŒNANTHUM.

Eligantur Flores, vel Summitates floridæ, carnei coloris, odoris suavis, & cum incalescunt, resinosi, saporis acris subamari.

SCILLÆ vulgaris Radix.

SCINCUS Marinus

Cum Lacerta viridi quamdam habet similitudinem; sed magis exiguum, atque oblongum Scinci caput est, rostrum acutius, dorsum latius, & squamosa cute argentea tectum, quæ transversis subnigris zonis passim distincta est.

SCLAREA.

SCOLOPENDRIA;

Lingua Cervina.

SCORDIUM.

SCORPIONES.

SCORZONERA latifolia sinuata, seu Hispanica.

SCROPHULARIÆ majoris nodosæ Radix.

SCROPHULARIA minor,

Chelidonium minus.

SEBESTEN.

Pruno similis Fructus hic eligatur recens, carnosus, subdulcis, & nigricans.

SEBUM, vel Sevum

Bovinum,

Cervinum,

Hircinum,

Ovillum.

SE-

SEDUM majus,
Sempervivum majus.

SEDUM minus.

SEDUM minimum,
Vermicularis.

SEMEN Badianum, V. Anisum stellatum.

SEMEN sanctum, V. Santonicum.

SEMINA quatuor calida majora Officinarum:

Anisi,
Cumini,
Carvi,
Foeniculi.

SEMINA quatuor calida minora:

Ammeos,
Amomi,
Apii hortensis,
Dauci.

SEMINA quatuor frigida majora:

Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonis.

SEMINA quatuor frigida minora:

Cichorii,
Endiviæ,
Lactucæ,
Portulacæ.

SEMPERVIVUM.

SENN A Orientalis

Integra sit, munda, tactu lævis, nec maculata, nec
pulverulenta.

SEPIÆ

SEPIÆ Os.

SERICI Folliculi.

SERPENTARIÆ majoris Radix.

SERPENTARIA Virginiana

Valde odorata est, russeo colore diluto, sapore acri subamaro. Quæ vetustate, aut corruptione nigruit, & multum odoris amisit, repudianda.

SERPILLUM vulgare.

SERTULA Campana,

Melilotus.

SESELI Massiliense

Angulosum Semen ad Fœniculi formam accedens, odoris grati, saporis acris aromatici.

SIGILLI Salomonis Radix.

SILERIS montani Semen.

SILQUA edulis,

Caroba Officinarum.

SIMAROUBÆ Cortex, & Lignum.

Corticis superficies inæqualis, vel aspera est; pallidus color, qui ad subflavum vergit; idemque fibrosus Cortex, inodorus, & subamarus est, a subiecto Ligno candido, levissimoque facile separabilis.

SINAPI Semen.

SISYMBRIUM aquaticum,

Nasturtium aquaticum.

SMILACIS asperæ Radix.

SMILAX aspera Peruana, V. Salsa Parilla.

SOL,

Aurum.

SOLANUM Officinarum acinis nigricantibus, seu hortense.

SOLA-

SOLANUM vesicarium,

Alkekengi.

SONCHUS asper,

Cicerbita aspera.

SONCHUS lævis,

Cicerbita lævis.

SORBI sativæ Fructus.

SPARTIUM arborescens,

Genista juncea.

SPERMA Ceti

Sit recens, candidum, tenerum, pingue, ex nitidis
squamulis conflatum, non rancidum, nec flavum.

SPERNIOLO,

Ranarum Sperma.

SPICA Celtica.

SPICA Nardi, V. Nardus Indica.

SPICA vulgaris,

Lavandula.

SPINA acida,

Berberis.

SPINA Cervina, seu infectoria,

Rhamnus Catharticus.

SPINA solstitialis,

Carduus stellatus.

SPINACHIA vulgaris.

SPONGIA marina.

SPONGIA Rosæ silvestris.

STANNUM,

Jupiter.

STAPHISAGRIA

Semen

Semen fere triquetrum, subnigrum, asperum, intus albidum, aut flavescent, valde amarum, acerrimum-que.

STELLARIA.

STIBIUM,

Antimonium.

STŒCHAS Arabica.

Eligenda hæc Spica florida, odorata, saporis subacris, subamari.

STROBILI, V. Coni.

STYRAX Calamita

Sit purus, pinguis, resinofus, rufus, albidis micis interstinctus, odore suavi, sapore subacri.

STYRAX liquidus Officinarum

Terebinthina crassior, cinerei coloris, odorisque gravis; licet Styracem Calamitam paullulum redoleat.

SUBER.

SUCCINUM album,

citrinum

Sit purum, & perlucidum, quod festucas, paleasque attrahat, accensumque gratum odorem exhalet.

SUCCISA.

SUCCUS Liquiritiæ inspissatus, V. Liquiritiæ Succus.

SULPHUR nativum, seu vivum.

SULPHUR fufum, seu citrinum.

SUMACH

Racemosus fructus baccis, seu acinis rubris constans, acidi saporis, quibus inclusum est semen prædum, planum, coloris fere spadicei.

SYMPHYTUM maculosum,

H

Pulmo-

Pulmonaria maculosa latifolia.

SYMPHYTUM majus,

Consolida major.

SYMPHYTUM medium,

Consolida media.

SYMPHYTUM minimum;

Bellis minor.

SYMPHYTUM minus,

Prunella.

T

TABACUM.

TACAMAHACA

Sicca, resinosa, rufa, nitida, albidisque micis distincta, suaveolens, & aromatica.

TAMARINDI

Plurimis fibris intertexti sunt, cum ossiculis duris fere quadratis, & lucidis. Sint recentes, teneri, rufi obscuri coloris, saporis subacidi vinosi.

TAMARISCUS.

TANACETI vulgaris lutei Flores.

TAPSI barbati Flores.

TARAXACUM,

Dens Leonis.

TARTARUM album;

rubrum.

TEREBINTHINA

Ceteris præstantior Chia, vel Cypria, quæ Nostrate crassior est, pura, translucida, ex flavo colore ad viridem,

- dem, vel cæruleum vergens, odorata, & subacris.
 TERRA Japonica, V. Catechu.
 TERRA Lemnia,
 Terra sigillata.
 TESTUDO terrestris.
 THLASPI, vel Thlaspios Semen.
 THE, vel Thea.
 THUS, V. Olibanum.
 THYMELÆÆ Radix
 Adhibetur Romana, extrinsecus rufa, intus albida,
 ex mollibus lanuginosis fibris conflata.
 THYMUS vulgaris.
 TILIÆ feminae folio minori Flores.
 TITHYMALUS folio Pini,
 Esula minor.
 TORMENTILLÆ Radix.
 TRAGACANTHUM
 Sit album, lucidum, leve, gracile, vermiculatum.
 TRAGOPOGON,
 Barba Hirci.
 TRIBULUS terrestris.
 TRICHOMANES.
 TRIFOLIUM acetosum;
 Acetosella.
 TRIFOLIUM fibrinum.
 TRIFOLIUM hepaticum;
 Herba Trinitatis.
 TRIFOLIUM odoratum,
 Melilotus vulgaris.
 TRIAGO,

Chamædrys.

TUNICA,

Caryophyllus hortensis.

TURBITH, seu Turpethum.

Crassa hæc Radix, & resinosa sit, extrinsecus fusca, intus albida, fractu contumax, non cariosa. Dosis a Drachma dimidia ad drachmam.

TUSSILAGO,

Farfara.

TUSSILAGO major,

Petasites major vulgaris.

TUTHIA

Ponderosa, & fractu difficilis, ex cinereo ad cæruleum colorem vergens; convexa ejus pars tuberculis aspera, concava lævis, gustu acris, odore nullo. Ignita, dein frigefacta nativum colorem retinet.

TYPHI cervini,

Tenella, & lanuginosa Cervorum Cornua.

V

V

ALERIANÆ silvestris Radix.

VANILLA, vel Vanilia.

Pinguis sit, gravis, mollis, flexilis, odoratissima, jucundi, & subacris saporis, nigra, & lucida semina includens.

VENUS,

Æs.

VERATRUM,

Helleborus.

VERBASCULUM,

Primula veris.

VER-

VERBASCUM mas latifolium luteum,

Tapfus barbatus.

VERBENA vulgaris.

VERMES terrestres.

VERMICULARIS,

Sedum minimum.

VERONICA mas supina vulgatissima.

VERONICA aquatica,

Beccabunga.

VINCA Pervinca.

VINCETOXICI Radix.

VIOLA Martia flore simplici odore,

Violaria.

VIPERARIA,

Scorzonera.

VIPERÆ.

VIPERINA Radix, V. Serpentaria Virginiana.

VIRGA aurea vulgaris latifolia.

VISCUS quernus

Sit ponderosus, fusca superficie, intus ex flavo ad
rufum colorem inclinans, & radiatus.

VITEX,

Agnus castus.

VITIS alba,

Bryonia alba.

VITRIOLUM album,

cæruleum, seu Cyprium,
viride.

ULMARIA.

ULMI Cortex, Folia, & Liquor Vesicularum.

UN-

UNGULA Alcis.

UNICORNU, vel Cornu fossile

Cortex subcinereus, vel subniger, durior medulla,
quæ ex laminis composita, albida, friabilis est instar
ossis usti, & linguæ facile adhæret.

UNIONES, V. Margaritæ.

URTICA urens major, & minor.

URTICA iners flore albo.

URTICA iners flore purpureo.

UVÆ passæ.

VULPES.

X

XYLOALOE, V. Lignum Aloes.

XYLOCASSIA, V. Cassia lignea.

XYLON,

Bombax Officinarum.

Z

ZEDOARIA

Radix tuberosa, extrinsecus cinerea, parum rugosa,
intus subrufa, resinosa, lucida, saporis acris tuba-
marum, odoris ad Caphuram accedentis.


ZINZIBER, vel Zingiberi

Radix nodosa, odorata, resinosa, saporis acris pi-
perati. Deligatur solida, & fractu contumax.

ZIZYPHA,

Jujubæ.

PHAR-



PHARMACOPŒÆ TAURINENSIS PARS ALTERA,

*In qua Medicamenta Preparandi, & Componendi
Ratio traditur.*

CAPUT I.

De Simplicium quorundam Medicamento-
rum Præparatione.

§. I.

Quæ Purgatione Præparanda sunt.

PINGUEDINES



Membranis expurgatæ diligenterque ablutæ
minutim conciduntur : in fictile liquefiant
igne lenissimo ad humoris aquosi exhalatio-
nem : tum percolatæ, & in figlino, vel vitreo vase
repositæ frigido loco ferventur.

ŒSY-

Æ S Y P U S.

Lana recens sub collo, alis, & coxis Ovium defatigatarum detonsa in aquam calidam mergatur ad extrahendam Pinguedinem : expressione facta aquam ex alto effunde de uno vase in alterum. Cum spuma subsideat, innatantem Adipem collige, idoneo vase reponendam : idque toties repete, donec Pinguedinem supernatare nullam videas ; que tandem omnis coacta evaporet q. s. & percoletur.

SERUM LACTIS

Cum Ovi Albumine agitato mistum paulisper bulliat ; tum addito Succo Limónis, vel Crystallo Tartari, quantum satis sit, etiamnum ferveat aliquantulum, deinde quiescat : mox panno percoletur. Serum quoque sine acido, tantumque Albumine Ovi adhibito purgari potest, quod postea per chartam trajiciendum.

A L U M E N

Aqua communi solvatur : Solutio per chartam bibulam trajecta ad cuticulam evaporet : tum in cella vinaria reponatur, ut fiant Crystalli.

Simili modo purgantur

Nitrum,

Sal ammoniacum,

Sal marinum,

Vitriolum album, cujus tamen produ-
ducenda est evaporatio ad siccitatem.

BOLUS

BOLUS ARMENIA.

Bolum in pulverem tritam mortario marmoreo inde: aquam affunde, & pistillo agita, ut turbida evadat: hanc in fictile defunde: recentem aquam superstiti Bolo adde, & subige: iterum defunde: eandemque operam toties repete, donec fæx sola cum arenulis remaneat: tum ab aquis effusis, quæ subsidit, in Pastillos Bolum redige, in umbra siccandos.

Similiter prepara

Cinnabarim nativam,
Cretam,
Lithargyrum,
Terram Lemniam.

Nota. Cinnabaris in vas vitreum indita, igne arenæ per gradus adhibito, una, atque altera sublimatione purgari quoque potest.

CATECHU

Pulveratum, aqua identidem adjecta, in mortario subigatur, quæ, cum bene saturata fuerit, in fictile per inclinationem effundatur. Remanenti materiæ addita recente aqua, attritio, & effusio tandiu itere-
tur, donec solæ fæces, & arenulæ in fundo pilæ relin-
quantur. Tum aquæ illæ omnes, postquam reside-
rint, in vas terreum defundantur, & M. B. in Extra-

66 DE SIMPL. MEDICAMENTORUM

eti consistentiam evaporent: cui deinde materia in fictile relictæ adjiciatur: factæque humoris aquosi exhalatione fingantur Morselli in umbra siccandi.

Sic purgatur Labdanum.

HYDARGYRUS,

Cujus purificandi modus duplex est;

- I. Per corium forti espressione semel, iterumque trahitur;
- II. Hydrargyrum cum æquali pondere Scobis Ferri in retortam terream loricatam immitte, apppositoque excipulo amplo aqua semipleno distillationem institue, ignem ad eum gradum sensim augendo, ut retortæ fundus candeat: in quo gradu insiste, donec Mercurius in excipulum stillare desierit: tum refrigeratis vasis aquam effunde: Mercurium lineis pannis exsicca.

TARTARUM.

R Tartari albi libram unam.
Aquæ communis libras viginti.
Aquæ ferventi in olla terrea vitreata pulveratum Tartarum per partes injice, postea cum Ovi Albumine agitato decoque, donec fæces concreverint: Liqueorem adhuc fervidum per pannum cola, & vasi ligneo inditum in cella subterranea repone, ut fiant Crystalli,

stalli , quæ exemptæ calido loco siccentur.

§. I I.

E X S I C C A N D A :

M I L L E P E D Æ

Viventes, & probe sordibus, sine ablutione, deterfæ
figulino vasi indantur, quod raro linteo circumli-
gato operiatur: idemque vas inversum alteri apte-
tur vasi Vinum continenti, cui ignis supponatur.
Vini vapore suffocatae Millepedæ tepido loco pri-
mum siccandæ sunt, deinde in vitreo vase clausæ
servandæ.

Sic preparari possunt

Apes,
Cantharides,
Lumbrici terrestres:

V I P E R Æ

Rescisso capite, detractisque exuviis, & intestinis
filo suspendantur, ita ut altera alteram non attingat:
tum bene siccatae interpositis Rutæ, vel Absinthii
Foliis in lignea capsula recondantur.

H E R B Æ

Colligendæ paullo antequam florescant: tum ea-
rum

68 DE SIMPL. MEDICAMENTORUM

rum Folia , & Cymæ siccentur : postea in facculis chartaceis , vel potius ligneis capsulis loco sicco servantur.

F L O R E S

Collecti dum explicantur , & a calycibus , cum opus sit , mundati siccentur . Qui odoriferi sunt in vitreis vasis bene clausis , ac cæteri in ligneis includantur.

R A D I C E S

Extrahendæ sub veris , aut hiemis initium , detrahitisque fibrillis , & lignoso medutullio siccandæ.

N. Plantæ , vel earum partes , quæ admodum crassæ , humidæ , aut succo viscoso præditæ sint , in sole , vel calido loco , cæteræ in umbra siccentur.

S C I L L A

Ab aridis tunicis , & a radiculis ligneo cultro mundetur : atque ejus lamellæ lineo filo transfixæ , parvisque intervallis singulæ a singulis sejunctæ appendantur in aere aperto , & modice siccentur.

S P O N G I A

Filo arctissime circumligata sub calidis cineribus tamdiu detineatur , dum bene compacta sit , densa , & prorsus siccata.

V I T R I O L U M

Supra chartam positum in sole , vel hypocausto
siccetur ad albidinem .

§. I I I .

P U L V E R A N D A .

C O R N U C E R V I .

S Cobis Cornu cervini in mortario conteratur : po-
stea cribro serico denso trajectus Pulvis in vasculo
reponatur .

Similiter pulverantur

Cranium humanum ,

Dentes Apri ,

Ebur ,

Mater Perlarum ;

Ungula Alcis .

N. Pulverandi Cornu cervini alia quædam usitata ra-
tio est . Frustatim nempe dissectum mollitur , & fria-
bile fit aquæ ferventis vapore . Solet autem in distil-
latione aromaticarum Herbarum ad summam cam-
panæ partem appendi . Ita scilicet Cornu Cervi phi-
losophice præparatum , appellatur , quod in album
subtilemque Pulverem percommode redigitur .

C O L O C Y N T H I S

Forfice minutatim concisa , & contusa imbuatur
muci-

70 DE SIMPL. MEDICAMENTORUM

mucilagine Tragacanthi, tum siccetur: hinc teratur: quod toties repetendum, donec pulverari facile queat.

Eadem ratio est pulverandi

Nardum Indicam,
Polium montanum,
Radicem Althææ,
Schoenanthum,
Viperas &c.

CROCUS MARTIS Rore majali.

In patina terrea positam Ferri Scobem irriga Rore majali, & in massam redige: hanc in umbra repone, ut siccetur, & rubiginem contrahat: tum in pulverem tere, & rore iterum affuso sicca: denuo tere, eandemque operam toties repete, donec omnino Ferrum in rubiginem conversum sit.

P L U M B U M.

R Plumbi in frustula divisi . . . unciam unam;
Salis marini puri, ac triti . . . uncias tres:

In mortario æneo commisce, Aquæ communis tantillum adjiciendo, ut in formam pultis redigantur: tum leviter ducto per mortarium pistillo tamdiu contere, donec Plumbum in pulverem penitus redactum sit: aqua calida abluere, & supra chartam sicca.



LÆVIGANDA:

CORALLIA

A Blutione prius mundata, siquidem opus sit, pulverentur: dein super porphyrite aspersa identidem aqua in pollinem lævigentur; fiantque Morselli supra chartam in umbra siccandi.

Ita lævigentur

Crocus Martis,
Hæmatites,
Hyacinthus,
Margaritæ,
Oculi Cancrorum,
Scobis Ferri,
Succinum,
Unicornu fossile, & similia.

LAPIS CALAMINARIS

Ignescat in olla terrea; tum in aqua extinguatur: postea siccatus, & in pulverem tritus super porphyrite, aquam instillando, lævigeretur.

Ad eandem normam præparentur

Magnes,
Pumex,
Tuthia.

TORREFACIENDA.

RHABARBARUM

FRustatim incisum supra laminam ferream, cui lenis suppositus ignis sit, spatha versando, lente assetur, donec humore absumpto aliquantulum nigrescere incipiat.

Similiter torrefiant
Myrobalani,
Opium.

SAL MARINUM

Pulveratum, & in figulino vase positum igni trade: spatha assidue versa, dum crepitare desinat: tale idcirco Sal decrepitatum appellatur.

URENDA.

CORNU CERVI

IN frusta dissectum, & patinæ terreae inditum in fornace detineatur, donec albescat: tum in porphyrite, Aquam sensim instillando, diligentissime lævigerur.

Similiter

Similiter ex Ebore paratur Spodium.

S P O N G I A

A lapillis, & sabulo purgata in vase terreo bene obturato fere in carbonem aduratur: tum in hypocausto servetur.

Simili modo comburantur

Cancris fluviatiles,
Erinacei,
Os Sepiæ,
Suber.

T A R T A R U M

Charta madida involutum, & prunis impositum ad albedinem uratur.

§. VII.

I N S U C C A N D A.

A L O E

PUlverata cum triplo Succis Rosarum pallidarum defæcati, vel Succis Violarum recens expressi fictili indatur, & incalido loco reposita quandoque subigendo paulatim siccetur.

K

SCAM-

SCAMMONIUM

Pulveratum ponatur in figulino vase vitreato : tum addito Succo Cydoniorum expurgati duplo fiat evaporatio ad eam consistentiam, ut fingi possint Trochisci in umbra siccandi.

Exhibetur a granis decem ad viginti.

SCAMMONII PRÆPARATIO ALTERA.

R Scammonii Syriaci uncias sex,
 Decocti uncia unius Radicis Liqui-
 ritiae mundæ, & siccatae. libram unam:
 Commisceantur, & evaporent ut supra.
 Dosis eadem.

CAPUT II.

DE SUCCIS.

§. I.

EX HERBIS.

SUCCUS ABSINTHII

Absinthium vulgare recens in pila lapidea bene contundatur pistillo ligneo : tum sacculo ex cannabina tela inclusum torculari fortiter exprimatur. Expres-
 sus Succus per chartam bibulam, & arenam lotam, & siccam trajiciatur.

Simi-

Similiter extrahantur, & depurgentur Succ

Arthemisiæ,
Beccabungæ,
Ederæ terrestris,
Erysimi,
Galegæ,
Melissæ,
Menthæ,
Scordii, &c.

SUCCUS ACETOSÆ.

Acetosa in mortario marmoreo contusa ad horas duodecim in vase fictili maneat: dein prælo compri-
matur. Si statim adhibendus sit Succus, per chartam
trajiciatur; si vero conservandus, insoletur; tum
percolatione purgetur, & in vase vitreo colli oblongi,
angustique orificii, superfuso Olei modico, repona-
tur in cella vinaria.

Eadem norma extrahantur, & purificentur Succ

Acetosellæ,
Solani,
& similium:

SUCCUS BORRAGINIS.

Recens Borrago minutim concisa modice calefiat:
tum forti compressione extrahatur Succus, qui post-
quam ad ignem paulisper efferbuerit, panno perco-
letur.

*Eadem servetur norma in extrahendis ,
purgandisque Succis*

Buglossi ,
Consolidæ majoris ,
Malvæ ,
Mercurialis , &c.

SUCCUS CICHORII.

Ex Cichorio contuso forti expressione eliciatur Succus, qui vasi vitreo inditus calefiat M. B., & cum adunari fæces inceperint , per pannum trajiciatur .

Sic elici, & defecari possunt Succis

Agrimoniæ ,
Consolidæ minoris ,
Endiviæ ,
Taraxaci , &c.

SUCCUS COCHLEARIÆ.

Cochleariam sub lucis ortum collectam minutim incide , & paullulum contusam sacculo include : prælo exprime Succum, per chartam illico trajiciendum :

Pari modo eliciantur , & purgentur Succis

Cherefolii ,
Erucae ,
Nasturtii aquatici ,
Rutæ , &c.

§. II.

EX FLORIBUS.

SUCCUS FLORUM PERSICORUM.

R Florum Mali Persicæ libras viginti,
Aquæ communis libras quatuor:

In amplo vase incalescant Flores lignea spatha versando, & aquam identidem inspergendo: tum prælo depromatur Succus, loco tepido ad fermentationem reponendus. Cum fæces subsiderint per pannum coletur, & in lagena vitrea oblongi colli, angustique oris, admisto pauculo Vini Spiritu, atque ad duos tranversos digitos superfuso Oleo recondatur.

Similiter eliciendus, ac servandus

Succus Rosarum pallidarum,
Violarum.

SUCCUS ROSARUM RUBRARUM.

Rosas rubras calycibus, & unguiculis detractis in sacculo include: aqua fervente submerge: postea sacculum suspensum tamdiu detine, dum aqua subviridis effluere desierit, & rubra extillare incipiat. Tum prælo subjice sacculum; atque expressum Succum, siquidem servare velis, ad solem fermentescere finito: deinde percola, affusoque Oleo in vase vitreo serva.

SUC-

SUCCUS FLORUM TUNICÆ.

R Florum Tunicæ demptis calycibus,
 & unguibus libras duas,
 Aquæ communis libram unam:
 Indantur Flores vasi circulatorio, & superfusa aqua
 fervente vas confestim obtegatur: facta ad horas sex
 maceratione prælo exprimatur Succus panno perco-
 landus.

SUCCUS FLORUM VIOLARUM.

Flores Violarum ablatis calycibus in fictile vitreato
 paullulum calefiant M.B., postea torculari exprimatur
 Succus.

*Sic paretur Succus Florum Borraginis, &
 Buglossi.*

§. III.

EX FRUCTIBUS.

SUCCUS BACCARUM EBULI.

B Accæ probe mundatæ, ac tela involutæ prælo com-
 primantur primum leniter, & sæpe, tum valide.
 Elicitus Succus, & in vase vitreo positus M. B. calefiat,
 & panno percoletur.

*Similiter elice, ac defeca Succos
 ex Baccis Rhamni Cathartici,
 Sambuci.*

SUC-

SUCCUS DE BERBERIS.

In mortario lapideo hi Fructus contusi mancant ad horas aliquot; dein prælo committantur. Expressus Succus, ac tepido loco, vel insolatione fermentatus, e chartaceo colo percoletur, Oleoque superfuso servetur in vase vitreo.

Ad eandem normam educantur, &

asserventur Succi

ex Acinis Granatorum,

Moris,

Prunellis silvestribus } immaturis,

Uvis,

Ribese,

Rubo Idæo.

SUCCUS CITRI.

Ex acida Medulla Citri demptis seminibus exprimatur Succus, qui statim panno percoletur; vel prius ad solem fermentatus a fæcibus expurgetur.

Sic eliciatur, & depurgetur Succus

Aurantiorum,

Limonum.

SUCCUS CYDONIORUM.

Cydonia Mala derafa, seminibus detractis, fictili vitreato inde, & ad horas viginti in cella reponetur

tum Succum prælo exprime : insola : hinc percolatum superfuso Oleo conserva.

Similiter parandus Succus

Pomorum , &

Cucumeris agrestis contusi.

§. IV.

EX RADICIBUS.

SUCCUS RADICUM FŒNICULI.

MUndatæ , & contusæ Radices valide comprimantur. Succus prolectus chartaceo colo depurgetur.

Ita educantur , & defæcentur Succ

ex Radicibus Helenii ,

Petroselini ,

Peucedani ,

*Raphani radice tantum
derasa .*

SUCCUS RADICIS GRAMINIS.

Ablutæ Radices bene contundantur : tum prælo valide exprimatur Succus , qui M. B. paulum calefactus lineo panno percoletur .

Similis ratio est parandi , purgandique Succos

ex Radicibus Cichorii ,

Ebuli , &c.

SUC-

SUCCUS RADICIS IRIDIS.

Iridis Radices mundatæ , & rite contusæ prælo committantur. Elicitus Succus, vasque vitreato inditus in loco frigido maneat, donec fæx albida subsiderit: tum Succum defunde, quo percolato utere; Fæculam vero in umbra siccatam serva.

*Similiter parari possunt Succo, &
Fæculæ ex Radicibus Ari,
Bryoniæ.*

SUCCUS SCILLÆ.

Scillæ recentes farina subacta singulæ obducantur, & in furno, vel sub calidis cineribus coquantur, quæ satis assæ fuerint, cum indita festuca facile in eas penetraverit. Hinc dempta omni crusta in pila lapidea molliter tundendæ sunt: postea in vitreo vase inclusæ tepido loco reponendæ, donec fermentescere incipiant: tum prælo exprimendus Succus, & percolandus.

C A P U T I I I.

D E I N F U S I S.

§. I.

EX AQUA.

INFUSUM CARMIMANS OFFICINARUM.

Rx Seminum Caryi,

I

Fœ

Fœniculi ana unciam unam;
 Florum Chamæmeli,
 Meliloti ana manipulum unum;
 Aquæ communis libras quatuor:
 Vasi oris angusti inditis affundatur Aqua fervens: tum
 vase operto fiat maceratio: refrigeratus Liquor per-
 coletur, & ad usum fervetur.

INFUSUM GLYCYRRHIZÆ.

R Radicis Glycyrrhizæ recentis in-
 cisæ cortice derafo uncias duas,
 Aquæ calentis libras tres:
 Horæ spatio macera, tum cola.

INFUSUM SENNÆ.

R Foliorum Sennæ mundæ uncias duas,
 Cryſtalli Tartari Semunciam,
 Aquæ communis libras duas:
 In fictile vitreato ponantur Sennæ Folia, & affusa Aqua
 fervente, in qua solutæ fuerint Cryſtalli Tartari, ma-
 ceratio fiat ad horas sex. Tinctura levi expressione
 percoletur.

N. Commode ad hunc locum referri videntur Mu-
 cilagines, quæ parantur ex infusis in Aqua Vegeta-
 bilibus ijs, quorum glutinosa substantia sit. E. G.
 si Radicis Althææ, aut Consolidæ majoris Mucila-
 ginem conficere vis, paullulum contusæ, & incisæ
 Radici pondere libræ unius affunde Aquæ ferventis li-
 bras

bras quatuor : ac subinde agitando macerari sine, donec Aqua crassescat: tum leniter exprimendo percola.

Ad extrahendam Mucilaginem Seminum Cydoniorum hæc integra q. s. digerantur in Aquæ decuplo, deinde Liquor raro panno percoletur. Qui spissiore[m] volunt Mucilaginem, vel Seminum quantitatem augeant, vel Aquæ imminuant.

Eodem modo parabis Mucilagine[s]

Seminum Fœni Græci,

Lini,

Psyllii,

Sumach.

§. II.

EX VINO.

VINUM ABSINTHITES.

R Summitatum floridarum Absinthii vulgaris, quas prius in umbra siccaveris, . . . unciam unam,
 Radicis Acori incisæ semunciam,
 Vini albi libram unam,
 & semis :

In vitreo vase probe clauso ad horas duodecim digere, exprime, & cola.

VINUM EMETICUM.

R Croci Metallorum triti uncias quatuor;
 L 2 In-

Vini albi optimi libras quatuor:
 Infunde in vitreo vase clauso, atque ad dies aliquot identidem agita: tum serva; & cum eo uti velis, per chartam trajice. Dosis ab unciis duabus ad tres.

VINUM ENULATUM.

R Radicis Helenii incisæ, & ficcatae uncias duas,
 Vini albi generosi libras quatuor:
 In matraccio rite occluso per diem, noctemque digere:
 refrigeratum Liquorem exprime, & percola.

§. III.

EX ACETO.

ACETUM SATURNI.

R Cerussæ pulveratæ, vel Lithargyri
 præparati libram semis;
 Aceti acerrimi libras quatuor:
 In vase vitreo ad dies octo digere: tum Acetum per chartam cola.

ACETUM ROSACEUM.

R Rosarum rubrarum, quæ in umbra
 ficcatae sint uncias tres;
 Aceti libras duas:
 Digerantur in vase vitreo operculato sex dierum spatio
 postea

postea exprimatur, & percoletur Acetum.

Non absimili modo paratur Acetum

Ex Foliis Rutæ,
Floribus Sambuci.

ACETUM SCILLITICUM.

R Scillæ exsiccatæ, & concisæ . . libram unam;
Aceti acerrimi Vini albi . . libras octo:
Dies quindecim in lagena vitrea probe clausa digere;
leniter exprime, & cola.

C A P U T I V .

DE DECOCTIS.

§. I.

S I M P L I C I A .

DECOCTUM CORNU CERVI.

R Scobis Cornu Cervi uncias tres;
Aquæ communis libras quatuor:
Ad sextæ partis exhalationem fervefacito; postea Deco-
ctum cola.

N. Si Gelatinam Cornu cervini parare vis, Decoctum
eatenus ebullire finito, ut Aqua vaporet fere ad ter-
tias: tum expressione Decoctum cola, & admisce
Ovi

Ovi Albumen agitatum ,

Sacchari albi unciam unam , & semis ;

Succi Limonum , vel Cryſtalli Tartari paullulum :

Post brevem ebullitionem panno Liquorem trahice , & in frigido loco reponere , ut concreſcat .

*Similiter parabis Decoctum Eboris ; tum
ejus Gelatinam evaporatione ad medias
fere producta .*

DECOCTUM HORDEI.

R Hordei mundi uncias duas ;
Aquæ communis libras tres :
Ad tertiæ partis evaporationem decoque ; postea cola :

§. II.

COMPOSITA.

DECOCTUM LIGNORUM STIBIATUM.

R Scobis Ligni Guajaci uncias duas ;
Corticis ejusdem contusi ,
Radiciſ Sarsæ parillæ minutim inciſæ ana unciam
unam , & semis ,
Sassafras in particulas ſecti unciam unam ,
Antimonii confracti ,
Pumicis ana uncias tres ,
Aquæ communis libras duodecim :

Gua-

Guajaci Lignum, Corticem, & Sarsam parillam mitte in vas figulinum vitreatum: Aquam affunde, & Antimonium cum Pumice in panno lineo inclusum ita suspende, ut vasis fundum non attingat. Per noctem infusio fiat: mane ad medias igne lento coque: exprime: cola. Tum Sassafras indito in cucurbitam vitreatam: percolatum fervens Decoctum affunde, & statim operculum impone: macerari finito, donec refrigescat: tandem cola.

DECOCTUM CATHOLICUM SIC DICTUM.

R Radicis Graminis . . . unciam unam, & semis,
 Sarsæ parillæ . . . unciam unam,
 Foliorum Cichorii,
 Agimoniæ,
 Betonicæ,
 Capilli Veneris,
 Pimpinellæ . . . ana manipulum semis,
 Foliorum Sennæ Orientalis,
 Epithymi . . . ana semunciam,
 Radicis Liquiritiæ . . . drachmas duas,
 Seminum Anisi . . . drachmam unam,
 Aquæ communis . . . libras quatuor:

Sarsa parilla, & Gramen ad medias in Aqua bulliant: his adde Glycyrrhizam: tum Herbas incisas. Post levem ebullitionem Decoctum cola. Foliis autem Sennæ, Epithymo, & Seminibus Anisi affunde Aquæ ferventis uncias sex, & sine ad aliquot horas macerari: postea colatum Liquorem cum Decocto commisce.

DE-

DECOCTUM EMOLLIENS OFFICINARUM.

R Radicis Althææ . . . unciam unam ,
 Foliorum Malvæ ,
 Violarum . . . ana manipulum unum ,
 Aquæ communis . . . libras quatuor :
 Herbas cum Radice incisas , ut artis est, decoque : deinde cola .

N. Si carminans idem efficere velis , ad singulas Decocti calentis libras adjice Seminum Carvi semunciam , & Florum Chamæmeli manipulum dimidium : tum operto vase sine ut refrigescat .

DECOCTUM PECTORALE OFFICINARUM.

R Caricarum pinguium incisarum ,
 Jujubarum ,
 Passularum mundatarum ,
 Liquiritiæ ana semunciam ;
 Aquæ communis libras sex :

In aheni, quod stanno obductum sit , coquantur Fructus , usque dum Aquæ tertia pars absumpta sit ; tum vas ab igne remove : Liquiritiam mundatam , & incisam adde : aliquantum macerari finito ; postea Decoctum cola .



CAPUT V.

DE CONSERVIS.

§. I.

EX FLORIBUS.

CONSERVA FLORUM AURANTIORUM.

R Florum Aurantiorum . . . libram unam,
Sacchari albi . . . libras tres:

Flores, demptis calycibus, minutim concisi Saccharo clarificato, & ad tabellarum consistentiam cocto, dein tepefacto, spatula lignea bene miscendo redigantur in Conservam, quæ, spuma exempta, in vascula effundatur tepido loco reponenda, donec crusta in superficie appareat.

Sic parentur Conservæ

Florum Calendulæ,
Chamæmeli,
Lilii Convallium,
Rosmarini,
Salviæ,
Tiliæ,
Tunicæ.

CONSERVA EX FLORIBUS VIOLARUM.

R Florum Violarum ablatis calycibus libram unam,
M Sac-

Sacchari clarificati, & in Electuarium solidum cocti libras tres;

Sacchari pulverati unciam unam:

In mortario lapideo Flores cum Saccharo pulverato in formam pultis contundantur: deinde cum Saccharo clarificato spatha lignea misceantur. Cum paullum bullierint, Conservam ab igne remove.

Eadem methodo conficiantur Conservæ

ex Floribus Betonicæ,

Cichorii:

Item ex Floribus concisis primum, dein contusis

Borraginis,

Buglossi,

Malvæ,

Nymphææ,

Pæoniæ, &c.

CONSERVA FLORUM PERSICORUM.

R Florum Mali Persicæ, rejectis calycibus libram unam;

Sacchari clarificati, & ad penidii consistentiam cocti libras duas:

In pila marmorea optime pinsentur Flores, & cum Saccharo adhuc fervente pistillo ligneo immiscendo cogantur in Conservam.

Sic parentur Conservæ

Rosarum Damascenarum,

Pallidarum.

CONSERVA ROSARUM RUBRARUM.

R Rosarum rubrarum, quæ nondum expansæ sint,
rescissis unguibus bram unam,
Sacchari clarificati, & in Syrupum
crassiozem cocti libras tres:

Rosæ linteo inclusæ mergantur in aqua fervente, & paulisper immersæ maneant: mox in aere suspendantur, donec Aqua stillans rubere incipiat: tum prælo suppositis Floribus eliciatur Succus, qui asservetur. Idem expressi Flores in mortario lapideo contendantur: postea Syrupo permisti decoquantur, spatha lignea indefinenter revolvendo, & Succum expressum paulatim addendo ad justam Conservæ consistentiam.

CONSERVA EX DUPLICATIS ROSIS RUBRIS.

R Rosarum rubrarum mundatarum . . libras duas,
Sacchari albi clarificati, & in Syrupum cocti libras tres:

Ex Rosis, ut supra dictum est, elice Succum: tum magnatis dimidium in pila marmorea rite contusi in ferventem Syrupum injice: brevi bulliant: deinde Succum per partes adjice, & quantum satis, iterum decoque.



§. II.

EX FOLIIS HERBARUM.

CONSERVA ABSINTHII.

R Foliorum Absinthii adhuc teneri. . libram unam,
 Sacchari albi libras duas :
 Folia a caulibus diligenter separata in mortario lapideo
 tundantur : cum Saccharo in modum penidii cocto,
 atque etiamnum tepido probe misceantur .

Sic fieri potest Conserva
Arthemisiæ,
Tanaceti, &c.

CONSERVA ACETOSELLÆ.

R Foliorum Acetosellæ recentis . . libram unam ;
 Sacchari clarificati , & cocti . . . libras duas :
 Minutim concisa Acetosella Saccharo tepefacto accu-
 rate immisceatur .

In Conservam similiter redigi possunt
Cherrefolium ,
Cochlearia,
Eruca ,
Nasturtium aquaticum :



§. III.

EX FRUCTIBUS.

CONSERVA CITRI.

R Pulpæ Citri cum Cortice . . . libras duas,
 Sacchari albi . . . libras tres:

Derafos Citri Cortices inde cucurbitæ capitello instructæ, & M. B. Aquam elice ad uncias circiter duas, quam serva: tum Cortices e cucurbita exemptos una cum Pulpa incisa in sufficienti Aquæ quantitate decoque: per setaceum Pulpam trajice: cum Saccharo in ejusdem decoctione clarificato, & in solidum Electuarium redacto commisce: deinde ad ignem lenem assidue agitando eatenus evaporare finito, ut adjec-tione Aquæ illius, quæ asservata fuit, Conservam habeas justæ consistentiæ.

Similiter confici possunt

Conservæ Aurantium,
 Limonum.

CONSERVA CYDONIORUM.

R Pulpæ Cydoniorum . . . libras duas,
 Sacchari albi . . . libras tres.

Cydoniorum Pulpa demptis seminibus in Aqua decoquatur: per setaceum trajecta, Saccharo in ejusdem decoctione clarificato, & ad tabellarum consistentiam cocto addatur, lenique igne, & continua agitatione

tatione , quantum fatis , evaporet.

Ad eandem normam paretur

Conserva Cornorum ,
Cynorrhodon.

N. Ex integris Fructibus Conservas , sive Condita conficiendi alia est ratio : E. G.

R Ceraforum acidorum ,
Sacchari albi ana partes æquales :
Saccharum Aqua dissolutum Ovi Albumine clarifica,
cola , & coque fere in modum Electuarii solidi : tum
eo tepefacto Cerasa ad aliquot horas immerge : po-
stea in Syrupi consistentiam decoque , demptaque
spuma in vascula vitrea effunde .

Simili modo condiri possunt

Fructus alii molles , & succosi .

§. IV.

EX RADICIBUS.

CONSERVA CONSOLIDÆ MAJORIS.

Symphyti majoris Radix in Aqua percoquatur ad li-
quamen : deinde cribro e setis contexto transmissa
cum duplo Sacchari clarificati ad ignem lenem assidue
movendo in Conservam redigatur.

CONSERVA HELENII.

Tenellæ Radices Helenii minutim concisæ in mortario
lapi-

lapideo ad pultis formam pinsentur : tum per cribrum extrahatur Pulpa, quæ cum duplo Sacchari tabellari tundatur, & probe commisceatur.

CONSERVA HELENII ALTERA,
SEU CONDITUM.

R Radicis Helenii recentis mundatæ libram unam,
Aquæ communis . . . libras octo:
Radicem frustatim sectam ad octo dies macerari per-
mitte : mox ad mollitiem coque : tum Decoctum
defunde, in quo clarifica Sac-
chari albi . . . libram unam, & semis :
In Saccharo clarificato eadem Radicis frusta ad triduum
prius infusa iterum coquantur, dum crassior evadat
Syrupus, in quo Condita fervari possunt, vel e Syru-
po exempta in hypocausto siccentur.

Similiter condiendæ Radices

Angelicæ odoratæ,
Eryngii,
Satyrii, &c.



CAPUT VI.

DE SYRUPIS.

§. I.

SYRUPI SIMPLICES EX MELLE.

MEL ANTHOSATUM.

R Mellis albi libras quatuor ;
 Florum Rosmarini libras duas :
 In stanneo vase circulatorio tepente ad triduum digere :
 antequam frigescant , exprime ; & cola .

MEL ROSACEUM , SIVE RHODOMEL :

R Succi Rosarum rubrarum libram unam ;
 Mellis albi colati libras duas :
 Coquantur ad Syrupi consistentiam .

MEL ROSATUM SOLUTIVUM :

R Succi Rosarum pallidarum defæcati ,
 Mellis communis ana partes æquales :
 Bulliant ad despumationem : colentur , & in Syrupum
 coquantur .

Sic paretur .

Mel Mercuriale :

MEL

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

Rx Succi Florum Violarum cum calycibus recens expressi,
 Mellis communis . . . ana quantum vis :
 Coque, ac despuma, deinde cola, & ad justam consistentiam redige.

OXYMEL SIMPLEX.

Rx Mellis colati libras tres,
 Aceti Vini albi libram unam, & semis:
 In fictile vitreato redigantur lento igne in Syrupum.

OXYMEL SCILLITICUM.

Rx Mellis colati libras duas,
 Aceti Scillitici libram unam:
 Coquantur in Syrupum.

§. II.

SYRUPI SIMPLICES EX SACCHARO.

SYRUPUS DE ABSINTHIO:

Rx Succi Absinthii vulgaris
 expurgati libram unam, & semis;
 Summitatum ejusdem floridarum uncias sex:
 N In

In vase circulatorio stanneo digere per noctem M.B., quo refrigerato exprime, & per chartam cola: post adijce
 Sacchari albi sicci, & pulverati . . . duplum:
 Digere iterum in eodem vase, & balneo ad Sacchari
 dissolutionem. Syrupum refrigerescere finito, tum cola,
 & in vitro obturato serva.

Similiter parari possunt

Syrupi de Arthemisia;
 Hedera terrestri;
 Hyssopo,
 Mentha.

SYRUPUS DE ALTHÆA.

R Radicis Althææ recentis mundatæ,
 & concisæ uncias sex;
 Aquæ ferventis libras sex;
 Paullum bulliant: statim cola, & adde
 Sacchari albi libras quatuor:
 Ovi Albumine agitato clarifica: in Syrupum decoque, &
 sub finem coctionis injice
 Radicis Althææ mundæ, & parum
 contusæ uncias duas:
 Post brevem ebullitionem ab igne remove, & per lin-
 teum cola.

SYRUPUS CAPILLI VENERIS.

R Foliorum Capilli Veneris . . libram unam, & semis;
 Aquæ communis libras sex,
 Sac-

Sacchari albi : libras tres :
 Capilli Veneris Foliis Aquam ferventem affunde : ad
 horas sex macerari sine : exprime : cola : cum Sac-
 charo clarifica, & in Syrupum decoque.

SYRUPUS DE CHINA.

R Radicis Chinæ minutim incisæ . . . unciam unam,
 Aquæ communis libras duas :
 Infunde per horas duodecim in fictile vitreato : deinde
 lento igne fervefacito ad medias : tum exprime Li-
 quorem, cui adde
 Sacchari albi tabellati . . . : uncias sex :
 Percoque in Syrupum.

SYRUPUS DE CHINACHINA.

R Extracti sicci China-
 chinæ pulverati . . . drachmam unam, & semis,
 Sacchari albi tabellati uncias tres,
 Aquæ Florum Aurantiorum . . . drachmas decem :
 Extractum Aqua dilutum inde ampullæ vitreæ, addito-
 que Saccharo M. B. in Syrupum redige.

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITRI.

R Corticis exterioris Citri derafi . . . libram unam ;
 Aquæ distillatæ Citri uncias octo :
 In vase circulatorio stanneo ad horas duodecim B. M.

tepente digere : postea refrigerari sine : prælo expri-
me Liquorem, & percola.

Rx Hujus percolati Liquoris . . . uncias quindecim,
Sacchari tabellati in pulverem
redacti libras tres,
Olei essentialis Citri. . . . guttas quindecim:
In eodem vase circulatorio fiat Syrupus, cui adhuc te-
penti Oleum essentielle pauculo Saccharo pulverato
exceptum adde : commisce, & in vitro bene clauso
refrigeratum Syrupum repone.

SYRUPUS DE SUCCO CITRI.

Rx Medullæ acidæ Citri demptis Semi-
nibus libram unam;
Sacchari albi clarificati, & in Ta-
bellarum modum cocti . . . libras duas:
Citri Medulla panno lino laxo inclusa manibus com-
primatur ad Succum omnem eliciendum : magma
ferventi Saccharo injectum brevi bulliat : postea Suc-
cum per partes adjiciendo coque in Syrupum.

ALIUS DE SUCCO CITRI CUM CORTICIBUS.

Rx Succo acidi Citri recentè expressi libras tres,
Corticis exterioris Citri derasi . . uncias sex,
Sacchari ficci clarificati, & in so-
lidum Electuarium cocti . . . libras septem :
Citri Cortices una cum Succo ad horas duodecim in vase
circu-

circulatorio vitreo tepide digerantur M. B. Refrigeratis vasis Succus prælo exprimatur, & per chartam coletur, in quo Saccharum pulveratum liquefiat.

Eodem modo confici possunt

Syrupi de Succo Aurantiorum,
Limonum.

SYRUPUS FLORUM PERSICORUM:

R Florum Mali Persicæ a calycibus
mundatorum . . . libras sex,
Sacchari albi in Aquæ duplo soluti libras quatuor:
In fictile vitreato horarum sex spatio digerantur: tum
fervefiant, indeque prælo exprimatur Liquor Ovi Al-
bumine clarificandus, & in Syrupum percoquendus.

Simili modo paretur Syrupus

Rosarum Damascenarum,
Pallidarum.

SYRUPUS DE SUCCO FLORUM PERSICORUM.

R Succo defæcati Florum Mali Persicæ . . libras sex,
Sacchari albi . . libras quatuor cum dimidia:
Clarifica, & in aheno stanno obducto coque ad idoneam
Syrupi consistentiam.

Similiter fiant Syrupi

De Succo Rhamni Cathartici,
Rosarum pallidarum.

SYRU-

SYRUPUS DE NYMPHÆA:

R Florum Nymphææ ab exterioribus foliis viridibus ;
 & stilo, seu media parte flava mun-
 datorum libras duas,
 Aquæ communis libras octo,
 Sacchari albi libras quatuor:
 Floribus Aquam ferventem affunde : ad horas sex mace-
 rari permitte : tum forti expressione Liquorem cola :
 cum Saccharo clarifica, & in Syrupum percoquendo
 redige.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO,
SEU DE MECONIO.

R Capitem Papaveris albi recentium . . . libras duas,
 Aquæ communis libras octo :
 Maceratio fiat horæ unius spatio : deinde brevis ebulli-
 tio : tum valida expressio Liquoris, cui adjiciantur
 Sacchari albi libræ quatuor:
 Clarificentur, & ex arte fiat Syrupus.

SYRUPUS DE PAPAVERE ERRATICO.

R Aquæ Papaveris erratici M. B. distillatæ,
 Florum ejusdem recentium a ca-
 lycibus mundatorum ana libras duas:
 In vase circulatorio ad horas sex digere M. B. tepente,
 quo refrigerato Liquorem exprime: per pannum traji-
 ce, additoque Sacchari albi sicci duplo
 repone in eodem circulatorio vase, ubi Saccharum
 omni-

omnino lique scat. Syrupum refrigeratum linteo percola.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

R Rosarum rubrarum detractis unguibus, in umbra
 ficcatarum uncias duas,
 Aquæ ferventis libras tres :
 Digere in vase cooperto per diem, & noctem : tum fer-
 vesfacito : dein cola, & adde
 Sacchari albi libras duas :
 Clarifica, & coque in Syrupum.

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

R Terebinthinae drachmas tres,
 Spiritus Terebinthinae drachmam unam,
 Sacchari albi sicci pulverati uncias sex,
 Aquæ communis uncias tres :
 In mortariolo marmoreo Terebinthina, & Spiritus, Sac-
 charum pulveratum sensim addendo, accurate com-
 misceantur : tum Aqua adjecta defundantur in am-
 pullam vitream, & M. B. fiat Syrupus.

SYRUPUS GRANATORUM.

R Succu Granatorum purificati libram unam,
 Sacchari albi sicci libras duas :
 Ponantur in fictile vitreato, & leni igne Saccharum in
 Succo lique scat.

Simili modo confici possunt Syrupi.

Ex

Ex Succo Acetosæ,
 Acetosellæ,
 Agrestæ,
 De Berberis,
 Cydoniorum,
 Ribium,
 Rubi Idæi, &c.

N. Ex Fructuum quorundam Succis non defæcatis, uti
 Cydoniorum, Ribium, Rubi Idæi, cum æquali
 pondere Sacchari clarificati parantur quoque Syrupi,
 qui coctione ad spissitudinem idoneam redacti Gela-
 tinæ, aut Mivæ appellari solent.

SYRUPUS VIOLACEUS.

R Succi Florum Violarum a calycibus
 mundatarum libram unam,
 Sacchari albi sicci libras duas:

In fictile vitreato M. B. fiat Syrupus, qui linteo per-
 colandus, & spuma detracta, in vitreo vase asser-
 vandus.

Ita paretur Syrupus
Florum Borraginis,
Tunicæ.

SYRUPUS VIPERINUS.

R Viperas numero tres;
 Sacchari albi uncias octo,
 Aquæ communis uncias quatuor;
 Vipe-

Viperas abscisso capite, detractisque exuviis, & intestinis minutim incide: vasi circulatorio stanneo inde, & affusa Aqua coque M. B. fervente ad carnum liquamen. Sine balneum refrigerari: postea forti expressione Jusculum cola, & serva. Interim Magma cum sufficienti Aquæ quantitate fac, ut lente bulliat horæ unius spatio; deinde exprime Liquorem, cui adde Saccharum: clarifica, & eatenus coque, ut admisto Jusculo, quod ad hunc finem servatum est, congruentem spissitudinem Syrupus acquirat.

§. III.

SYRUPI COMPOSITI EX MELLE.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM CUM AGARICO.

℞

Succi Rosarum pallidarum
 fermentatione purificati . . . libras quatuor;
 Agarici concisi . . . uncias tres,
 Mechoacannæ paullum contusæ .. unciam unam,
 Zingiberi . . . drachmas duas,
 Mellis albi colati . . . libras tres:

Agaricus cum Zingiberi in libris tribus Succi Rosarum,
 Mechoacanna seorsum in reliquo Succo ad horas
 duodecim digerantur: facta deinde expressione Tin-
 cturas per pannum cola: commisce cum Melle, &
 in Syrupum decoque.

SYRUPUS DE ARUNDINE.

R Radicis Arundinis montanæ recentis minutim incisæ libram unam, & semis,
 Florum Farfaræ manipulos duos,
 Corticis exterioris Citri recens derasi uncias sex,
 Succi Pomorum dulcium defæcati . . libras duas,
 Aquæ communis libras sex,
 Mellis Hispanici libras tres,
 Sacchari albi libram unam :

Citri Corticibus in vas circulatorium inditis Succi Pomorum semel libram affunde : per horas duodecim M. B. digere; refrigerato vase exprime Succum, percola, & serva. Arundinis Radices in Aqua, & Succu reliquo per noctem macerari finito : mane coque ad dimidias : tum adde Farfaræ Flores. Post brevem ebullitionem exprime, & cola Decoctum, in quo Saccharum cum Melle clarifica, & in eum modum coque, ut admistione Succu asservati justam consistentiam Syrupus habeat.

SYRUPUS DE PEUCEDANO
EX TEMPORE PARANDUS.

R Extracti Radicis Peucedani,
 Liquiritiæ . . ana unciam unam,
 Extracti Foliorum Veronicæ,
 Tussilaginis ana drachmas tres,
 Aquæ

Aquæ distillatæ Radicis Peucedani quantum fatis ;
 Mellis albi colati uncias duas :
 His in vasculo vitreato igne lenissimo commistis, & liquatis fit Syrupus .

§. IV.

COMPOSITI EX SACCHARO.

SYRUPUS APERIENS.

R Succī defæcati Agrimonix ;
 Cherefolii ,
 Pimpinellæ cum Radice ;
 Radicis Petroselinī ,
 Raphani hortensis ,
 Peucedani ,
 Iridis . . . ana uncias octo ,
 Aceti scillitici libras tres ,
 Radicis Acori ,
 Helenii ,
 Sassafras ana uncias tres ;
 Sacchari albi libras sex :
 Incisis , & contusis Radicibus , cucurbitæque vitreæ capitello cæco instructæ inditis superfundantur Succī, & Acetum scilliticum . Fiat digestio in M. B. unius diei spatio : deinde apposito cucurbitæ capitello , quod rostro præditum sit , eliciatur circiter libra una Li-

quoris, qui asservetur: tum reliquus exprimatur: cum Saccharo clarificetur, & percoquatur in fictile vitreato ad eam spissitudinem, ut, cum deferbuerit, admisto eo Liquore, qui sepositus fuerat, in Syrupum convenientis consistentiæ sine coctione redigatur. Ut autem utriusque perfecta commistio fiat, inditus circulatorio vasi Syrupus ad horas aliquot in M. B. tepente relinquatur.

SYRUPUS DE ALTHÆA:

R Radicis Althææ recentis mundatæ, & incisæ uncias quatuor;
 Radicis Pimpinellæ,
 Fructuum Alkekengi ana uncias duas,
 Summitatum Althææ,
 Parietariæ . . . ana manipulos tres,
 Aquæ communis libras decem,
 Sacchari albi libras quatuor:
 Pimpinellæ Radix munda, incisa, & contusa, additis paullo post Alkekengi Baccis, ad Aquæ circiter quartæ partis consumptionem coquatur: Althææ deinde Radix una cum Herbis incisis parum bulliat: tum Liqueorem cola, in quo Saccharum clarifica; & in Syrupum redige.

SYRUPUS DE CICHORIO CUM RHABARBARO:

R Succi Cichorii defæcati . . . libras duas,
 Rhabarbari optimi incisi . . . uncias duas:

In

In vase vitreato per noctem digere : exprime : percola-
tum Liquorem serva: tum residui ab expressione Rha-
barbari iteretur digestio affusa Aqua fervente ad li-
bras duas . Post brevem ebullitionem exprimatur
Aqua tineta, quæ Liquori asservato admista cum Sac-
chari albi libris duabus
clarificetur ; & coquendo fiat Syrupus .

SYRUPUS DE COCHLEARIA.

R Succi Cochleariæ,
Beccabungæ,
Acetofellæ,
Aurantiorum Lusitanicæ . . . ana uncias sex ;
Corticis eorundem derasi uncias tres,
Foliorum Cochleariæ incisorum manipulos tres :
In vitreo circulatorio vase rite obturato per duodecim
horas calore leni digerantur. Refrigerato vase expri-
matur Liquor, & charta percoletur : tum additis
Sacchari sicci pulverati libris quatuor,
In eodem vase circulatorio sola Sacchari liquatione fiat
Syrupus . Insuper pauculum Saccharum imbue gut-
tis quindecim Olei essentialis Citri, & Aquæ tantillo
dilue : misce cum Syrupo, quem refrigeratum recon-
de in vitreo vase angusti orificii, subere, & vesica
obturando .

SYRUPUS DE ERYSIMO.

R Succi Erysimi expurgati libras tres,
Foliorum recentium Hyssopi, &
Tussi-

Tussilaginis ana manipulum unum;
Radicum Helenii,

Liquiritiæ ana unciam unam, & semis;
Sacchari albi libras tres:

Cum Succo Radices, & Folia concisa in stanneo vase
circulatorio per diem macerentur: aptato deinde ca-
pitello distilletur Aqua ad uncias sex fervente balneo.
Reliquum Liquorem exprime: cum Saccharo clari-
fica, atque ad eum modum percoque, ut, cum Aquam
stillatitiam adjeceris, convenientem consistentiam
Syrupus habeat.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS.

R Succi Pomorum redolentium fermentatione pu-
rificati libras quatuor,
Foliorum Sennæ munda-
torum uncias quatuor, & semis;
Sacchari albi libras tres:

Sennæ Folia in Succo digere per noctem: mane facta
expressione Liquoris Saccharum cum eo clarifica, &
coquendo, quantum satis, Syrupum confice.

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

R Succo depurgati Consolidæ
minoris libras duas, & semis;
Radici Consolidæ majoris minutim sectæ, &
modice exsiccatae uncias tres:
Per horam maceratio fiat: tum brevis ebullitio;
postea

DE PULVERIBUS. III

postea percolato Succo adde
Sacchari albi . . . libras duas :
Clarifica , & in Syrupum coque ; postremo adjice
Syrupi Chermesini colati . . . libram unam ,
& bene commisce.

CAPUT VII.

DE PULVERIBUS:

PULVIS AD BOTIUM.

R Spongiæ Marinae combustæ . . unciam unam ;
Ossis Sepiæ usti ,
Sacchari Canti . . . ana semunciam ,
Pyrethri . . . drachmam unam :
Fiat Pulvis loco sicco servandus.

PULVIS AD GUTTETAM.

R Radicis Pæoniæ maris ,
Cornu Cervi ,
Succini præparati . . . ana unciani semis ;
Castorei Russiensis . . . drachmam unam ,
Cinnabaris nativæ puræ , &
lævigatæ . . . drachmas duas :
Ex omnibus Pulvis fiat tenuissimus , quem in mor-
tario lapideo bene commisce , & in vitreo vase
asserva .

AL-

ÆTHIOPS MINERALIS.

R Mercurii e Cinnabari redivivi uncias duas ;
 Florum Sulphuris unciam unam, & semis :
 In mortario marmoreo, vel vitreo commisceantur, donec mercuriales globuli prorsus nulli appareant. Pulverem habebis subnigri coloris, qui in vitreo vase probe clauso servetur.

Dosis a granis viginti ad triginta.

N. In pulverem cinereum redigitur Hydargyrus, si duplo Sacchari canti subtiliter triti eodem modo admisceatur.

PULVIS ARI.

R Radicum Ari unciam unam cum dimidia,
 Acori,
 Pimpinellæ ana unciam unam,
 Cinnamomi electi semunciam,
 Salis essentialis Absinthii drachmas duas :
 Confice ex omnibus Pulverem, & in vitro reconde.

PULVIS ASTRINGENS.

R Baccarum Myrti,
 Balauftiorum,
 Boli Armeniæ,
 Mastiches,
 Olibani,
 Sanguinis Draconis ana uncias duas:
 Fiat omnium Pulvis.

PUL-

PULVIS CORNACHINI.

R Antimonii Diaphoretici ,
 Cryſtalli Tartari ,
 Scammonii Glycyrrhizati . . ana partes æquales :
 Miſce: fiat Pulvis in vitro rite occluſo aſſervandus .
 Doſis a drachma dimidia ad drachmam unam .

PULVIS DIASENNÆ

R Foliorum Sennæ mundato-
 rum unciam unam , & ſemis ,
 Cryſtalli Tartari ,
 Mechoacannæ ana ſemunciam ,
 Rhabarbari drachmas duas :
 Miſce : fiat Pulvis .

PULVIS DIATRAGACANTHI.

R Gummi Tragacanthi ſelecti unciam unam ,
 Amyli ,
 Glycyrrhizæ mundæ ana drachmas duas ,
 Gummi Arabici drachmas quinque :
 Pulverentur, & commiſceantur; at que, hoc Pulvere cum
 uti volueris , ad ſingulas ejusdem drachmas adde Se-
 minis Papaveris albi ,
 Cucumeris ana grana decem .

PULVIS E CHELIS CANCRORUM.

R Chelarum Cancrorum unciam unam ,
 P Cornu

114 DE PULVERIBUS.

Cornu Cervi philosophice præparati,
Succini albi præparati . . . ana unciam semis,
Lapidis Bezoardici Occidentalis,
Radiciſ Serpentariæ Virgi-
nianæ . . . ana drachmas duas,
Nucis moſchatae . . . drachmam unam:
Fiat Pulvis in vitreo vaſe bene obturato reponendus.

PULVIS, SEU SPECIES DIACARTHAMI.

R Seminum Carthami demptis
corticibus . . . drachmas ſex;
Gummi Tragacanthi,
Hermodactylorum,
Scammonii Syriaci . . . ana ſemunciam;
Cinnamomi electi,
Radiciſ Liquiritiæ . . . ana drachmas duas,
Turpethi . . . unciam unam:
Fiat Pulvis. Doſis a ſcrupulis duobus ad quatuor.

PULVIS, SEU SPECIES DIARRHODON.

R Roſarum rubrarum reſciſſis unguibus uncias duas,
Santali citrini deſaſi . . . unciam unam,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Croci,
Maſtiches,
Nardi Indicæ,
Seminis Fœniculi . . . ana drachmam unam:
Fiat omnium Pulvis. PUL-

PULVIS, SEU SPECIES DIASCORDII.

R Foliorum Scordii in umbra ficcatorum . . . unciam unam, & semis,
 Rosarum rubrarum demptis unguibus . . . unciam unam,
 Boli Armeniæ præparatæ . . . uncias duas,
 Cassiæ lignæ,
 Cinnamomi,
 Foliorum Dictamni Cretici,
 Galbani veri,
 Styracis Calamitæ puri . . . ana unciam semis,
 Radicum Bistortæ . . . drachmas decem,
 Gentianæ,
 Gummi Arabici . . . ana drachmas quinque,
 Opii . . . drachmas duas:
 Fiat Pulvis per sericum trajiciendus, & in mortario bene commiscendus.

Dosis a scrupulo uno ad duos.

PULVIS, SEU SPECIES HIERÆ.

R Aloes Soccotrinæ . . . uncias quatuor,
 Mastiches,
 Radicum Asari,
 Zedoariæ . . . ana semunciam,
 Croci . . . drachmas duas:
 Fiat Pulvis.



CAPUT VIII.

DE CONFECTIONIBUS.

§. I.

CONFECTIONES SIC DICTÆ.

CONFECTIO ALCHERMES.

R Cinnamomi electi,
 Granorum Cherines ana drachmas sex;
 Santali citrini derafi,
 Coralliorum rubrorum lævigatorum,
 Margaritarum lævigatarum . . . ana drachmas tres,
 Foliorum Auri drachmam semis,
 Syrupi Chermesini uncias sexdecim:
 Syrupus calefiat, & linteo raro percoletur: tum M. B.
 aliquantum evaporet. Tepenti Syrupo cætera pulve-
 rata probe admisceantur. Materia diebus aliquot fer-
 mentescat; postea admistis Auri Foliis in fictile vi-
 treato Confectio reponatur.

N. Quum hæc completa, ut vocant, Confectio præ-
 scribitur, Ambræ cineraceæ dimidium granum ad
 singulas ejusdem drachmas addendum est.

CONFECTIO ANACARDINA.

R Anacardiorum,
 Succini albi præparati ana unciam unam,
 Cubebarum,
 Gummi Arabici.

Radicis

118 DE CONFECTIONIBUS.

in vas stanneum effunde. Tepefacto Syrupo Pulverem, assidue agitando, partitim insperge: tandem Crocum in mortariolo lapideo cum Aqua Citri subactum, & dilutum adjice, diuque commisce.

Per dies octo Confectio hæc identidem remiscenda; & cum fermentescere desierit, Auri Argentique Folia addenda sunt.

CONFECTIO PASSULATA.

R Foliorum Sennæ uncias quatuor;
Aquæ communis libras quatuor,
Sacchari albi,
Passularum minorum ana libram unam,
Olei essentialis Citri guttas viginti:

Foliis Sennæ affundatur Aqua fervens ad extrahendam tincturam: in qua percolata decoquantur Passulæ: tum Pulpa per cribrum trajecta cum Saccharo tabellato assidua agitatione, lenique calore in Electuarium redigatur; & cum refrixerit, addatur Essentia Citri modico Saccharo commista.

N. Catharticum, quod in Officinis nostris Passulatum vocatur, ex tempore fieri potest adjecta drachma una Radicis Jalappæ pulveratæ ad semunciam Confectionis passulatæ.

CONFECTIO VULGO CONSERVA CASSIÆ.

R Radicis Liquiritiæ mundæ, & incisæ . . uncias tres,
Foliorum Malvæ manipulos tres,
Aquæ communis libras quatuor:
Fiat

DE CONFECTIIONIBUS. 119

Fiat Decoctum, in quo percolato clarifica, & ad tabellarum modum decoque

Sacchari albi libras tres,

Tum adde

Pulpæ Cassiæ recenter extractæ . . . libras tres,

Seminum Melonum cribro traje-

ctorum uncias quatuor:

Lento igne evaporent, continenter movendo, ad justam consistentiam.

§. II.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI.

R Baccarum Lauri uncias duas,
Mastiches,
Myrrhæ,
Olibani ana unciam unam,
Costi Arabici,
Cyperi rotundi ana semunciam,
Olei expressi e Baccis Lauri
Terebinthinæ Cipriæ ana uncias tres,
Mellis colati . . . libram unam cum dimidia:
Melli tepefacto Terebinthina, & Oleum laurinum simul
liquefacta adjiciantur. His deinde reliqua pulverata
ex cribro inspergantur; & rite omnia commiscendo
fiat Electuarium.

ELE.

ELECTUARIUM DE JUNIPERO.

R Rob Juniperi,
 Mellis albi colati ana libram unam,
 Baccarum Juniperi uncias quatuor,
 Cinnamomi electi,
 Corticum Aurantiorum exsicca-
 torum ana semunciam:
 Mel, & Rob leni calore simul liquefiant, quibus cæ-
 tera in pulverem trita admisceantur.

ELECTUARIUM DIAPHOENICUM.

R Pulpæ Dactylorum libram unam,
 Turpethi uncias quatuor,
 Radicis Liquiritiæ mundæ uncias duas,
 Scammonii Syriaci unciam unam, & semis,
 Mellis colati libras duas, & uncias octo:
 Dactyli ab officulis, & interiore corticula mundati in
 Aqua bulliant: deinde per cribrum trajecta Pulpa
 cum Melle ad superflui humoris exhalationem, lignea
 spathula assidue agitando, leniter coquatur. His te-
 pefactis Scammonium separatim pulveratum, cæte-
 risque subtiliter tritis commistum, semper agitando
 ad perfectam omnium permutationem inspergatur.

ELECTUARIUM DIASCORDII.

R Pulveris Diascordii uncias decem,
 Mellis albi colati libras tres:
 Melli

DE ELECTUARIIS. 121

Melli adhuc tepido admisceatur Pulvis ; & fiat Electuarium ad octo fere dies identidem agitandum.

ELECTUARIUM HIERÆ.

R Pulveris Hieræ uncias sex ;
Mellis albi colati libras duas :
Melli repenti adjiciatur Pulvis ; & probe miscendo fiat
Electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R Radicum Polypodii querni uncias quatuor ;
Foliorum Sennæ mundæ uncias duas ,
Mercurialis manipulos tres ,
Aquæ communis libras octo :
Sennæ Foliis affundantur Aquæ ferventis libræ duæ, fac-
taque maceratione per horas sex coletur Tinctura. In
Aquæ reliquo infunde Radices Polypodii mundas, &
contusas : ad medias decoque : tum adde Mercuria-
lis Folia ; & post brevem ebullitionem exprime , &
cola Decoctum , in quo bulliant , quantum satis ,
Prunorum dulcium enucleatorum uncia sex :
per cribrum trajiciatur Pulpa : tum

R Pulpæ hujus ,
Tamarindorum ;
Cassia ,
Conservæ Violarum cribro tra-
jectæ ana uncias sex ;
Sacchari albi in Sennæ Tinctura liquati , & in cras-
sum

Terebinthinæ Cypriæ,
 Galbani veri, & puri,
 Myrrhæ,
 Gummi Arabici.. ana unciam unam cum dimidia,
 Radicum Acori,
 Costi Arabici,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Valerianæ,
 Zedoariæ ana unciam unam;
 Foliorum Dictamni Cretici,
 Marrubii albi,
 Rutæ,
 Serpylli;
 Pulegii,
 Florum Junci odorati,
 Chamæmeli,
 Polii montani,
 Stœchados Arabicæ;
 Tanacetii,
 Seminum Ammi,
 Dauci Cretici,
 Cardamomi minoris,
 Cubebæ ana drachmas decem;
 Opii electi drachmas sex,
 Mellis albi colati triplum omnium,
 Vini malvatici quantum sufficit:
 In ea Vini quantitatæ, quæ satis sit, Opium dissolutum,
 & linteo percolatum Melli calenti diligenter admif-
 ceatur: cui postea tepenti Oleum Nucis moschatæ
 una cum Terebinthina liquefactum optime commif-
 Q₂ cendo

cendo adjiciatur : tum ab igne remoto vase cætera omnia in Pulverem tenuissimum trita, & bene commista (excepto Croco, qui seorsum pulveratus, & Vino dilutus postremo addendus est) ex cribro sensim inspergantur, baculo ligneo continenter revolviendo, donec totus Pulvis Melli, & rebus aliis probe admistus, & perfecte in unam massam coacta sint omnia. Tum in amplo vase, cujus tertia saltem pars vacua remaneat, reponatur Confectio, ut facile subigi possit; neque interea erumpat, dum fermentescet.

THERIACA ANDROMACHI.

R Trochiscorum Scillæ uncias sex,
 Viperarum siccatarum,
 Trochiscorum Adychroi,
 Piperis longi,
 Opii Thebaici ana uncias tres,
 Iridis Illyricæ, vel Florentinæ,
 Rosarum rubrarum rescissis unguibus,
 Succu Glycyrrhizæ,
 Seminis Napi agrestis,
 Summitatum Scordii,
 Opobalsami, vel Olei Nucistæ expressi,
 Cinnamomi,
 Agarici ana unciam unam, & semis,
 Costi,
 Nardi Indicæ,
 Summitatum Dictamni Cretici,

Rha

Rhapontici Orientalis,
Radici Pentaphylli,
Zingiberi,
Foliorum Marrubii,
Stœchados Arabicæ,
Florum Junci odorati,
Seminis Petroselini Macedonici,
Florum Nepetæ,
Cassiæ lignæ,
Croci,
Piperis albi,
 nigri,
Myrrhæ,
Olibani,
Terebinthinæ Cypriæ. . . . ana drachmas sex,
Radici Gentianæ,
Meu Athamantici,
Radici Valerianæ,
Nardi Celticæ,
Amomi,
Chamæpitys,
Florum Hyperici,
Malabathri,
Summitatum Polii montani,
 Chamædrys,
Carpobalsami,
Seminis Anisi,
 Fœniculi,
 Cardamomi minoris,
 Seseleos Massiliensis,

Ameos,

Ammeos ,
Thlaspi ,
Succi Hypocystidis ,
Acaciæ ,
Gummi Arabici ,
Styracis Calamitæ ,
Terræ Lemniæ ,
Chalcitidis ustæ , vel Vitrioli viridis ad albedinem
calcinati ,
Sagapeni ana drachmas quatuor ,
Radici Aristolochiæ tenuis ,
Summitatum Centaurii minoris ,
Seminis Dauci Cretici ,
Opopanacis ,
Galbani Orientalis puri ,
Bituminis Judaici ,
Castorei electi ana drachmas duas ,
Mellis albi despumati libras quatuordecim ,
Vini optimi quantum satis :

Selecta probe omnia, mundata, & ordine disposita (præ-
ter Opium, Chalcitidem, Terebinthinam, & Oleum
Nucis moschatae) redigantur in Pulverem tenuissi-
mum, qui per sericum trajiciatur; ea tamen cau-
tione adhibita, ut, Arida dum conteruntur, his Oleo-
sa, Gummi, & Succi partitim commisceantur. Vi-
peræ, Schoenanthus, Nardus Indica forfice minutim
concisa, optimeque dein contusa cum mucilagine
Tragacanthi recipiantur in massam: hæc autem sic-
cata teratur: iterum mucilagine imbuta siccetur, in
subtilem Pulverem redigenda, qui cæteris admiscea-
tur.

tur. Opium dissolvatur in sufficienti quantitate Vini, & per linteum trajiciatur: Chalcitis quoque Vino dissoluta coletur. His ita dispositis præsto sit ahenum amplum stanno obductum, in quo leni igne supposito liquefiat Mel: cui liquato pedetentim, atque iteratis vicibus affundantur Chalcitis, & Opium dissoluta, continenter remiscendo: post Oleum Nucistæ una cum Terebinthina liquatum: quibus probe commistis sensim ex cribro inspergatur Pulvis, baculo ligneo assidue agitando, donec omnia in unum commista, & adunata sint. Tunc vase ab igne sublato assidue agitentur, dum frigeant. Electuarium in amplo vitreato vase reconde, & ad menses aliquot interdum agita.

THERIACA DIATESSARON.

R Radicum Gentianæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Myrrhæ,
 Baccarum Lauri ana uncias quatuor;
 Mellis optimi colati libras quatuor:
 Fiat Electuarium.

THERIACA TAURINENSIS.

R Pulpæ Scillæ per cribrum tra-
 jectæ. libram unam, & semis;
 Terebinthina Cypriæ,
 Olei expressi Nucistæ,

Succi

Succi Liquiritiæ,

Opii,

Viperarum siccatarum . . . ana uncias novem;

Cinnamomi,

Myrrhæ ana uncias octo,

Balaustiorum,

Benzoe electi,

Croci,

Gummi Arabici,

Olibani ana uncias sex;

Radicum Angelicæ odoratæ,

Dictamni albi,

Costi Arabici,

Contrayervæ Hispanicæ;

Serpentariæ Virginianæ,

Iridis Florentinæ,

Gentianæ,

Valerianæ,

Summitatum Calaminthæ montanæ;

Chamæpitys,

Polii montani,

Scordii ana uncias quinque;

Baccarum Lauri,

Seminum Cardamomi minoris,

Citri,

Petroselini Macedonici,

Seseli Massiliensis . . . ana uncias quatuor;

Vitrioli viridis ad albedinem cal-

cinati drachmas decem,

Spicæ Indicæ,

Castorei

Castorei Russiensis ana uncias duas,
 Mellis albi colati triplum,
 Vini Malvatici quantum sufficit:
 Paretur Electuarium ad normam Theriacæ Andromachi.

§. III.

TABELLÆ.

TABELLÆ AD BOTIUM.

R Pulveris ad Botium uncias sex,
 Sacchari albi sicci, & pulverati libram unam,
 Mucilaginis Tragacanthi quantum sufficit:
 In mortario misceantur: tum addita per partes mucilagine, pinfendo cogantur in massam, ex qua formantur Tabellæ calido loco siccandæ.

TABELLÆ DE ALTHÆA.

R Pulveris Radicis Althææ unciam unam, & semis,
 Sacchari albi libram unam:
 Cum mucilagine Tragacanthi fiant Morfelli.

TABELLÆ DE GLYCYRRHIZA.

R Pulveris Radicis Liquiritiæ,
 Amyli ana unciam unam, & semis,
 Iridis Florentinæ semunciam,
 Sacchari albi libram unam, & semis:
 R Cum

130 DE TABELLIS.

Cum Tragacantho in Aqua Florum Aurantiorum soluto
fingantur Rotulæ.

TABELLÆ DE SEMINE SANTONICO.

R Seminis Santonici unciam unam,
Myrrhæ semunciam,
Sacchari albi libram unam :
Cum mucilagine Tragacanthi fiant Tabellæ perexiguæ .

TABELLÆ DE TRIBUS, SEU SACCHARUM
NITRATUM.

R Nitri puri unciam unam,
Chrystalli Tartari semunciam,
Sacchari albi libram unam,
Mucilaginis Tragacanthi . . . quantum satis :
Fiant Tabellæ .

TABELLÆ DIACARTHAMI.

R Pulveris Diacarthami uncias tres,
Sacchari albi pulverati libram unam :
Cum Tragacantho in Aqua soluto fiant Tabellæ .

TABELLÆ DIARRHODON.

R Pulveris Diarrhodon unciam unam, & semis,
Sacchari albi libram unam :
Cum solutione Tragacanthi redigantur in massam, ex
qua fiant Tabellæ .

TA-

TABELLÆ DIARRHODON CUM
RHABBARO.

R Pulveris Diarrhodon,
Rhabbari unciam unam, & semis,
Sacchari albi libram unam,
Mucilaginis Tragacanthi . . . quantum satis:
Formentur s. a. Tabellæ.

TABELLÆ DIATRAGACANTHI.

R Pulveris Diatragacanthi additis
Seminibus unciam unam, & semis,
Sacchari albi libram unam:
Misce, & cum mucilagine, ut supra, Tabellas confice.

TABELLÆ PERLATÆ, VULGO
MANUS CHRISTI.

R Margaritarum præparatarum . . . unciam unam,
Sacchari canti pulverati libram unam:
Cum Tragacantho Aqua Citri dissoluto formentur Mor-
selli.

TABELLÆ ROSATÆ.

R Rosarum rubrarum resectis unguibus
ficcatarum unciam unam,
Sacchari albi clarificati, & in Electuarium solidum
cocti libram unam, & semis,
Succi Limonum drachmas duas:

R 2

Rosas

Rosas in subtilem pulverem tritas, & Succo Limonum aspersas fervente Saccharo permisce: tum vase ab igne remoto indefinenter agita baculo ligneo, donec Saccharum spissari incipiat: mox supra chartam effunde, & adhuc tepens in Tabellas divide.

TABELLÆ VIOLATÆ.

R Succi Violarum mundatarum recens expressi uncias tres,
 Sacchari albi pulverati libras duas,
 Iridis Florentinæ pulveratæ unciam unam:
 Saccharum moderato igne in vase idoneo siccetur, & spatula continenter agitando incalescat: cui Radicis Iridis Pulverem, postea Violarum Succum adde, & commisce: tum ex materia effusa, ut supra dictum est, Tabellas confice.

§. IV.

TRAGEMATA.

TRAGEMATA DE CHINACHINA.

R Chinachinæ selectæ unciam unam,
 Extracti sicci Chinachinæ uncias tres,
 Sacchari albi clarificati libras tres:
 Pulverata, & commista in pelvim æneam inde: tum supposito igne moderato paulatim affunde Saccharum in Syrupum coctum, & pelvim assidue versa, donec

donec omnino Pulvis Saccharo obductus in grana coalescat.

TRAGEMATA DE SEMINE SANTONICO.

R Seminis Santonici,
Radiciſ Serpentariæ Virginianæ ana drachmas ſex,
Jalappæ,
Rhabarbari . . . ana unciam unam,
Sacchari albi clarificati . . . libras tres:
Fiant ex Arte Tragemata.

CAPUT IX.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI ALBI, SEU SIEF ALBUM.

R Ceruſſæ Aqua Roſarum ablutæ,
dein ſiccata . . . drachmas decem,
Sarcocollæ . . . drachmas tres,
Amyli,
Gummi Arabici . . . ana drachmam unam,
Caphuræ . . . drachmam ſemis:
Fiat omnium Pulvis, qui in mortario bene commiſtus,
paullulum Aquæ ſenſim inſpergendo, & aſſidue tun-
dendo redigatur in maſſam, ex qua formentur Tro-
chiſci calido loco ſiccandi.

TROCHISCI ALHANDAL.

Pulveratam Colocynthidem, quemadmodum Cap. I.
§. III. tradidimus, cum Tragacanthi mucilagine,
ut artis est, in Trochiscos redige. Dosis a granis
quatuor ad decem.

TROCHISCI ALKEKENGII.

R Baccarum Alkekengi siccarum drachmas decem,
Boli Armeniæ purificatæ,
Gummi Arabici,
Mastiches electæ,
Succini albi præparati,
Seminum Papaveris albi,
Hyosciami albi ana drachmas quinque,
Opium drachmam unam :
Ex omnibus in Pulverem tenuissimum tritis cum mucilagine
Tragacanthi fiat massa, ex qua Trochisci in
umbra siccandi.

Dosis a scrupulo uno ad duos.

TROCHISCI DE AGARICO.

R Agarici derasi, & in Pulverem
redacti uncias tres,
Zingiberi pulverati drachmam unam,
Cum mucilagine Tragacanthi, uti de aliis dictum est,
formentur Trochisci.

TRO-

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

R Corticis Radicis Capparum,
Gummi Ammoniaci puri . . ana unciam unam,
Seminum Agni casti,
Nasturtii aquatici,
Rutæ,
Radicis Acori ana semunciam :
Pulverentur omnia, & cum Succo Agrimonix in Syrupi
modum cocto fiant Trochisci.

PASTILLI, SEU LAPIDES DE CONTRAYERVA.

R Radicis Contrayervæ Hispanicæ . . unciam unam,
Lapidis Bezoar Occidentalis,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Cornu Cervi . . ana drachmam unam cum dimidia,
Ambre cineraceæ drachmam unam :
Seorsum pulverata, dein commista cum solutione Tra-
gacanthi ex Aqua Citri redigantur in massam, ex qua
formantur Globuli in umbra siccandi ; postea in vi-
treo vase bene obturato reponantur.

TROCHISCI DE MINIO.

R Medullæ Panis albi siccatae unciam unam,
Mercurii sublimati corrosivi,
Minii ana drachmam unam :
Terantur in mortario marmoreo, & cum Aqua com-
muni

136 DE TROCHISCIS.

muni cogantur in massam ita firmam, ut ex ea Trochisci oblongi commode fieri queant.

TROCHISCI DE MYRRHA.

R Myrrhæ electæ,
Foliorum Calaminthæ montanæ,
Rutæ,
Dictamni Cretici,
Sabinæ,
Assæ foetidæ ana partes æquales:
Cum solutione Tragacanthi in Succo Marrubii albi formentur Trochisci.

TROCHISCI HEDYCHROI.

R Aspalathi,
Radicis Asari,
Foliorum Mari,
Amaraci ana drachmas duas;
Calami Aromatici,
Schoënanthi,
Costi Arabici,
Phu,
Opobalsami, vel Olei Nucistæ expressi,
Folii Indi,
Spicæ Nardi,
Cassiae lignæ,
Myrrhæ,
Santali citrini,

Croci

Croci ana drachmas sex ;
 Amomi unciam unam, & semis,
 Mastiches drachmam unam:
 Ex omnibus cum Vino generoso mistis, massam confice in Trochiscos redigendam.

TROCHISCI SCILLITICI.

R Scillæ assatæ libram unam ;
 Pulveris Radicis Dictamni albi . . . uncias octo ;
 In mortario marmoreo subige, & fac Pastillos in umbra siccandos.

CAPUT X.

DE PILULIS.

PILULÆ ANTISCORBUTICÆ.

R Gummi Ammoniaci puri drachmas sex ;
 Myrrhæ,
 Acori veri,
 Extracti Rhabarbari ana drachmas tres ;
 Beccabungæ,
 Trifolii fibrini ana drachmas quatuor, &
 semis,
 Balsami Copaiba drachmas duas ;
 Liquefiant simul Extracta cum Balsamo, quibus deinde cætera in pulverem trita admisceantur.

PILULÆ BALSAMICÆ SIC DICTÆ.

R Aloes violatæ unciam unam ;
 Extracti Rhabarbari semunciam ;
 Balsami Peruviani sicci,
 Benzoini ana drachmas duas,
 Croci,
 Myrrhæ ana drachmam unam ;
 Extracti Opii scrupulum unum :
 Extracta Vini Spiritu dilue, tum ijs cætera pulverata
 commisce, & in massam redige.

PILULÆ CATHOLICÆ, SEU IMPERIALES.

R Aloes violatæ,
 Extracti Rhabarbari ana semunciam ;
 Mastiches electæ,
 Cubebarum ana drachmas tres,
 Croci drachmas duas,
 Spiritus Vini quantum satis :
 Extractis Vini Spiritu dilutis igne lenissimo cætera pul-
 verata admisceantur.

PILULÆ COCCIÆ.

R Pulveris Hieræ drachmas decem ;
 Trochiscorum Alhandal,
 Scammonii Syriaci ana drachmas duas,
 Turpethi,
 Stœchados Arabicæ ana drachmas quinque,
 Spiri-

Spiritus Vini rectificati drachmas sex:
Pulverata in mortario cum Spiritu Vini cogantur in
massam.

PILULÆ DE ALUMINE.

R Aluminis puri semunciam;
Catechu præparati,
Sanguinis Draconis veri . . . ana drachmas duas:
Fiat omnium Pulvis, qui cum Albumine Ovi redigatur
in massam.

PILULÆ DE CHINACHINA.

R Chinachinæ pulveratæ . . . unciam unam, & semis,
Salis febrifugi Sylvii,
Extracti Chamædrys,
Absinthii,
Centaurii minoris . . . ana semunciam,
Theriacæ unciam unam:
Fiat massa dividenda in partes duodecim.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

R Corticum Radicis Cynoglossi
siccæ unciam unam;
Seminis Hyosciami albi,
Opii ana drachmas duas,
Olibani drachmas sex,
Croci drachnam unam,
S 2 Bal-

Balsami Peruviani nigri quantum satis :
Opium separatim pulveratum cæteris simul tritis ad-
misce : tum Balsamum sensim adjice , ac tundendo
in massam redige . Dosis a granis quinque ad decem.

PILULÆ DE HIERA CUM AGARICO.

R Pulveris Hieræ unciam unam , & semis ;
Trochiscorum de Agarico pulve-
ratorum unciam semis :
Commisceantur , & Spiritum Vini paulatim instillando
assidueque tundendo in massam redigantur .

PILULÆ DE SUCCINO.

R Succini albi præparati drachmas tres ;
Aloes Soccotrinæ drachmas sex ,
Trochiscorum de Agarico ,
Radici Aristolochiæ rotun-
dæ ana drachmas duas :
Pulverata cum Spiritu Vini cogantur in massam .

PILULÆ DE TRIBUS.

R Aloes Soccotrinæ ,
Agarici ,
Rhabarbari ana partes æquales :
Fiat omnium Pulvis cum Vini Spiritu in massam redi-
gendus .

PILULÆ MARTIALES.

R Aloes violatæ uncias sex,
 Extracti Martis unciam unam :
 Extractum pauculo Vino dilutum misce cum Aloe in
 pulverem trita, & tundendo in massam redige.

PILULÆ MERCURIALES.

R Æthiopis mineralis uncias duas,
 Terebinthinæ Cypriæ unciam unam,
 Extracti Ligni Guajaci,
 Aloes Soccotrinæ,
 Scammonii Syriaci,
 Resinæ Jalappæ ana semunciam :
 Fiat massa : Dosis ad drachmam unam.

PILULÆ DE AMMONIACO.

R Gummi Ammoniacy puri uncias duas ;
 Aloes Soccotrinæ,
 Tartari vitriolati ana semunciam :
 Pulverata, & mista cum Spiritu Vini cogantur in massam.

LAUDANUM OPIATUM.

R Extracti Opii,
 Croci ana unciam unam ;
 Succini albi præparati drachmas sex,
 Castorei Russiensis pulverati drachmas tres :
 Invasculo vitreato Extracta pauculo Vini Spiritu dilue :
 tum ijs cætera commisce. Dosis a grano uno ad
 grana tria.

CAPUT XI.

DE AQUIS.

§. I.

AQUÆ MEDICATÆ.

AQUA AD BOTIUM.

R Lapidis Pumicis,
 Spongiæ marinæ,
 Pilæ marinæ,
 Ossis Sepiæ ana uncias tres,
 Salis Gemmæ uncias duas:
 In olla figulina combure: postea tere: in libris quindecim Aquæ communis infunde, & per diem digere: tandem cola.

AQUA CALCIS PRIMA.

R Calcis vivæ libram unam,
 Aquæ communis libras sex:
 Calci in patina terrea resolvendæ tantum Aquæ asperge, quantum satis sit: deinde reliquam omnem paulatim affunde agitando: tum subsidente Calce defundatur Aqua ad usum externum servanda.

AQUA

AQUA CALCIS SECUNDA.

Postquam prior Aqua, de qua modo diximus, elicita est, residuæ Calci affundatur Aqua recens calida ad libras sex. Agitentur diu: post quiescant. Calx residet: tum per inclinationem Aqua separetur, & colo chartaceo trajecta ad usum internum asservetur.

AQUA PHAGEDÆNICA.

R Aquæ Calcis primæ libras duas,
Mercurii sublimati corrosivi . . drachmam unam:
Sublimatum in mortario lapideo tere: Aquam sensim
affunde, atque agita, ut is dissolvatur: postea Lique-
-rem vitreo vasi inditum serva, qui iterum agitandus,
cum eo utendum erit.

AQUA SAPHYRINA.

R Aquæ Calcis secundæ uncias decem,
Salis Ammoniaci pulverati . . . drachmam unam:
Sal in Aqua dissolve: in pelvi ænea detine, donec Aqua
cæruleo colore infecta sit.

AQUA STYPTICA.

R Aluminis rupei,
Capitis mortui ex Floribus Salis Ammoniaci cum
Hama-

Hæmatite ana uncias duas ;
 Phlegmatis Vitrioli libras tres :
 Igne lento fiat Salium dissolutio : tum Liquor refrige-
 ratus charta percoletur .

LIXIVIUM JUNIPERI.

R Cineris Ligni Juniperi uncias tres ;
 Aquæ communis libras duas :
 In cucurbita terrea digestio fiat supra calidos cineres ho-
 rarum duodecim spatio : refrigeratum Lixivium per
 chartam trajiciatur .

Sic parari possunt Lixivia
ex Cineribus Absinthii ,
Genistæ ,
Tamarisci , &c.

§. II.

AQUÆ DISTILLATÆ SIMPLICES.

AQUA ABSINTHII.

A Bsinthii recentem , & succosam Herbam in pila
 marmorea contusam humilique cucurbitæ vitreæ,
 aut stannæ inditam M. B. distilla ad siccitatem. Aquam
 elicitam in vitreis vasis bene obturatis asserva .

Simili modo distillantur
Acetosa ,

Aceto-

Acetofella ,
Beccabunga ,
Chelidonium majus ,
Chelidonium minus ,
Euphrasia ,
Farfara ,
Foeniculum ,
Mali Aurantiæ Folia ,
Persicaria ,
Portulaca ,
Sempervivum ,
Salicis Folia cum Julis ,
Tanacetum ,
Trifolium fibrinum .

AQUA AGRIMONIÆ.

Collige Agrimoniam floridam: huic contusæ, & in amplo fictili positæ quadruplum Aquæ affunde: biduo macerari finito; deinde ex campana ænea stanno illita, & refrigeratorio instructa, distillationem institue: Aquam ad medias abstrahere, in vitreis vasis servandam.

Sic distillantur

Artemisia ,
Betonica ,
Capillus Veneris ,
Carduus benedictus ,
Centaureum minus ,
Fumaria ,
Galega ,

Scabiosa,
 Carlina
 Saxifragia } cum Radice.
 Scorfonera }

AQUA BORRAGINIS.

Borragini recenti incisæ affunde Aquæ communis quantum sufficit : tum ex campanâ distilla vitando empyreuma.

Simili modo distillantur

Buglossum,
 Cichorium,
 Endivia,
 Lactuca,
 Malva,
 Ononis cum Radice contusa,
 Plantago, &c.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

Ex Cerasis nigris silvestribus, & maturis prælo exprime Succum, cui dimidium Nucleorum contusorum admisce : tum sine maceratione Aquam M. B. ad tertias distilla, quam novis Nucleis adiectis rectificabis.

AQUA CINNAMOMI ALBIDA.

R Cinnamomi optimi contusi . . . uncias duas,
 Aquæ

Aquæ communis libram unam :
 Triduo macerari sine : ex retorta igne arenæ Aquam
 distilla, usque dum albida prodire desinat.

AQUA CITRI.

Mala Citria maturitati proxima usque ad medullam
 acidam deradantur: tum stannæ cucurbitæ indita M. B.
 distillantur ad medias. Priorem hanc Aquam sepone,
 & reliquam elice distillando ferè ad siccitatem: quæ po-
 sterior Aqua, additis recentibus Citri Corticibus derafis,
 iterum M. B. distilletur.

AQUA COCHLEARIÆ.

R Cochleariæ nondum florentis, sub lucis ortum col-
 lectæ, atque incisæ libras sex,
 Aquæ communis triplum:
 Indantur statim alembico, quod stanno probe obductum
 sit, adiectoque refrigeratorio, atque excipulo, &
 juncturis agglutinatis distillatio fiat igne per gradus
 adaucto tamdiu producenda, dum Aqua odora, &
 sapida prodeat. Hæc in ampullis vitreis diligenter
 obturatis servetur. Excipulo iterum admoto distilla-
 tionem proseguere, quæque prodibit Aqua, novæ
 ejusdem Plantæ distillationi inserviet.

Eodem modo distillari possunt.

Cherefolium,

Eruca,

Nasturtium,

Raphanus rusticanus cum Radice derafa.

AQUA E TYPHIS CERVINIS.

Tenella, & recentia Cervorum Cornua minutim incisa M. B. ad siccitatem distillantur. Aquam elicitam pone in vase vitreo, & bene obtura, frigidoque loco asserva.

AQUA FLORUM AURANTIORUM.

Integri Flores cum Aquæ communis quadruplo in vase terreo ad horas sex macerentur: tum ex alembico Aquam elice, ac stillare finito, usque dum odoris expers prodire incipiat.

Sic distillantur Aquæ

Florum Chamæmeli,

Lavandulæ,

Rosarum albarum;

pallidarum;

Sambuci.

Simili ratione, & ad medias usque distillari possunt

Flores Liliorum alborum,

convallium;

Nymphææ,

Papaveris erratici,

Pæoniæ,

Rosarum rubrarum;

Tiliæ,

Violarum.

AQUA

AQUA HYSSOPI.

R Hyssopi cotusi libras sex ;
 Aquæ communis quadruplum :
 In fictile optime clauso diem unum macerari sine : ex
 alembico ad medias distilla : Aquam elicitam novi
 Hyssopi additione rectificata.

Similiter procedendum in distillatione

Majoranæ,
 Marrubii,
 Melissæ,
 Menthæ,
 Pulegii,
 Rutæ,
 Salviæ,
 Scordii, &c.

AQUA MELONUM.

Melones minutim incisos M. B. propemodum ad siccitatem distilla.

AQUA SPERNIOLÆ.

Ranarum Sperma mundum, & idoneo tempore collectum ex cucurbita vitrea capitello instructa M. B. fere ad tertias distilla.



§. III.

AQUÆ DISTILLATÆ COMPOSITÆ.

AQUA BALSAMICA.

R Costi corticofi,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Macis,
 Balsami Peruviani sicci,
 Benzoe selecti ana semunciam;
 Spiritus Vini alcoholisati libras tres:
 In vitrea retorta biduum macerentur: tum apposito ex-
 cipulo igne arenæ distilla, cavendo ab empyreumate.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

R Cinnamomi contusi libram unam;
 Spiritus Vini alcoholisati,
 Aquæ Melissæ ana libras quatuor:
 In vitreo vase clauso per biduum macerari permitte:
 dein ex alembico distilla. Primum limpidus, tum
 albidus Liquor manabit: uterque commistus in la-
 gena vitrea bene obturata recondatur.

AQUA DIURETICA.

R Radicis Saxifragiæ,
 Petroselini,
 Raphani rusticani . . ana libram unam,
 Bac-

DE AQUIS.

151

Baccarum Juniperi uncias sex,
Succi Limonum,
Aquæ distillatæ Melonum . . . ana libras tres:
Diurno spatio macerentur : tum M. B. ex cucurbita vi-
trea distillentur.

AQUA E CORDE CERVI.

R Cor Cervi frustatim dissectum,
Radici Zedoariæ,
Cinnamomi,
Cubebæ ana drachmas tres,
Summitatum Melissæ manipulos tres,
Florum Salviæ manipulos duos,
Corticis Citri unciam unam,
Spiritus Cerasorum nigrorum recti-
ficati uncias sex,
Aquæ communis libras sex :
Fervente balneo distilla ex alembico ad tertias.

AQUA EPILEPTICA.

R Florum Lili convallium recen-
tium manipulos octo :
Vini albi generosi libras octo,
Facta per horam maceratione ex alembico ad medias
igne leni distilla.
In Liquore distillato infunde
Radici Valerianæ,
Florum Lavendulæ,
Rosmarini,

Ste-

Stœchadis Arabicæ . . ana drachmas quinque,
 Nucis moschatae,
 Cubebarum ana drachmas quatuor,
 Serpylli floridi manipulos duos:
 Triduo digere: tum M. B. fere ad siccitatem distilla.

AQUA E TYPHIS CERVI.

R Cornu Cervini tenelli libram unam,
 Baccarum Juniperi,
 Cinnamomi,
 Macis,
 Corticis Aurantiorum derasi . ana semunciam,
 Aquæ Melissæ libras duas,
 Spiritus Vini alcoholisati uncias tres:
 Cornu Cervi minutim incisum, cætera contusa in vi-
 tream cucurbitam immitte, quibus Aquam Melissæ,
 & Vini Spiritum adde; tum M. B. fervente ad sicc-
 itatem fere distilla. Elicitam Aquam in ampullis vi-
 treis optime clausis reponere.

AQUA HYSTERICA.

R Radicum contusarum Valerianæ,
 Zedoariæ . . ana unciam
 unam,
 Summitatum incisarum Matricariæ,
 Pulegii,
 Florum Chamæmeli,
 Sambuci ana manipulum unum, & semis,
 Aquæ

Aquæ Cerasorum nigrorum . . . libras tres;
 Spiritus Cerasorum nigrorum . . . uncias tres;
 Triduo digere : postea ex alembico fere ad siccitatem
 M. B. fervente distilla.

AQUA IMPERIALIS.

R Cinnamomi uncias duas;
 Nucis moschatae unciam unam,
 Acori veri,
 Baccarum Lauri ana semunciam,
 Cymarum Saturejæ incisarum,
 Dictamni Cretici,
 Calaminthæ montanæ . . . ana manipulos duos,
 Aquæ Chamæmeli libras quatuor,
 Spiritus Vini alcoholisati . . . libras duas:
 In vitrea cucurbita trium dierum spatio macerentur :
 tum Aqua ex alembico usque eo distilletur, dum al-
 bida prodire desinat.

AQUA MELISSÆ.

R Summitatum Melissæ nondum flo-
 rentis manipulos octo;
 Corticis Limonum recens derasi . . . uncias sex;
 Coriandrorum,
 Cinnamomi ana unciam unam;
 Cubebarum,
 Acori veri ana drachmas sex;
 Aquæ Melissæ libras tres,
 V. Spiri-

Spiritus Vini alcoholisati . . . libras quinque :
In alembico optime clauso ad triduum macerari sine :
tum M. B. fervente Aquam catenus elice, ut albida
non amplius stiller.

AQUA SCORDII, VULGO THERIACALIS FRIGIDA.

Rx Aquæ Scordii . . . libras quatuor ;
Succi Acetosæ ,
Galegæ . . . ana libras duas ;
Succi Limonum . . . libram unam, & semis ,
Theriacæ . . . uncias quatuor, & semis :
Cum Succis, & Aqua mistam Theriacam cucurbitæ vi-
treæ inde : tum M. B. distilla, donec magma instar
liquidi extracti remaneat.

AQUA SERPYLLI.

Rx Serpylli floridi . . . manipulos quatuor ;
Florum Chamæmeli,
Cymarum Saturejæ,
Thymi . . . ana manipulum unum ;
Vini optimi . . . libras sex :
Triduo macerentur : tum ex alembico distilla ad me-
dias : in Liquore distillato infunde
Serpylli paulum siccati, & con-
cisi . . . manipulos tres ;
Acori,
Cassia lignea,

Cin.

Cinnamomi electi,
 Macis ana unciam semis:
 Facta per diem digestionem, M. B. distilla ex alembico ad
 siccitatem.

AQUA THERIACALIS.

R Radicum contusarum Contrayervæ Hispanicæ,
 Serpentariæ Virginianæ,
 Angelicæ odoratæ,
 Zedoariæ ana unciam unam,
 Theriacæ : : uncias sex,
 Aquæ Scordii,
 Spiritus Vini rectificati ana libras quatuor:
 Triduo digerantur: tum alembico Aqua eliciatur M. B.
 fere ad siccitatem.

CAPUT XII.

DE SPIRITIBUS.

§. I.

ACIDI.

SPIRITUS ACETI, SEU ACETUM
DISTILLATUM.

Vini Acetum ex terrea cucurbita vitreo capitello in-
 structa igne leni distilla, usque dum phlegma pro-
 dierit: tum aptato excipulo ignem sensim adauge, ut
 V 2 aci-

acidus Liquor, seu Spiritus proliciatur, cavendo ab empyreumate.

SPIRITUS ALUMINIS.

Alumen rupeum tritum indatur fictili, vel vitreae loricatae retortae, cujus dimidia pars vacua maneat. Hæc in furno reverberii collocetur, & igne leni eliciatur phlegma. Cum autem in excipulo albidæ nubeculae apparere, guttaeque acidi Liquoris erumpere cœperint, tunc mutato excipulo, & rite agglutinaris juncturis paulatim ignis ad vehementem gradum augeatur, in quo insistendum, donec cessante fumo tranfluat excipulum.

SPIRITUS MELLIS.


R Mellis : : : : : libras quatuor,
Arenæ siccae libras duas:

Ex terrea cucurbita, cujus sextam circiter partem occupet materia, calore cinerum distilla, usque dum acidi Liquoris guttae extillare incipiant. Id Mellis phlegma repone; & recipiente iterum aptato ignem per gradus auge, flavumque Spiritum elice.

SPIRITUS NITRI.

Nitrum ficcum, & pulveratum, cum triplo exsiccatæ argillæ mistum, ex capaci retorta vitrea loricata, cui amplum excipulum adjectum sit, distilla in furno reverberii primum igne leni, dein ad secundum, & post horas aliquot ad tertium, & quartum gradum adaucto, in quo insiste, donec Spiritus omnino stillare desierit.

Nota



N. Per Nitri Spiritum Camphoræ dissolutio fit, quæ Oleum Camphoræ vulgo appellari solet. Nimirum Camphora trita si cum duplo Spiritus Nitri in parvulo matraccio digeratur calore lenissimo, tota paulatim in limpidum Liquorem oleaceum convertitur, qui Nitri Spiritu subsidente supernatat. Liquor is per inclinationem a Spiritu separatus in vitreo vase obturato servetur.

SPIRITUS SALIS.

R Salis marini libras duas;
Argillæ libras sex:

Utraque seorsum siccata, & pulverata commisceantur, & in capaci retorta amplo excipulo adjecto distillatio fiat, ut in Spiritu Nitri traditum est.

SPIRITUS SULPHURIS.

Sit furnus figulinus A B C D, cujus cavitas inter ostium inferius E, & superius F ferreos bacillos habeat transversim positos. Supra furnum, cui plane congruat, collocetur vas vitreum G producto introrsum recurvo margine, ex quo rostrum H prodeat in suppositam ampullam I inditum. Idem vas G in collum assurgat, cujus summæ parti laxo aptetur nexu amplum capitellum L lato, brevique rostro præditum, quod excipiat in vitreo tubo M M. Hujus tubi media pars N instar vesicæ ampliata sit, fulcroque innixa, extremum magno excipulo O accomodetur, quod in pelvi P, quæ Aqua semiplena sit, insistat. His ita constitutis supra bacillos

los ferreos crucibulum Qponito vivo Sulphure liquato accensoque plenum, cui xyliua fila admista sint: tum ostium claude. Cum totum Sulphur deflagaverit, crucibulum aliud Sulphure, uti prius, repletum apponatur. In ampulla, in concavo vitrei tubi globo, in excipulo acidum Liquorem, seu Spiritum reperiēs, qui collectus, & in vase vitreo positus igne lenissimo evaporet ad quartæ circiter partis consumptionem,

SPIRITUS VITRIOLI.

Vitriolo viridi ad albedinem calcinato media fere pars vitreæ retortæ, quæ tenaci, firmoque luto obducta sit, repleatur: tum retorta in furno reverberii collocetur, eique aptato amplo excipulo, & probe obseratis commissuris, succendatur ignis initio lenis, qui sensim ad quartum gradum augeatur; in quo gradu ad duos tresve dies persistendum; vel donec albidus fumus in excipulo nullus appareat. Stillatus Liquor in vitream retortam effundatur, & calore arenæ eliciatur phlegma, quod sepone: tum ignem paulatim auge: stillabit Spiritus, manente Oleo in retorta.

AQUA FORTIS.

R

Nitri puri exsiccati,

Vitrioli viridis ad albedinem cal-

cinati ana partes æquales:

Pulverentur, & una misceantur, atque ex retorta vitrea loricata, cui amplum excipulum adjectum sit, igne

igne reverberii per gradus adhibito distillentur, donec fumus erumpere desinat, & excipulum quasi perlucidum sit.

N. Si Aquam Regiam parare vis, pone in cucurbita vitrea Sal Ammoniacum pulveratum, cui sensim affunde triplum Aquæ Fortis: leni calore digere: tum decanta.

§. II.

SPIRITUS ACIDI EDULCATI.

SPIRITUS DULCIS NITRI.

R Spiritus Nitri,
 Spiritus Vini alcoholisati . . . ana partes æquales:
 Amplo matraccio Vini Spiritum immitte: paulatim Nitri Spiritum affunde: tum capitellum cæcum matraccio impone: indeque igne lenissimo arenæ ad horas viginti quatuor digere.

Ad eundem modum edulcentur

Spiritus Aluminis,
 Salis,
 Vitrioli.

SPIRITUS DULCIS TARTARI.

R Tartari albi libras octo,
 Liquoris Tartari libras duas,
 Spiritus Vini alcoholisati uncias sex:
 Con-

Contuso Tartaro, & in matrarium colli oblongi indito affundatur Liquor Tartari: deinde ampulla inversa, (ut mos est) obturatum matrarium in fimo equino collocetur, digerendo per mensem, vel usque dum nigrescere Tartarum, ac putrefieri incipiat: rum autem e matrario exime: loco tepido sicca: siccatum pone in vitrea retorta loricata, & Vini Spiritum injice, postea amplum excipulum apta, & igne primum leni, dein ad tertium, & quartum gradum adaucto distilla, donec nihil amplius prodeat. Refrigeratis vasis Spiritum ab Oleo per vitreum infundibulum separa, & in vase vitreo optime clauso reconde.

§. III.

SPIRITUS ARDENTES.

SPIRITUS ABSINTHII.

R Absinthii, paullo antequam floruerit, collecti, & contusi libras triginta,
 Aquæ tepidæ triplum,
 Fermenti libras quatuor:
 Absinthio in vas ligneum immisso Aquam affunde, qua dilutum fuerit fermentum: vas opertum in loco tepido, & quieto repone, donec vinosus odor exhalet: tunc ex alembico tandiu distilla, dum prunis injectus Liquor flammam non amplius concipiat. Spiritus autem prolectus ter repetita distillatione, terque additis Absinthii floridi manipulis aliquot M. B. rectificetur.

Simi,

Similiter parantur

Spiritus ardentēs Melissæ,
Rosarum,
Serpilli, &c.

SPIRITUS BACCARUM SAMBUCI.

R Succī Baccarum Sambuci fermenta-
tione defæcati . . . , . quantum vis :
Distilla M. B. donec Spiritus ardens elicitus sit, qui
rectificetur.

Sic distilletur Spiritus Baccarum Ebuli.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

Ex Cerasis nigris silvestribus bene maturis extrahatur Succus, & simul cum Nucleis contusis fermentescat, usque dum Vinosum odorem spiret: tum a fæcibus per colum secretus ex alembico distilletur. Elicitus Spiritus recentibus additis Nucleis pariter contusis bis rectificetur.

SPIRITUS JUNIPERI.

R Baccarum Juniperi libras quindecim,
Aquæ fontis libras quinquaginta :
Fermentescant dierum quindecim spatio : tum per
distillationem ex alembico eliciatur Spiritus, qui adjectis
ad uncias aliquot Juniperi baccis etiam contusis rectificetur.

SPIRITUS VINI.

Vinum affunde alembico stanno illito, cujus dimidia pars vacua remaneat: capitellum cum refrigeratorio impone: tum igne lento distilla, usque dum prodiens Liquor flamma admota non ardeat.


Rectificatum habebis Vini Spiritum semel, iterumque repetita ejus distillatione ex alembico.

N Spiritus Vini camphoratus efficitur, si Camphoræ comminutæ ad unciam unam in vase vitreo optime clauso dissolutio fiat cum Vini Spiritus rectificati libra una.

SPIRITUS VINI ALCOHOLISATUS.

Supra furnum A pone vas æneum B Aqua semipletum, cujus margini alembicum C apta, in quo Spiritum Vini bis rectificatum infunde: alembico fistulam æneam D stanno oblitam committe, cujus crassitudo brachium, longitudo quatuor pedes æquet, æneumque habeat capitellum plumbatura conglutinatum cum refrigeratorio E, & longo rostro F Huic rostro aliam fistulam G pollicis crassitudine adjunge, & intromitte in fistulam inflexam H, quæ vasi I tanquam alteri capitello plumbatura colligata sit. Hoc autem capitellum instrumento tripede supposito ita colloca in cado, ut illius rostrum e foramine L prodeat: tum huic rostro lagenam M adnecte intermedio tubo inflexo N: Cadum Aqua reple: ignem æneo lebeti succende, & distillationem tandiu prosequere, quoad Spiritus in lagenam stillare perrexerit.

N.



N. Spiritum Vini tartarifatum efficies, si Sali Tartari in vas vitreum circulatorium indito Vini Alcohol affundas, & commissuris accurate obstructis igne arenæ lenissimo dierum trium spatio digeras. Hunc Spiritum tartarifatum defunde, & serva in ampulla vitrea probe occlusa.

SPIRITUS VINI ANTHOSATUS, SEU AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

R Florum Rosmarini recentium... libram unam,
Spiritus Vini alcoholifati..... libras quatuor:
In vase vitreo rite obferato per diem naturalem
macerari sine, tum ex alembico fere ad ficcitatem
M. B. fervente distilla. Liquorem distillatum novis
additis Floribus rectifica.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

R Cochleariæ ante Solis ortum collectæ, at-
que incisæ,
Succi Cochleariæ,
Aquæ communis ana libras sex;
Spiritus Vini rectificati libras duas:
In alembicum refrigeratorio præditum indantur,
& apposito excipulo, juncturisque occlusis extraha-
tur liquor ad medias. Huic adde
Cochleariæ recentis incisæ libras tres:
Ex alembico M. B. fervente Spiritum elice, quem
in ampullis vitreis subere, cera, & vesica obturan-
dis repone.

Ad eandem normam distillantur

Spiritus Cherefolii,

Nasturtii,

Raphani rustici cum Radice
derasa, & similium.

SPIRITUS SAPONIS.

R Saponis libras quatuor,
Spiritus Vini rectificati libras duas,
Floris Solis libram unam:

Ex vitrea retorta igne arene moderato distillationem institue, tandiu producendam, dum Spiritus omnis prolectus sit, & guttæ Olei rubescentis exstillare incipiant.

§. I V.

SPIRITUS, ET SALES VOLATILES.

SPIRITUS, & SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

COrnu Cervini scobem inde retortæ vitreæ lorica: in furno reverberii colloca: amplum excipulum apta: commissuras obstrue: tum igne moderato distillationem institue, & prosequere, donec Spiritus, & Sal volatilis ascendere incipiant: postea ignem usque ad quartum gradum sensim adauge, atque in eo insiste, donec albi fumi prodire definant. Refrigeratis vasis excipulum amove, agita, ut ejus lateribus hærens Sal decidat. Hunc una cum Oleo,
&

& Spiritu in matrarium oblongi colli effunde, ap-
tatoque capitello cæco Salem volatilem igne arenæ
lenissimo sublima. Sale exempto, atque in ampulla
arctissime obturanda reposito, Spiritum ab Oleo per
infundibulum separa, per chartam trajice, & re-
conde.

Similiter extrahuntur

Sales, & Spiritus volatiles

Cranii humani,

Fuliginis,

Viperarum, &c.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM CLARUM SUCCINI.

Succinum crasse contusum vitreæ, vel fictili cu-
curbitæ indatur, ita ut media cucurbitæ pars vacua
remaneat: tum apposito vitreo capitello, cujus rostro
parvulum excipulum adjectum sit, juncturisque ob-
structis distilletur lento igne, per gradus sensim au-
gendo, dum Sal capitello adhærere, Spiritusque, &
Oleum clarum in excipulum exstillare incipiant:
tunc ab igne cucurbitam remove, qua refrigerata
Salem capitello, & cucurbitæ lateribus hærentem
exime. Aptato rursus capitello, & excipulo, junctu-
risque agglutinated, igni moderato cucurbitam com-
mitte, donec Sal, & Oleum ascendant: vas ab igne
iterum amove: frigesce re per mitte: Salem exime;
idque toties repete, dum Sal, & Oleum clarum om-
nino elicatum sit. Tandem Spiritum ab Oleo per
infundibulum separa, & in vitreis ampullis subere,
&

& cera obturandis seorsum repone. Caput mortuum in cucurbitæ fundo superstes asserva.

N. Ex duobus modo memoratis Salibus simul permistis in hunc modum confici potest Liquor is, qui Cornu Cervi succinatus appellatur: videlicet

Rx Salis volatilis Cornu Cervi,
Succini... ana drachmas duas;

Aquæ Salviæ.... unciam unam cum dimidia:

Matraccio inditis Salibus instilletur Aqua: sedato fervore obturetur matrarium, & ad integram Salium dissolutionem reponatur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

Rx Salis Ammoniaci... libram unam, & semis;
Calcis vivæ libras quatuor:

Separatim pulverata, dein commista, pone in vitrea capaci retorta: tum affunde Aquæ communis uncias octo, iterumque agitando commisce: hinc in arena retortam colloca: excipulum illico apta, juncturisque vesica agglutinatæ quasdam partes volatiles ultro prodire finito: postea ignem succende, & paulatim auge, ut Spiritus omnis eliciatur, in vitreo vase rite occluso servandus.

SAL VOLATILE AMMONIACUM.

Rx Salis Ammoniaci,
Salis Tartari ana libram unam:
In mortario marmoreo seorsum pulverata, tum simul
mista

mista ponantur in matraccio oblongi colli, quod capitello cæco instructum sit. Sal volatile igne arenæ leni sublima.

N. Caput mortuum Aqua fervente dissolvatur : percoletur Lixivium : ad pelliculam exhalet, & in cella subterranea reponatur, ut fiant Crystalli. Habebis Sal febrifugum Sylvii.

SPIRITUS, ET SAL VOLATILIS OLEOSUS.

R Salis Ammoniaci pulverati,
 Salis Tartari ana libram unam,
 Olei essentialis Cinnamomi,
 Juniperi,
 Macis ana drachmam semis,
 Spiritus Vini alcoholisati uncias sex:
 Sales in mortario lapideo, Olea essentialia sensim ijs instillando, pistillo commisce: mistis, & matraccio oblongi colli continuo inditis Vini Alcohol affunde, & cæcum capitellum apta. Tum leni igne arenæ sublimetur Sal, quo exempto appone capitellum rostro præditum, atque ignem parumper auge, ut totum Spiritum educas.

GUTTÆ ANGLICÆ.

Ex siccis, atque integris Bombycinis Folliculis per vitream loricatam retortam Spiritum, & Salem volatilem elice, uti in processu Spiritus, & Salis volatilis Cornu Cervi dictum est: tum

R illius Spiritus una cum Sale, rejecto
 Oleo uncias quatuor;
 Spi-

Spiritus Vini alcoholisati . . drachmas quatuor;

Olei essentialis Lavendulæ . . drachmam unam:

In parvula retorta obturata diurno spatio digere, dein appolito excipulo, juncturisque vesica, & glutine obscuratis, lenissimo igne arenæ ad siccitatem distilla.

C A P U T XIII.

DE SALIBUS.

§. I.

SALES VOLATILES.

Vide superiorem §. de Spirit. & Salibus volatilibus.

§. II.

SALES ESSENTIALES.

SAL ABSINTHII.

Collectum Absinthium paullo prius quam Flores emiserit, & in pila marmorea contusum, in vas fictile idoneum immitte: Aquæ tantum affunde, qua immergatur: tum ad dies viginti tepido, & quieto loco repositum fermentescat: postea Liquorem prælo expressum quiescere sine; & cum fæx subsiderit, defunde, per chartam cola, atque ad liquidi Syrupi consistentiam per evaporationem redige. Iterum percola ut antea, vasi-
que

que vitreo inditum ad plures menses in cella reponere; vel donec vasis fundo, & lateribus adhæreant Crystalli. His collectis evaporationem, & crystallisationem repete, usque dum Salem totum exhauseris; quem tandem in Aqua ejusdem Plantæ stillatitia solutum percola: exhalare, & in cella detine, ut denuo formentur Crystalli.

Simili modo eliciatur

Sal essentialis Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Scordii, &c.

S A L A C E T O S E L L Æ.

Ex florida Acetosella, rejectis Radicibus, eliciatur Succus, qui fermentatione, & colo chartaceo depurgetur: tum in vitrea cucurbita ad medias evaporet, iterumque percolatus calido loco reponatur, usque dum fiant Crystalli, a melligine separandæ, quas deinde Aqua dissolve: percola, & in Crystallos, ut antea, redige.

Eadem norma extrahi potest

Sal essentialis Acetosæ,
Agrestæ, &c.

§. III.

ALCHALICI SALES LIXIVI.

S A L A B S I N T H I I.

Absinthii cum stipite quantum vis combure in cinerem, qui patinæ terreæ inditus in fornace ad aliquot horas calcinetur: deinde in Aquæ decuplo bulliat,
Y dum

dum eadem Sale saturata sit. Lixivium calens percola : in fictile vitreato ad pelliculam evapora : tum frigido loco repone donec Sal in Crystallos concreseat. Hisce collectis residuum Lixivium per chartam denuo trajice : ad pelliculam exhala, ut altera CrySTALLISATIO fiat ; idque etiam repete ad omnem Salem eliciendum. Quod si crystallinum Salem minime curas, Lixivium ad siccitatem evaporare finito, & residuam materiam Aqua dilue, filtra, evapora ; quod sæpius faciendum, ut album Salem obtineas, quem in vitreo vase rite occluso serva.

Similiter parabis

Lixivos Sales Arthemisiae,
 Cardui benedicti ;
 Centaurii minoris,
 Ligni Juniperi,
 Ononidis cum Radice ;
 Tamarisci,
 Thecarum, &
 Stipitum Fabarum.

S A L T A R T A R I.

Tartarum calcinatum in Aqua solve, percola : Lixivium effunde in vas figulinum, ut igne moderato exhalet ad siccitatem. Salem collige, & vitreo vase obturato inclusum in hypocausto repone.

N. Cum Oleum Tartari per deliquium parare vo-
 lueris, pone in patina vitrea Salem Tartari, & tandiu
 in humido loco detine, dum penitus in Liquorem reso-
 lutum

lutum sit, quem deinde per chartam trajectum in vase vitreo asserva.

NITRUM FIXUM.

Nitrum purum in crucibulo amplo lique scat: tum carbonis pulverem ex cochleari projice iteratis vicibus, usque dum cessante flamma, & fragore Nitrum coeat in massam. Hæc Aqua calida dissolvatur, quæ panno percolata igne leni ad siccitatem evaporet. Habebis Nitrum fixum, quod bene siccatum in vase vitreo servabis.

N. Idem Sal cucurbitæ vitreæ inditus, atque in cella vinaria repositus lique scit: tum autem Nitri Liquor appellatur.

LAPIS CAUSTICUS.

R Cineris Sarmentorum calcinati . . libras quatuor,
Calcis vivæ pulveratæ libras duas:

Bulliant in Aquæ communis decuplo ad medias: tum percolatum Lixivium iterum bulliat ad siccitatem. Sal remanens crucibulo inditus calcinetur, donec fluat, & spumam agere desinat: tum supra lapidem Oleo illitum effundatur, & protinus in Trochiscos oblongos secetur, qui vase rite obturato inclusi in calido loco ferventur.



§. IV.

SALES NEUTRI.

ARCANUM DUPLICATUM, SEU
SAL DE DUOBUS.

R Capitis mortui ex distillatione Aquæ
fortis libras tres;
Aquæ communis libras viginti quatuor:

Caput mortuum ollæ terreæ inditum super fornace horæ unius spatio calcinetur. Eidem refrigerato Aqua fervens affundatur: ad medias bulliant: tum fervens percoletur Lixivium, cujus in fictile ad siccitatem evaporation fiat. Remanens massa semel atque iterum Aqua dissolvatur: Solutio per chartam trajecta iterum evaporet. Sali concreto bis affundatur Vini Spiritus alcoholisatus qui deflagret. Tandem novum Alcohol superfluum distillatione abstrahatur ad siccitatem Salis, qui in vitreo vase obturato fervetur.

SAL MIRABILE.

R Salis marini purificati libram unam;
Olei Vitrioli uncias octo:

Sali marino Aqua dissoluto Vitrioli Oleum instilla, tum inde vitreæ retortæ, cui apponatur excipulum, & igne arenæ gradatim adhibito distilla. Profectum Spiritum a phlegmate per evaporationem separa, & reconde. Quod in retorta remanet calcina, donec fumum emit;

emittere desinat : Aqua fervente dissolve : per chartam cola , atque igni arenæ committe , ut Aquæ tertia fere pars evaporatione absumatur : hinc loco frigido repone , ut formentur Cryſtalli a Liquore ſuperſtite diligenter ſeparandæ , calidoque loco ſiccandæ .

SAL POLYCHRESTUM.

R Nitri puri pulverati libras duas ,
 Florum Sulphuris libram unam :
 Simul commiſta in ollam candentem per partes inji-
 ciantur . Reſtincta flamma per duas horas ignem ita
 urge , ut olla ſemper candeat : tum maſſam exime . fri-
 gefactam tere : Aqua calente diſſolve , quæ percolata
 ad cuticulam vaporet . Tum in frigido loco repone , ut
 Sal in Cryſtallos concreſcat .

NITRUM STIBIATUM.

Quæ ad edulcandum Antimonium Diaphoreticum
 adhibita fuit Aqua , in fictile ad pelliculam evaporet ;
 tum in cella reponatur ; ut fiant Cryſtalli , quæ colle-
 ctæ , & ſiccatae in vitreo vaſe includantur .

SAL PRUNELLÆ , SEU CRYSTALLUS
MINERALIS.

R Nitri puri libram unam ,
 Florum Sulphuris drachmas duas :
 In crucibulo Nitrum liqua ; tum Sulphuris Flores per
 vices

vices injice : cum deflagraverint , crucibulum ab igne remove : Nitrum effunde in pelvim cupream circumversandam , donec concreascit : tum exime , & serva .

TARTARUM SOLUBILE, SEU SAL VEGETABILE.

R Crystalli Tartari libram unam ;
 Salis Tartari uncias sex ;
 Aquæ communis libras octo :

In amplo vase figulino , postquam per se ferbuerint , ad ignem , quantum satis , bulliant : tum Liquor calens per chartam trajiciatur , & ad siccitatem evaporet.

TARTARUM VITRIOLATUM.

Cucurbitæ vitreæ quantitatem eam Liquoris Tartari immitte , quæ tertiam circiter vasis partem occupet : tum Vitrioli Spiritum rectificatum guttatim affunde ; donec nullum amplius fervorem excitari videas : deinde igne arenæ lenissimo vaporet ad siccitatem.

TERRA FOLIATA TARTARI, SEU TARTARUM REGENERATUM.

R Salis Tartari exsiccati , & adhuc calentis libram unam ;
 Spiritus Aceti libras duas :
 Sale Tartari in cucurbitam vitream inde : Aceti Spiritum sensim affunde : Sale saturatum Spiritum , &
 per

per chartam trajectum pone in cucurbita, & M. B. fere ad siccitatem elice insipidum Liquorem. Sali recentem Aceti Spiritum denuo, ac tandiu adjice, ac prope ad siccitatem distilla, dum sentias nihil eum denique acoris sui amisisse. Tandem in cucurbitæ fundo remanentem, & leni calore exsiccatum Salem triplo Vini Spiritus alcoholisati solve: percola, & M. B. Vini Spiritum abstrahendo, sicca, obturatoque vitreo vase inclusum colloca in hypocausto.

N. Hunc ipsum Salem Spiritu Vini solutum, si servare vis, Tincturam: sin autem siccatum liquefcere sinis in loco humido, Liquorem habes Terræ foliatæ Tartari.

Ad hanc Salium compositorum Classsem sequentia referri possunt.

I.

TARTARUM MARTIALE SOLUBILE.

R Tartari solubilis libram unam,
 Scobis Ferri uncias sex,
 Aquæ communis libras duodecim:

In olla ferrea supra cineres calidos triduo digerantur: bulliant deinde ad medias: postea fervens Liquor percoletur, & ad siccitatem exhalet.

II.

SAL, SEU VITRIOLUM MARTIS.

Rubiginosa Ferri Scobis ponatur in olla ferrea, & Spiritu Sulphuris dephlegmato large irroretur. Sedata efferve-

vescentia affundatur Aqua communis ad ollæ medietatem : postea horas duodecim bulliant, ferventem Aquam subinde adjiciendo. Liquor calens per chartam trajiciatur, & igne arenæ evaporet ad Salis concretionem : exempto Sali, & in vasculum vitreum indito Vini Alcohol ad trium digitorum eminentiam affunde : aliquot horas digere, defusoque Vini Spiritu Sal ad albedinem igne lenissimo exsicca.

III.

SAL, SEU SACCHARUM SATURNI.

Plumbi Cerussam pulveratam pone in cucurbita vitrea, Spiritumque Aceti ad eam sensim mensuram affunde, ut transversos quatuor digitos emineat : materia per triduum in digestionem maneat, quam sæpius agita : postea, cum ea quieverit, Aceti Spiritum in aliud vas effunde, novumque residuæ Cerussæ adjice : digere : per inclinationem defunde ; idque tot vicibus repete, dum Acetum non amplius dulcescat. Tunc ij Liquores simul omnes commisti, & charta percolati igne arenæ in cucurbita vitrea ad siccitatem exhalent. Siccata materia in pari quantitate Aquæ, & Aceti stillati solvatur : adhuc calens percoletur : ad pelliculam evaporet, & frigido loco ad crySTALLIFICATIONEM reponatur.



IV.

I V.

TARTARUM EMETICUM.

Rx Croci Metallorum uncias quatuor;
 Cryſtalli Tartari pulverati libram unam,
 Aquæ communis libras quindecim :

In fictile ſupra cineres calidos per noctem digerantur : poſtea ad horas octo , Aqua fervente aliquoties adjecta, bulliant : tum calidus Liquor per chartam trajiciatur : ad cuticulam evaporet , & in cella ſubterranea collocetur , ut fiant Cryſtalli ; idque repetendum ſuperſtitis Liquoris evaporatione.

V.

LAPIS INFERNALIS.

Scobis Argenti puriſſimi cum triplo Spiritus Nitri in phiala vitrea ampla diſſolvatur : ſolutio igne arenæ leni evaporet ad tertias ; poſtea crucibulo germanico indita lente bulliat , donec agere ſpumam , & fumum emittere deſinat , atque inſtar Olei appareat : tunc in tubulos ferreos oleo illitos ſtatim effundatur : concreta materies ponatur in vaſe vitreo, quod diligenter obſtruendum eſt , atque in ſicco loco aſſervetur.

V I.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

Rx Colcothar Vitrioli uncias ſex ;
 Lithargyri preparati ,
 Aluminis rupei ana uncias quatuor,
 Z Aceti

Aceti acerrimi libram unam, & semis:

In fictile ad triduum macerentur omnia identidem agitando: tum evaporent in siccam massam, que vehementi igne per horam calcinetur.

CAPUT XIV.

DE EXTRACTIS.

§. I.

EXTRACTA PROPRIE DICTA.

EXTRACTUM ABSINTHII.

R Absinthii recentis contusi libras octo :
In cucurbitam capitello munitam immitte, ac tri-
duo macerari finito: postea M. B. duas circiter Aquæ
uncias elice, quam serva. Eidem Absinthio affunda-
tur Aquæ communis triplum, & facta per horas sex
digestione, bulliant ad tertiæ partis consumptionem:
Liquor deinde exprimatur: Ovi Albumine clarifice-
tur, & panno trajectus M. B. ad consistentiam crassi
Electuarii evaporet; quo reperfacto permisceatur Aqua
distillata, & in fictile obturato servetur Extractum.

Similiter parantur Extracta

Herbarum Cherefolii,

Chamæpitys,

Cochleariæ,

Melissæ,

Nastur-

Nasturtii aquatici ,
Scordii ,
Florum Chamæmeli ,
Sambuci ,
Tanaceti ,
Radicum Helenii ,
Valerianæ , &c.

EXTRACTUM CENTAURII MINORIS.

Inciso, & contuso Centaurio affundatur Aquæ ferventis triplum, in qua maceratio fiat per diem, & noctem: postea bulliant ad medias: tum Liquor expressus, & clarificatus in fictile percoquatur ad formam Extracti.

Juxta eandem normam parentur Extracta

Herbarum Chamædrys ,
Trifolii fibrini , &c.

Florum Papaveris erratici, & simil.

EXTRACTUM CROCI.

Croci libra una cucurbitæ vitreæ indatur, & M.B. semuncia circiter Aquæ eliciatur, quæ servanda est: tum Croco Aquæ communis libras quatuor affunde: per duodecim horas digere, & Aquam bene saturam defunde, recentem toties addendo, ac digerendo, donec ea intingi desinat. Tincturæ omnes una commistæ percolentur, & in crassum extractum evaporent, cui reperfuso ea immisceatur Aqua, quam initio servandam esse diximus.

EXTRACTUM SENNÆ.

Folia Sennæ mundata in Aquæ ferventis decuplo per horas aliquot macerentur. Post brevem ebullitionem tinctus Liquor exprimatur, & clarificetur: tum panno percolatus in Extractum evaporet. Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

*Eodem modo parantur Extracta ex Herbis
siccis inodoris.*

EXTRACTUM RADICIS GENTIANÆ.

R Radicis Gentianæ siccatae, & contusæ libras quatuor,
Aquæ communis libras quadraginta:

Trium dierum spatio macerentur: deinde bulliant ad tertiæ partis exhalationem: prælo Liquor expressus Ovi Albumine agitato clarificetur: panno tractus in fictile decoquatur ad consistentiam Extracti.

Sic fieri possunt Extracta

Radicis Liquiritiæ,

Pæoniæ,

Sarsæ parillæ,

Tormentillæ, & similium.

EXTRACTUM MECHOACANNÆ.

R Mechoacannæ libram unam;
Spiritus Vini rectificati,
Vini albi ana libras sex:

Incisam Mechoacannam matraccio inde: Vini Spiritum superfunde, ac diebus quindecim macerari per-

permitte: tum fortiter exprime, & Spiritum tinctum in vase repone: postea superstiti Mechoacannæ Vinum adijce: triduo digere, & exprime. Tincturas seorsum panno percolatas commisce, atque ex cucurbita M. B. distilla ad totum Vini Spiritum abstrahendum. Remoto tandem excipulo, & capitulo in crassitudinem Electuarii per evaporationem redige.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

Eadem est præparandi ratio; & dosis Extracti Agarici.

EXTRACTUM RHABARBARI.

R Rhabarbari concisi libram unam,
 Spiritus Vini rectificati,
 Aquæ communis ana libras sex:

In Vini Spiritu dies octo macerari sine, identidem vas agitando: Spiritum tinctum exprime; tum Aqua Magmati adjecta M. B. triduum digere: per horæ dimidium bulliant: postea exprime, & cola. Tincturæ separatim percolatæ in cucurbitam effundantur, & imposito capitulo M. B. Vini Spiritus evocetur: deinde evaporent ad justam Extracti consistentiam.

Similiter parentur Extracta

Chinachinæ,

Ligni Guajaci,

Visci Quercini,

Opii, quod exhibetur a grano dimidio, ad granum unum,

Radici Peucedani.

N. Chinachinæ Extractum diutius evaporando in formam ficcā redigitur, ac Magisterium a nonnullis appellatur, quod alii adhibito solum Vini Spiritu conficere solent.

§. II.

SUCCI HERBARUM CONCRETI.

SUCCUS CONCRETUS ACETOSELLÆ.

A Cetosellæ Succus depurgatus in vase vitreato vaporet M. B. in Electuarii mollis consistentiam.

Sic parentur Succi concreti

Beccabungæ,
Cardui benedicti,
Cichorii,
Chelidonii minoris,
Fumariæ, &c.

§. III.

R O B.

ACACIA NOSTRAS.

Succus e prunis silvestribus maturitati proximis expressus, & percolatus in fictile vitreato vaporet M. B. ad Electuarii spissitudinem.

Eodem

Eodem modo condensetur in speciem Extracti

Succus e Baccis maturis

Ebuli,

Sambuci ;

*Similiterque paretur ex Fructibus Cucumeris
agrestis Elaterium, cujus dosis a granis
tribus ad sex.*

ROB BACCARUM JUNIPERI.

Baccæ Juniperi mundatæ, & contusæ in Aquæ decuplo macerentur per dies tres: deinde ex alembico, cui appositum sit capitellum cum refrigeratorio, distillentur usque dum Oleum essentiale una cum Aqua prodire desinat, quod ab ea per infundibulum separatum serva: tum superstes materia prælo exprimatur. Elicitus Liquor per pannum trajectus in patella vitreata evaporet in Extractum, cui Oleum essentiale, quod asservatum fuit, accurate admisceatur.

S A P A V I N I.

Mustum ex uvis maturis expressum, & percolatum in fictile vaporet leni igne ad Syrupi consistentiam.



§. IV.

RESINÆ.

RESINA JALAPPÆ.

R Radicis Jalappæ contusæ libram unam ;
 Spiritus Vini alcoholisati libras octo :
 In lagena vitrea optime clausa per dies quindecim
 fiat maceratio, deinde calente M.B. per diem unum,
 alterumve digestio. Refrigeratis vasis defundatur
 cum expressione Liquor tinctus, & panno percole-
 tur : tum cucurbitæ vitreæ inditus, apposito capitel-
 lo eatenus eliciatur, ut Extractum remaneat instar
 liquidæ Terebinthinæ; quod Aqua prius immersum,
 & ablutum tepido loco exsiccet. Dosis a granis
 decem ad quindecim.

Simili modo extrahi possunt Resinæ

Mechoacannæ, cujus dosis a granis
 quindecim ad viginti ;

Scammonii) quorum dosis a granis octo

Turpethi) ad duodecim.



CAPUT XV.

DE TINCTURIS,

Et quibusdam id genus Balsamis, atque
Elixiriis.

§. I.

TINCTURÆ.

TINCTURA ALOES.

R Aloes Epaticæ uncias duas;
Spiritus Vini rectificati. libram unam:
In matraccio rite clauso supra tepentem arenam tri-
duo digere: Spiritum tinctum percola, & ad usum serva.
Juxta eandem normam eliciatur Tinctura

Benzoini,
Hieræ,
Ligni, & Gummi Guajaci,
Sanguinis Draconis,
Sarcocollæ.

TINCTURA ANTIMONII.

R Antimonii Hungarici pulverati libram unam,
Liquoris Nitri fixi uncias octo:
In vitreo vase obturato, identidem commovendo,
tandiu maneant, donec Liquoris saturatus color sit: tum
is una cum Antimonio igne lenissimo in massam siccam
evaporet.

A a

R Hu-

R Hujus massæ pulveratæ quantum vis ;
 Spiritus Vini alcoholisati duplum :
 In vasculo vitreo digerantur horæ spatio : postea Tinctura per chartam trajiciatur.

TINCTURA CASTOREI.

R Castorei Russiensis uncias duas ;
 Liquoris Nitri fixi semunciam ,
 Spiritus Vini alcoholisati libram unam :
 In vas circulatorium immisso Castoreo Nitri Lique-
 rem affunde : adde post horas aliquot Vini Spiritum , &
 commissuris obstructis triduo digere . Refrigerato vase
 Spiritum per inclinationem defunde , & charta perco-
 latum ex cucurbita vitrea ad tertias M. B. distilla : Li-
 quor tinctus in cucurbitæ fundo remanens asservetur in
 vitreo vase . Porro distillatum Spiritum residuo Casto-
 reo rursus affunde : digere : exprime : secretoque Nitri
 Liquore per chartam trajice : trajectum hunc Spiritum
 cum altero , qui asservatus fuit , commisce , & in am-
 pulla vitrea accurate occlusa reconde .

Simili modo parabis Tincturam

Myrrhæ ,

Succini .

TINCTURA CROCI.

R Croci forfice incisi uncias duas ;
 Spiritus Vini rectificati ,

Aquæ

Aquæ communis ana uncias sex :
 Extrahatur Tinctura , ut artis est.

TINCTURA HÆMATITIS.

R Florum Salis Ammoniaci cum lapide Hæmatite
 tribus Cohobiis sublimato-
 rum unciam unam , & semis ;
 Spiritus Vini alcoholisati uncias sex :
 Digerantur in matraccio, usque dum Spiritus aureo co-
 lore intinctus sit .

TINCTURA LACCÆ.

R Gummi Laccæ in ramulis puri , &
 contusi uncias duas ,
 Aluminis usti pulverati drachmam unam , &
 semis ,
 Spiritus Cochleariæ libram unam ;
 In vase circulatorio digerantur , usque dum Tinctura
 impense rubeat : tum refrigerata percoletur , & in vi-
 treo vase optime clauso asservetur .

N. Aquæ etiam distillatæ ad Tincturam Laccæ simili
 modo extrahendam adhibentur .

TINCTURA MARTIS IN SUCCO
COCHLEARIÆ.

R Cochleariæ in aurora collectæ , &
 minutim incisæ libras octo ;

Cucurbitæ stannæ capitello munitæ indatur, & M.B. eliciatur Aqua ad uncias sex, quæ fervetur: deinde ex cucurbita Cochlearia exempta tundatur in mortario marmoreo, præloque exprimatur Succus, in quo triduum digeratur scobis ferri rubiginosæ... ad uncias octo. Facta digestionem in olla ferrea leniter coque ad medias: cola, & iterum lento igni trade, ut evaporet in consistentiam Electuarii, cui demum Aquam prius elicitam diligenter admisce. Tincturam habes in vase vitreo bene obturato servandam.

*Eodem modo parantur Tincturæ Martis
in Succo Absinthii,
Nasturtii, &c.*

TINCTURA MARTIS IN SUCCO POMORUM.

R Scobis ferri rubiginosæ . . . libram unam,
Succi Pomorum curtispiculorum . . . libras octo:
In olla ferrea supra cineres calidos per triduum digestio fiat: tum ad medias evaporatio. Tinctura percolata ad Syrupi consistentiam exhalet.

*Similiter extrahenda Tincturæ Martis
cum Succo Acetosellæ,
Fumariæ, &c.*

Item cum Vino.

N. Hæ Martiales Tincturæ per evaporationem in Extractum redigi possunt.



TINCTURA MARTIS CUM TARTARO.

R Scobis Ferri rubiginosæ libram unam,
Tartari albi pulverati libras duas,
Aquæ pluvialis libras triginta:

In vase ferreo amplo ad horas duodecim lente bulliant: spatha ferrea identidem agita, & sensim adde Aquam ferventem loco ejus, quæ in vaporem abierit. Peracta ebullitione quiescat materia, & subsidat: tum supernatans niger Liquor charta trajiciatur, & ad Syrupi consistentiam evaporet.

TINCTURA SALIS TARTARI.

R Salis Tartari libram unam,
Spiritus Vini alcoholisati . . libram unam, & semis:

Tartari Salem in crucibulo cooperto calcina igne vehementi, donec rubellus evaserit: tum exime: in mortario calefacto tere, & adhuc tepentem pulverem pone in matraccio, affusoque Vini Spiritu vas obstrue: lenissimo arenæ igne tandiu digere, dum Liquor valde rubeat. Refrigerato vase Tincturam defunde: per chartam trajice, & in vitreo vase obturato asserva.

TINCTURA SULPHURIS;

V. Balsamum Sulphuris cum Vini Spiritu.

TINCTURA ABSINTHII.

R Summitatum Absinthii vulgaris floridi incisarum uncias sex,
Spiri-

Spiritus Vini alcoholisati . . . libram unam :
 In cucurbita vitrea duodecim horarum spatio mace-
 rari sine : tum M. B. fere ad siccitatem distilla . In Li-
 quore distillato infunde

Summitatum Absinthii Pontici tenui-

folii exsiccati semunciam ,

Caryophyllorum drachmas duas ,

Salis Tartari drachmas tres ,

Ambari cineracei pulverati . . . drachmam unam :

Ambarum Sali Tartari in mortariolo lapideo admisce:
 cum cæteris in vitreo vase circulatorio digere , donec
 Liquor bene saturatus sit , qui charta percoletur .

TINCTURA ANODYNA, SIVE LAUDANUM LIQUIDUM.

R Opii semunciam ,
 Croci drachmas duas ,
 Cinnamomi ,
 Caryophyllorum ana drachmam semis ,
 Vini malvatici . . . uncias quatuor cum dimidia :

Digerantur octo fere diebus in vitreo vase bene clauso
 identidem agitando . Tinctura expressa , & percolata
 servetur . Dosis a guttis quinque ad quindecim .

TINCTURA CÆPHALICA.

R Florum recentium Lilii Convallium . . . uncias sex ,
 Stœchadis Arabicæ unciam unam ,
 Spiritus Ceraforum nigrorum recti-
 ficati libram unam :

In-

Infunde , & digere per horas sex in matraccio vitreo optime clauso , cui postea capitellum adjice , & M. B. Spiritum evoca, in quo iterum infunde, & triduo digere
 Succini albi præparati unciam unam,
 Cubebarum drachmas tres:
 Liquorem exprime , per chartam trajice , & in vase vitreo reconde .

§. II.

TINCTURÆ, QUÆ BALSAMA SOLENT APPELLARI.

BALSAMUM SULPHURIS.

R Florum Sulphuris unciam unam , & semis,
 Olei Nucum Juglandium uncias sex:
 Digerantur , donec Oleum bene saturatum sit : tum cola.

Sic paratur Balsamum Sulphuris
 cum Oleis expressis

Anisorum ,

Olivarum ,

Itemque cum Balsamo Copaiba , & cum

Oleo crasso Succini ,

Terebinthinæ , &c.

BALSAMUM SULPHURIS CUM VINI SPIRITU.

R Florum Sulphuris uncias quatuor;
 Salis Tartari uncias duas:

In

In mortario marmoreo commisceantur : tum indita crucibulo liquefiant , & liquata mancant , donec fusa materia spadiceum colorem æmuletur. Hanc supra lapidem illitum effunde : frige factam tere , pone in matracio , & adjice

Spiritus Vini alcoholisati libram unam :

Digere , quoad rubicundum colorem saturum Liquor adeptus sit , qui tum percolandus.

Eadem ratio est conficiendi Balsamum Sulphuris

cum Oleo essentiali Anisorum ,

Fœniculi ,

Terebinthinæ ,

& cum Oleo claro Succini.

BALSAMUM CATHOLICUM EX VINO, VULGO BALSAMUM INNOCENTIANUM.

R Benzoini uncias tres ;
Styracis Calamitæ uncis duas ,
Balsami Peruviani sicci unciam unam ,
Aloes Soccotrinæ ,
Myrrhæ ,
Olibani ,
Radiciſ Angelicæ odoratæ ana ſemunciam ,
Florum Hyperici ſiccatorum manipulos quatuor ,
Vini rubri libras quatuor :

Hyperici Floribus , & Angelicæ Radicibus in lagena vitrea poſitis Vinum ſuperfunde ; quo bene obturato vaſe digeſtio per triduum fiat : poſtea Liquorem refrigera-

geratum exprime : in eo cætera contusa per dies quindecim digere, materiam sæpe agitando. Tandem cola, & ad usum serva.

IDEM BALSAMUM CUM VINI SPIRITU:

R Magma ex præparatione Balsami Catholici in Vino facta rite siccatum,

Radicis Angelicæ odoratæ semunciam;

Florum Hyperici siccatorum unciam unam,

Spiritus Vini alcoholisati libras quatuor:

In vase diligenter occluso identidem agitando per dies octo digere: postquam fæces subsiderint, Liquorem percola, & in vitreo vase repone subere, & velica obturando.

§. III.

ELIXIRIA:

ELIXIR BEZOARDICUM.

R Radicis Contrayervæ Hispanicæ,

Serpentariæ Virginianæ,

Summitatum Absinthii Alpini,

Croci ana drachmas duas;

Opii drachmam unam:

His omnibus incisis affunde

Spiritus Vini rectificati,

Spiritus Baccarum Sambuci . . ana uncias quatuor:

Triduo digere in vase circulatorio: tum per char-

Bb

tam

tam trajice Liquorem, in quo dissolve

Camphoræ drachmam unam:

Tandem in ampullis vitreis optime clausis repone.

Datur ad triginta circiter guttas.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO:

R Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ electæ,
Croci ana unciam unam;
Spiritus Sulphuris semunciam;
Spiritus Vini alcoholisati . . libram unam, & semis:
Aloe, & Myrrha in subtilem pulverem terantur:
Crocus forfice incidatur. His in vase circulatorio vitreo
positis, affusioque Vini, & Sulphuris Spiritu per octo
dies digestio fiat. Tincturam decanta, & per chartam
cola: inde in cucurbitam vitream, atque in igne lenissi-
mo ad uncias circiter decem Spiritum abstrahere, Tinctu-
ramque in cucurbitæ fundo remanentem seponere. Eli-
citum Spiritum magnati affunde, & diebus octo digere:
postea Liquorem exprime, cola, & cum priore Tinctura
asservata commistum in vitreis ampullis reponere subere,
& vesica obturandis.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO:

Hujus parandi ratio a superiore tantum differt, quod
loco Spiritus Sulphuris adhibetur Nitri fixi Liquor, quo
Myrrha pulverata perfecte saturanda, & in pulvem redi-
genda est, dein calore mitissimo siccanda.

ELI-

ELIXIR VITÆ.

R Corticis Citri recenter derafi uncias sex,
 Summitatum Melissæ manipulos tres,
 Spiritus Vini rectificati libram unam:
 In cucurbita vitrea viginti quatuor horis digere: po-
 stea aptato capitello ad siccitatem fere M. B. distilla.

In Spiritu prolecto infunde

Radiciſ Acori incisi,
 Angelicæ odoratæ,
 Zedoariæ,

Croci,

Cinnamomi ana drachmas duas:

Per dies tres digestionē facta M. B. Spiritum elice,
 in quo rursus infunde, ac triduo digere

Novi Corticis Citri derafi uncias tres,
 Vanillæ semunciam:

Tandem exprime, & per chartam cola.

CAPUT XVI.

DE CALCINATIS.

ÆRUGO, SIVE ÆS VIRIDE.

Æ Ris laminæ cum Vinaceis expressis stratificentur:
 tum per intervalla pauculo Aceto, vel Urina asper-
 gantur. Sic maneant usque dum Æruginem contraxe-
 rint: qua cultro abraſa iterum stratificatio fiat. Cum
 Æruginem omnem collegeris, Aceti Spiritu dissolve,
 cola, & per evaporationem sicca.

Æ S U S T U M.

Ex citrino Sulphure, & Cupri laminis in vase figulino fiat stratum supra stratum, ita ut summum pariter, atque infimum ex Sulphure stratum sit: deinde vase inter accensos carbones collocato ignis augeatur ad Sulphuris deflagrationem. Remanens materia si facile pulverari nequeat, novo Sulphure adjecto iterum calcinetur: tum Aqua calida ablutus Pulvis ficcetur.

ALUMEN USTUM.

In terreo vase tandiu calcinetur Alumen, dum totum deferbuerit, & porosum penitus, ac veluti spongiosum evaserit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

R Antimonii Hungarici libram unam;
Nitri purificati. libras tres:

In subtilem pulverem separatim tere: tum simul permista in ollam candentem iteratis vicibus projice: cum detonuerint, ad horæ dimidium igne valido calcina: spatha ferrea materiam sæpe revolve, ut æque omnis conflagrare possit: indeque eam adhuc calidam exime: in Aquam ferventem injice: agita, & Aquam albidam in fictile vitreatum effunde: post aliam pariter calidam residuæ materiæ superadde, agita, & per inclinationem defunde, donec clara maneat, & fæces dumtaxat superfint. Aquas omnes effusas, ac turbidas per telam
laxam

laxam trans mitte in vas idoneum. Brevi subsidebit Pulvis, qui sæpius fervente Aqua abluendus, dum omnino fiat insipidus. Demum supra chartam bibulam in calido loco exsicce tur, & in vitreo vase angusti orificii rite occluso asservetur.

ANTIMONII HEPAR.

R Antimonii pulverati,
 Nitri puri ana partes æquales:
 Mistâ simul, atque ollæ ferreæ indita candente carbone admoto detonent: olla frige fiat: tum a scoriis partim subnigris, partim cineraceis Hepar separetur.
 N. Hoc pulveratum Aqua calente bis terque abluatur, qua per inclinationem effusa, Pulvis siccatur. Hepati per lotiones ita præparato Croci Metallorum nomen impositum est; quo tantummodo ad conficiendum sive Tartarum, sive Vinum Emeticum utimur.

ANTIMONII REGULUS.

R Antimonii Hungarici uncias sexdecim;
 Tartari crudi libram unam,
 Nitri puri uncias sex:
 Pulverata, & commista in crucibulum candens per partes injiciantur: cum detonuerit, ignis augeatur, ut materia lique scat, & in modum Olei bulliat: tum effundatur in conum fusorium calefactum, & sebo illitum, coni latera concutiendo, ut Regulus fundum petat. Frigefacto cono Regulum a scoriis separa: in Pulverem terre:

re : in alio crucibulo semel , atque iterum liqua , paululum Nitri addendo ; tum in conum effunde , & a scoriis separatum Regulum serva .

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

R Apicum Clavorum libram unam ;
Antimonii Hungarici triti . . libram unam , & semis ,
Nitri pulverati uncias sex :

Clavorum apices in crucibulo ignescant : deinde Antimonium injice : cum liquari materia cæperit , Nitrum sensim insperge , quo prorsus ea liquetur : tum eandem fusam in ferreum conum calefactum , & inunctum effunde . Refrigeratum Regulum a scoriis separa : iterum tere , additaque

Antimonii pulverati . . . uncia una , vel altera ,
in crucibulo liqua . Hisce optime liquatis paulatim adjice
Nitri pulverati uncias quatuor :

Injecto Nitro ignis assidue urgeatur , donec Nitrum , & Regulus instar Aquæ fluant ; in quo statu ad horæ quadrantem permaneant : postea in conum effundantur , eoque inconcusso refrigescant : tum Regulus a subviridi scoria sejungatur , & ad usum fervetur .

ANTIMONII CERUSSA.

Pulveratus Antimonii Regulus triplo Nitri admistus detonet : tum per horæ quadrantem calcinetur , abluitur , & supra chartam siccetur .

ANTI-

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS,
VULGO SPECIFICUM STOMACHICUM.

R Reguli Antimonii Martialis . . . libram unam,
 Nitri purificati . . . libras tres:
 In tenuissimum pulverem separatim trita, dein com-
 mista in candentem ollam ex cochleari per partes proji-
 ciantur: detonent: tum per quartam horæ partem ur-
 geatur ignis, ut materia in calcem albam redigatur. Calx
 adhuc calens in Aquam ferventem injiciatur, novaque
 Aqua calente tandiu abluatur, donec insipida sit: deni-
 que supra chartam exsiccetur.

ANTIMONII CERUSSA JOVIALIS,
VULGO ANTIHECTICUM POTERII.

R Reguli Antimonii Martialis,
 Stanni Anglici . . . ana uncias sex,
 Nitri purgati . . . libras tres:
 Regulus, & Stannum in crucibulo simul liquentur: po-
 stea in conum fusorium calefactum, & inunctum effun-
 dantur: frigant: tum Regulum refrigeratum a scoriis
 separa: in tenuissimum pulverem redige, & Nitro pul-
 verato commisce. Mista in crucibulum candens pau-
 latim immitte: detonent: mox igne vehementi calci-
 nentur, donec abeant in massam cæruleam, quam ad-
 huc calidam Aqua fervente semel, & sæpius abluere, &
 sicca, uti de Antimonio diaphoretico dictum est.

CROCUS MARTIS APERIENS CUM
SULPHURE.

R Scobis Ferri libram unam;
 Sulphuris citrini pulverati libras duas:
 Mista simul in olla terrea calcinentur, & spatha ferrea sæpe revolvantur, ut totum Sulphur deflagret: tum ferreus Pulvis subrubeus abluatur, & lævigetur.

CROCUS MARTIS ASTRINGENS.

Rubiginosam Ferri Scobem in patella terrea igni adeo vehementi committe, ut assurgens flamma eam quoquo versus attingat; ac tandiu calcina, donec rubescat: tum Aceto Vini acerrimo abluere, & in pulverem tenuissimum læviga.

MAGNESIA ALBA.

Residuus a Nitri crystallisatione Liquor in olla terrea ad siccitatem evaporet modico igne, qui postea augeatur, ut materia liquecat: tum hæc in fictile Aqua fervente semiplenum effundatur: subsidebit Pulvis albus, quem iteratis lotionibus edulcatum in calido loco siccare, postremo reverberare oportet.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER
ITA DICTUS.

R Mercurii per corium trajecti uncias duas;
 Spi-

Spiritus Nitri uncias tres:

Retortæ vitreæ indito Mercurio Spiritum Nitri sensim affunde, lenique igne arenæ digere, donec Mercurius omnino dissolutus sit: tum adjecto excipulo, atque igne per gradus adaucto ad siccitatem distilla, & ad splendentem ruborem calcina.

PLUMBUM USTUM.

R Laminarum Plumbi,
Sulphuris Citrini pulverati. ana quantum vis:

In olla terrea stratum supra stratum construatur: tum vehementi igne Sulphur deflagret. Ustum Plumbum, & denigratum manebit in testæ fundo, quod optime abluendum est, & lævigandum.

VITRIOLUM CALCINATUM.

Pone Vitriolum viride in olla fictili non vitreata, & supra ignem lenem detine, usque dum coeat in massam albidam, & prope cineraceam. Quod si ignem valde urgeas, rubrum induet colorem: Colcothar vocant.

N. Aqua calente infunde Colcothar: dein fervefacito: tum decanta; idque nova Aqua affusa tandiu repete, donec ea insipida maneat. Superstitem materiam sicca, quæ Terra dulcis Vitrioli appellatur,



CAPUT XVII.

DE PRÆCIPITATIS:

AURUM FULMINANS.

R Scobis Auri purissimi . . . drachmas duas ;
 Aquæ Regiæ . . . unciam unam :

In cucurbitulam vitream inde Auri Scobem : Aquam Regiam sensim adjice : digestio fiat calore leni ad Auri totius dissolutionem : tum Aquæ communis sextuplum affunde : postea Oleum Tartari per deliquium q. s. instilla : sine Liquorem quiescere : subflavus Pulvis præcipitabitur , qui sæpius repetita Aquæ affusione edulcatus supra chartam in umbra siccetur.

Dosis a grano uno ad quatuor.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Reguli Antimonii Scorix fictili vitreato inditæ in Aqua bulliant : solutioni per chartam trajectæ Acetum acerrimum affunde : præcipitabitur Pulvis ex flavo rubei coloris , Aqua tepida multoties abluendus , tum supra chartam siccandus . Dosis a granis duobus ad sex.

KERMES MINERALE.

R Antimonii Hungarici confracti rejecto
 pulvere . . . libras sex ;
 Nitri fixi . . . libram unam , & semis ;
 Aquæ

Aquæ pluvialis libras duodecim :
In olla terrea vitreata triduo digerantur : dein lento
igne bulliant : tum quatuor circiter libras fervidi Liqueo-
ris decanta , & colo chartaceo trajice , cui amplum vas
figulinum suppositum sit . Liquori una cum Antimonio
in olla superstiti adjice

Aquæ pluvialis ferventis : . . . libras octo ,
Nitri fixi libram unam , & semis :
Leni igne ad medias decoque ; defusique , ut antea ,
Liquoris calidissimi libras tres per chartam cola ; super-
stiti affunde

Pluvialis Aquæ ferventis libras octo ,
Nitri fixi libram unam :
Coque iterum ad medias , & totum Liquorem cali-
dissimum percola : omnes deinde simul misti Liquores
quiescant , donec Pulvis ruber subsidat : tum decanta ,
ad siccitatem evapora , & Nitrum fixum serva . Pulve-
rem rubrum Aqua sæpius ablue , & in fictile ad calorem
lenissimum sicca . Huic affunde Vini Spiritum alcoh-
olisatum , qui deflagret ; idque semel atque iterum repete ;
tum in vitreo vase bene clauso Pulverem reponere . Dosis
a granis duobus ad quatuor .

MAGISTERIUM SULPHURIS.

R Sulphuris citrini pulverati libram unam ,
Calcis vivæ libras tres ,
Aquæ communis libras viginti :
In fictili vase , quantum satis , bulliant , ut rubro co-
lore saturetur Aqua , cui per chartam trajectæ affunda-

cur solutio Aluminis purificati. Turbidus fiet Liquor, & lacteus; idcirco Lac Sulphuris appellatus. Nihil interea movendum; sponte enim præcipitabitur Pulvis albus, quem Aqua calente edulca, postea sicca.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R Mercurii per distillationem purificati..uncias duas;
Aquæ fortis uncias tres:

In Aqua forti solvatur Mercurius, tum effundatur in fictile vitreatum, quod Aqua marino Sale puro saturata semiplenum sit. Post aliquot dies albus Pulvis subsidebit, Aqua tepida edulcandus, & supra chartam in hypocausto siccandus.

CAPUT XVIII.

DE SUBLIMATIS.

FLORES ANTIMONII MARTIALES, VULGO NIX MARTIS.

R Reguli Antimonii Martialis iteratis fusionibus rite expurgati, & pulverati libram unam:

In vase figulino, cujus ima pars plana sit, ponatur Regulus, ac desuper scutella parvæ altitudinis in centro perforata intra idem vas ita collocetur, ut Regulum non attingat; præterea operculum vasi aptetur, in quo ipsa etiam inclusa maneat scutella: tum in furno prunis suppositis

positis vas constituatur, atque ignis adeo augeatur, ut restæ fundus candeat, & liqueatur Regulus. Post horæ spatium cesset ignis, & vasis refrigeratis hærentes hinc, & illinc, atque in ipsa præsertim Reguli superficie nivei, ac splendentes flocculi colligantur: deinde eandem operam toties repete, donec Regulus fere totus in Flores abierit.

FLORES BENZOINI.

Benzoinum contusum, & in cucurbitam inditum vitreo capitello cæco præditam igne arenæ leni sublimetur. Refrigerata cucurbita capitellum amove: Flores collige, & sepone; idque toties repete; donec flavi Flores una cum Oleo attolli incipiant.

FLORES SULPHURIS.

Citrini Sulphuris contriti aliquot uncias in cucurbitam terream injice, cui adiecto cæco capitello vitreo, vel potius lignea capsula, sublima igne arenæ, cavendo ne Sulphur liqueatur. In capsulam Flores assurgent, qui sæpe amovendi sunt; tum novum Sulphur adhibeto, ut, quam velis, Florum quantitatem obtineas.

FLORES SALIS AMMONIACI.

R

Salis Ammoniaci,
Salis Marini decrepitati . . . ana partes æquales:
Pulverata, & bene commista in terream cucurbitam
humi-

humilem immitte: tum apposito capitello, & excipulo subjiciatur ignis initio lenis, qui postmodum per gradus augeatur, usque dum cucurbitæ fundus candeat. Stillabit primo Spiritus in excipulum: post Flores ascendent, atque hærebunt capitello, & cucurbitæ lateribus. Hi exempti in ampulla vitrea bene obturanda recondantur.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

R Salis Ammoniaci,
 Scobis Ferri ana quantum libet:
 Facta ad dies tres digestionem ex cucurbita capitello, & excipulo instructa sublimentur Flores, qui capite mortuo deinde remiscendi sunt, & iterum sublimandi. Flammam Liqueorem, quem in excipulo reperies, tanquam Spiritum Salis Ammoniaci Martialis serva.
Sic parentur Flores Salis Ammoniaci cum Hæmatite.

CINNABARIS.

R Mercurii libras duas;
 Sulphuris Citrini pulverati libram unam:
 In olla terrea ad ignem lenem liquato Sulphure Mercurius è corio stillans commisceatur, pistillo ligneo continenter versando, donec perfecte commistus sit, & involutus Sulphure, ut amplius non appareat. Tunc refrigeratam Massam, & in Pulverem redactam mitte in cucurbitam terream, & sensim adaucto igne in Cinna-
 barim sublima.

N.

N. Si triplo ferreae Scobis admisceatur Cinnabaris ;
atque ex retorta cum excipulo Aqua semipleno institua-
tur distillatio , iterum prodibit Mercurius , qui propte-
rea redivivus appellatur .

CINNABARIS ANTIMONII.

R Antimonii ,

Mercurii sublimati corrosivi ... ana libram unam :

Mercurium sublimatum tere in mortario marmoreo,
& cum Antimonio pulverato commisce : postea ex vi-
treâ loricata retorta , cui aptatum sit parvulum excipu-
lum , distilla , ignem gradibus augendo , usque dum fu-
mi rubescences apparere incipiant. Habebis Oleum cras-
sum , seu Butyrum Antimonii , quod , ubi in retortæ
collo concreverit , carbone ardente admoto fluidum
reddes : Id collectum in vase vitreo obturato asserva .
Caput mortuum in aliam retortam immitte : ignem gra-
datim adhibe , ut evehatur Cinnabaris ad collum retor-
tæ , è qua refrigerata illam exime : in pulverem tere ,
ablue , sicca , atque iterum sublima. Dosis a granis
sex ad duodecim .

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R

Mercurii Aqua forti dissoluti , & in massam siccam
evaporatione redacti ,

Vitrioli ad albedinem siccati ,

Salis decrepitati . . . ana partes æquales :

In pila marmorea accurate omnia ligneo pistillo ante
com-

commista in vase idoneo ponantur, cujus media saltem pars vacua relinquatur: tum igne arenæ sensim adaucto sublimatio fiat. Mercurius sublimatus è vasis lateribus detergatur, & solus denuo sublimetur, ut purus, ac pellucidus evadat.

MERCURIUS DULCIS.

R Mercurii sublimati corrosivi ... uncias quatuor, Hydrargyri distillatione purificati ... uncias tres: Mercurium sublimatum in mortario marmoreo contere: deinde Hydrargyrum instilla, pistilloque ligneo agita, & tandiu commisce, dum globuli mercuriales invisibiles sint: tum subnigrum Pulverem pone in ampulla vitrea, cujus dimidia pars vacua maneat, & igne arenæ ad horas sex per gradus adhibito sublimatio fiat. Qua peracta confringe ampullam: a fordibus, & pulvisculo quodam ad ejus collum hærente separa: etiam sexies sublima, vel donec omnino insipidus deprehendatur.

PANACEA MERCURIALIS.

Mercurium dulcem pulveratum, & in ampullam vitream inditum sublima: sublimatum a facibus separa, tere, sublima; idque sexies repete: tum læviga: in matracio pone: Vini Alcohol affunde, quod ad tres digitos emineat, & vas identidem commovendo, diebus octo digere: tum Alcohol accende, cujus deflagratione absolvitur operatio.

CAPUT XIX.

DE OLEIS.

§. I.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Selectæ Amygdalæ, & rudi tela fricatæ pistillo ligneo contundantur in mortario lapideo, usque dum in massam coeant. Hæc torculo subjecta leviter primum, postea valide comprimatur. Oleum expressum per chartam trajici solet.

Similiter extrahuntur Olea

Amygdalarum amararum,

Avellandarum,

Nucum Juglandium,

Nucleorum Persicorum;

Pini,

Pistaciorum;

Seminum Cannabis,

Cucumeris,

Hyperici,

Lini,

Papaveris albi, &c.

N. Ex Oleis quibusdam recens expressis præsertim Amygdalarum dulcium Gelatina paratur in hunc fere modum:

R Olei recens expressi ex Amygdalis
 dulcibus uncias duas ;
 Amygdalarum dulcium decortica-
 tarum drachmas tres ,
 Nucleorum Persicorum . . . drachmam unam ,
 Sacchari canti drachmas duas :
 In mortario lapideo cum Nucleis , & Saccharo dili-
 genter Amygdalas tere . Oleum sensim insperge , & su-
 bige : tum ijs optime tritis , arque subactis Aquæ semun-
 ciam assidue etiam subigendo ad perfectam omnium
 commistionem instilla.

OLEUM E VITELLIS OVORUM.

Ex Ovis coctione induratis Vitellos exime : in mor-
 tario marmoreo tunde : tum in sartagine spatha lignea
 continenter revolvendo , & parum Vini subinde insper-
 gendo assa , donec rubescere , ac spumare incipiant :
 tum calentem massam inde in sacculum ex tela canna-
 bina , quam calefactas inter laminas ferreas prælo com-
 mitte , celeriterque Oleum exprime , & serva.

OLEUM VULGO BUTYRUM DE CACAO.

Cacao fructus pingues , & ponderosi , a cortice mun-
 dati , & in lapidea pila contriti in Aqua tandiu bulliant,
 dum ea omnis absumpta sit : interim spatha assidue re-
 volvantur : his dein sacculo inclusis confestim calido
 prælo exprimatur Oleum , quod stillet in supposito vase
 Aquæ

Aquæ calentis semipleno : tum reponatur vas, donec Aqua refrigerata Oleum concreascit. Hoc autem a subjectis sordibus detersum in sole, vel hypocausto detinendum, ut superfluous humor absumatur : denique per inclinationem ab alio in aliud vas defundatur, ut magis magisque a sæcibus depurgetur.

Oleum Nucis Moschatæ,
 Baccarum Lauri,
 Macis,
 Seminum Anisi,
 Carui,
 Fœniculi, &c.
 Vide Oleum è Baccis Lauri distillatum.

§. II.

PER INFUSIONEM.

OLEUM CASTOREI.

R Castorei Rusliensis : : : : ūnciam unam;
 Liqueoris Nitri fixi : : : : unciam semis;
 Olei Olivarum libram unam :

Crasse contuso, & in matrarium recepto Castoreo Nitri Liqueorem affunde : post horam adde Oleum, inversaque ampulla matrarium obtura : leni calore arenæ triduo digere : tum refrigerato vase exprime, cola, & a subsidente sæce separatum Oleum in vitreo vase bene obturando repone.

OLEUM LUMBRICORUM.

R Lumbricorum terrestrium purgato-
rum libram unam;
Olei communis libras duas:

In duplici vase per dies tres digerantur: brevi bul-
liant: frigefacto vase exprimatur Oleum, quod postea
resideat: tum a fæcibus per inclinationem separetur.

Similiter parari possunt Olea
Formicarum,
Lacertarum viridium, &c.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

R Scorpiones vivos centum;
Olei Amygdalarum amararum libras duas.

In matrarium vitreum inditis Scorpionibus affunde
Oleum: tum obturato vase per dies tres M. B. digere,
deinde Oleum exprime, & defæcatum serva.

OLEUM ABSINTHII.

R Summitatum Absinthii vulgaris floridi recentium,
& incisarum libram unam, & semis,
Olei Olivarum libras tres:

In cucurbitam capitello cæco instructam immitte:
M. B. biduum digere: frigefacto vase Oleum exprime,
& cola, in quo recens incisum Absinthium infunde, ite-
rum digere, & prælo exprime. Sine expressum Oleum
quiescere; postea ab humore aquoso, & a fæcibus separa.

Ad

Ad eandem normam parentur Olea

Herbarum Anethi,

Cicutæ,

Menthæ,

Rutæ,

Florum Chamæmeli,

Cheiri,

Iridis,

Lilii albi,

Meliloti,

Rosarum,

Sambuci,

Violarum,

Fructuum Momordicæ.

OLEUM MASTICHES.

R Mastiches pulveratæ uncias sex;
 Olei Olivarum libras duas:

In vase vitreo optime clauso ad perfectam Mastiches
 dissolutionem fervente balneo digere, tum Oleum cola.

Sic paretur Oleum Euphorbii.

OLEUM LAURINUM.

R Foliorum Lauri latifoliæ recentium inci-
 forum libras tres;

Olei Olivarum, vel Butyri Vaccini . . . libras sex:

In duplici vase per dies tres digere: tum Oleum prælo
 exprime, in quo infunde

Bac-

Baccarum, & Foliorum Lauri tenui-

foliæ ana libram unam, & semis.

In eodem vase triduo, ut antea, digere: postea ex-
prime: cola, & defæcatum Oleum serva.

OLEUM SCORPIONUM COMPOSITUM:

R Olei Hyperici libras quatuor,
Cymarum Scordii,
Rutæ,
Dictamni Cretici..ana manipulos duos,
Radiciſ Zedoariæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Angelicæ odoratæ,
Crocī,
Styracis Calamitæ ana unciam unam,
Terebinthinæ uncias tres,
Scorpiones vivos trecentos:

Folia, Radices, Crocum mundata, & incisa in vas
circulatorium vitreum immitte: obſeratis juncturis M.
B. per triduum digere: tum refrigerato balneo Oleum
exprime, in quo Terebinthina cum Styrace dissolven-
da, vivique Scorpiones suffocandi: agglutinatis iterum
commiſſuris in eodem balneo ad dies tres digere: dein-
de finito vas refrigerſcere: hinc forti expreſſione Oleum
cola, idemque defæcatum in vitro anguſti orificiī rite
occluſo reconde.



§. III.

PER COCTIONEM.

OLEUM DE CATELLIS.

R Catellos recens natos numero sex;
 Olei Olivarum libras sex,
 Vini albi libras tres:

Coquantur primum Catelli tres donec ab ossibus separentur carnes, & Vinum absumptum sit: facta deinde expressione in cucurbitam effundatur Oleum, in quo adhuc fervente tres alii Catelli suffocentur, opertaque cucurbita in digestionem maneat B. M. per integrum diem. Refrigerato balneo exprimatur Oleum a subsidente face separandum, quod in vase vitreo bene obturando reponatur.

Eodem modo fiat Oleum Vulpinum.

OLEUM HIRUNDINUM.

R Pullos Hirundinis numero duodecim;
 Olei Olivarum libras duas,
 Vini uncias octo:

Primum Hirundines vivæ sex bulliant in Oleo, & Vino ad carnis liquamen, Vinique evaporationem; tum exprimatur Oleum, in quo vivæ aliæ Hirundines sex suffocentur: post levem ebullitionem in vase circulatorio refrigeratum Oleum denuo exprimatur, & percoletur.

OLEUM

OLEUM DE CAPPARIBUS.

R Florum Capparidis, antequam aperiri incipiant,
Corticis Radicis ejus-
dem ana uncias quatuor, & semis;
Olei Olivarum libram unam cum dimidia,
Aceti uncias sex:
Coque ad humoris evaporationem: tum cola.

OLEUM DE CUCURBITA.

Cucurbitas longas, quarum adhuc tenellus cortex sit, minutim incisas cum æquali pondere Olei communis igne leni decoque q. s.: tum exprime Oleum, in quo ignita ferri frustula extinguantur, vas sine mora obtendendo, ne Oleum flammam concipiat.

OLEUM HYPERICI.

R Summitatum Hyperici cum Floribus, & Seminibus
contusarum libram unam,
Olei communis libras tres:
In fictile per biduum macerentur, deinde bulliant ad
humoris exhalationem, factaque expressione adde
Summitatum Hyperici ut supra libram unam:
Vase cooperto digere M. B. viginti horarum spatio,
tum exprime Oleum, in quo rursus infunde
Summitatum Hyperici libram unam:
Digere iterum M. B. calente donec Oleum rubro colore saturatum sit: denique forti expressione cola, & defæcatum in vitro reconde.

OLEUM

OLEUM MYRTINUM.

R Baccarum Myrti contusarum . . . libras duas,
 Foliorum ejusdem incisorum . . . manipulos duos,
 Olei Olivarum . . . libras quatuor,
 Aceti . . . libram unam:
 Coquantur ad humoris consumptionem : tum Oleum
 percoletur.

OLEUM BUFONUM, SEU BALSAMUM
TRANQUILLANS.

R Bufones vivos . . . numero duos,
 Foliorum incisorum Solani hortensis,
 Hyosciami albi,
 Mandragoræ,
 Nicotianæ,
 Ebuli,
 Salicis . . . ana manipulos duos,
 Olei communis . . . libras sex:
 In fictili vase lente coquantur, & cum evaporatione
 humor absumptus sit, exprimatur Oleum, in quo in-
 funde

Bufones . . . numero duos,
 Summitatum Absinthii vulgaris,
 Calaminthæ montanæ,
 Hyssopi,
 Majoranæ,

Ec

Rutæ,

Rutæ,
 Thymi . . . ana manipulum unum,
 Florum Rosmarini,
 Salviæ,
 Lavendulæ,
 Hyperici,
 Sambuci . . . ana manipulum unum :

In cucurbita, cui cæcum capitellum impositum sit,
 per diem integrum digere M. B. quo deinde refrigerato
 Oleum exprime, defæca, atque in lagena vitrea re-
 conde.

OLEUM DE MUCILAGINIBUS.

R Radicum Althææ,
 Lili albi,
 Seminis Fœnugræci . . . ana unciam unam,
 Aquæ communis . . . libras duas,
 Olei Olivarum,

Lini . . . ana libras duas;
 Althææ contusæ, & incisæ, Lili autem in laminas
 solutæ Radices, Fœnugræci Semen integrum in Aqua
 ad mucilaginem extrahendam macerentur: deinde ad-
 jectis Oleis, spatha lignea assidue agitando, lente co-
 quantur, donec humor absumptus sit: tum Oleo per-
 colato, & in cucurbitam effuso adde

Florum Lili albi recentium,

Chamæmeli . . . ana libram unam :

Cæco capitello obstrue cucurbitam, & fervente bal-
 neo per diem digere: tum exprime Oleum, cola, &
 defæcatum serva.

§. IV.

PER DISTILLATIONEM

I. ESSENTIALIA.

OLEUM ABSINTHII.

R Summitatum Absinthii ad seminis productionem
 accedentis in umbra exsiccatarum,
 & contusarum . . . libras viginti quinque,
 Salis Marini libras quatuor:

Ponantur in dolio ligneo, eaque affusa tepentis Aquæ
 copia, qua Absinthium submergatur, sex dierum spa-
 tio macerentur: tum ex campana refrigeratorio instru-
 cta per partes distillatio fiat. Stillans Aqua excipiatur in
 ampulla collo oblongo prædita, & rostro ex ventre il-
 lius producto, ex quo scilicet manabit Aqua, rema-
 nente Oleo in collo ampullæ.

Simili modo extrahuntur Olea

Herbarum Majoranæ,

Menthæ,

Origani,

Pulegii,

Rosmarini,

Rutæ,

Salviæ,

Thymi,

Florum recentium Mali Aurantiæ,

Chamæmeli;

Lavendulæ,

Ee 2

Radi-

Radicum Angelicæ odoratæ,
Peucedani,
Valerianæ.

OLEUM CINNAMOMI.

R Cinnamomi optimi libras tres,
Aquæ communis libras viginti quinque,
Salis Marini uncias sex:

In vitrea capaci retorta trinis diebus macerari sine:
tum apposito excipulo, atque obturatis commissuris,
igne arenæ tertii gradus ad medias distilla, vel donec
Liquor non amplius albidus prodeat, quem refrigeratis
vasis in vitreum infundibulum effunde: supernatans
Oleum separa: Aquam residuam ad dies quindecim, &
ultra in cella repone: subsidebit Oleum alterum ab ea
segregandum, & Oleo primum elicito immiscendum.

Ad eandem normam distillantur Olea

Caryophyllorum,
Sassafras, & similia.

OLEUM CITRI.

Derafos Citri Cortices ex cucurbita stannea distilla
M. B., Oleumque supernatans ab Aqua per infundibulum
separa.

Similiter eliciuntur Olea

Aurantiorum,
Citri Florentini odoratissimi,
Limonum.

N.

N. Ex Oleis essentialibus parari solent Elæosacchara sequenti modo :

R Olei essentialis drachmam unam ;
 Sacchari Canti in tenuissimum pul-
 verem redacti unciam unam :

In mortariolo vitreo , vel lapideo diligenter com-
 misceantur : tum Elæosaccharum in vitreo vasculo op-
 time clauso asservetur .

OLEUM E BACCIS LAURI.

Baccas Lauri maturas , exsiccatas , & paullum con-
 tusas in Aquæ communis decuplo macera : tum ex cam-
 pana ad medias distilla . Oleum essentielle supernatans
 cum per infundibulum separaveris , calidum magma præ-
 lo committe ; expressumque Oleum , ubi instar pingue-
 dinis concreverit , collige .

Sic eliciuntur Olea essentialia , & expressa

Macis ,

Nucistæ ,

Seminum Anisi ,

Carvi ,

Fœniculi , &c.

II. EMPYREUMATICA.

OLEUM CERÆ.

R Ceræ flavæ libram unam ;
 Arenæ

Arenæ lotæ , & siccatae . . . libras duas:
Ceræ liquatæ arena admisceatur : tum globuli fiant,
qui in vitream retortam loricatam immittantur : suppo-
sito igne primum leni , dein per gradus augendo prodi-
bit Liquor limpidus , mox Oleum instar Butyri coagula-
tum. Hoc ab eo Liquore separatum , & novæ arenæ
admistum in parvula retorta distilletur igne arenæ ; id-
que toties repetatur donec fluidum exstillet.

OLEUM, VULGO BALSAMUM ECHINI.

Ponantur vivi Erinacei in terrea cucurbita vitreata,
cui vitreum capitellum adjectum sit , atque amplum
excipulum. Distillatio fiat igne gradatim aucto , donec
fumus desinat. Qui prodierit Liquor cum tertia parte
Aceti commisceatur , & igne lenissimo ad Balsami li-
quidi consistentiam exhalet.

OLEUM DE LATERIBUS , SEU OLEUM PHILOSOPHORUM.

Laterum fragmenta candefiant : tum Oleo Olivarum
immergantur , statim vas obtegendo , ne Oleum flam-
mam concipiat. Cum horis fere duodecim immersa
fuerint , eximantur , & contrita terreæ capaci retortæ
indantur : huic amplum excipulum aptetur , juncturis-
que agglutinatis ignis succendatur paulatim augendus ,
donec retortæ fundus candeat ; in quo ignis gradu ad
finem usque distillationis insistendum.

OLEUM

OLEUM GUAJACI.

In testacea retorta Ligni Guajaci Scobem distillationi committe. Prodibit primum Liquor clarus, tum igne ad ultimum gradum sensim adaucto exstillabit Oleum subnigrum, & foetidum, quod a memorato Liquore per infundibulum separabis.

Sic eliciuntur Olea

Ex Ligno Buxi,

Juniperi, & similia.

OLEUM SAPONIS.

Saponi liquato admisce duplum pondus cineris Samentorum: deinde ex retorta terrea loricata igne per gradus adaucto distilla. Refrigeratis vasis Oleum a phlegmate separa, & reconde.

OLEUM SUCCINI.

Ex distillatione Salis volatilis, atque Olei clari Succini superstitem materiam pone in retorta terrea, quam igni reverberii ad Oleum crassius extrahendum committe.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

Retortæ vitreæ pars fere dimidia impleatur Terebinthina, cui stupa, vel arena admista fuerit; apppositoque excipulo igne arenæ distillatio fiat. Præter acidulum phlegma exhibit Spiritus, nempe Oleum æthereum, sive essen-

essentiale. Liqueur autem exstillans cum rufescere cœperit, mutetur excipulum, ac distillatio producat, usque dum rufi huius, crassique Olei nihil amplius prodeat. Utraque Olea rejecto phlegmate seorsum recondantur.

OLEUM CÆRULEUM CHAMÆMELI COMPOSITUM.

R Florum Chamæmeli recentium petalis, seu foliis eorum decidentibus collectorum... libras viginti,
 Aquæ communis quadruplum,
 Petrolei libram unam:
 In figulino vase cooperto per dies duodecim maceratio fiat: tum ex campana refrigeratorio instructa distilla, donec totum Oleum cæruleum elicatum sit.

CAPUT XX. DE UNGUENTIS.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

R Mediani Corticis Sambuci uncias sex,
 Foliorum Lili albi,
 Hyosciami albi,
 Cucurbitæ ana manipulos duos,
 Olei Olivarum libras tres:
 In fictile supra cineres calidos biduo digerantur: paulisper bulliant: tum exprimatur Oleum, in quo defæcatum dissolvantur

Ceræ

Ceræ albæ uncia novem :
Fiat Unguentum .

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

R Radicis Scrophulariæ recentis . . . uncias tres,
Foliorum Hyosciami albi . . . manipulos tres,
Butyri Vaccini . . . libram unam cum dimidia,
Lithargyri præparati uncias duas,
Vitellos Ovorum numero tres :

Radices, & Folia contusa cum Butyro lente bulliant
ad humoris consumptionem : postea exprime, cola, &
adde Lithargyrum : pistillo assidue agita, donec Un-
guentum refrigeret : tandem adjice Ovorum Vitellos,
& accurate commisce.

UNGUENTUM AD RACHITIDEM.

R Summitatum Serpylli,
Chamæpitys,
Rutæ,
Calaminthæ montanæ,
Florum Sambuci,
Lavendulæ ana manipulos duos,
Axungia Suillæ libras tres,
Sebi Cervini libram unam, & semis,
Olei expressi e Baccis Lauri uncias sex :

Comminutis Herbis, & Floribus, cucurbitæque in-
ditis, adipem liquatam affunde : tum cucurbita opercu-
lata M. B. per triduum digere : hinc adhuc calentes præ-

lo exprime : cola : additoque Oleo Laurino refrigerescere finito : defæca, & in vase reconde.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

R Olei Laurini libras duas,
 Cerae albæ uncias quatuor,
 Florum Sulphuris uncias quinque,
 Radicis Rumicis recentis uncias sex:

Rumicis Radix in Aqua ad pultis formam decocta, tum setaceo transmissa ad humoris superflui consumptionem igne leni evaporet : Cera, & Oleum simul liquefiant, quibus tepentibus Rumicis Pulpam, dein Sulphuris Flores adde, continenter omnia inmiscendo.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

R Viridis Æris pulverati uncias quinque,
 Mellis colati uncias sexdecim,
 Aceti acerrimi uncias septem,
 Aluminis usti unciam semis:

Lente bulliant, & assidua agitatione redigantur ad justam Unguenti consistentiam.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

R Succorum Radicis Bryoniæ libras tres,
 Cucumeris agrestis libras duas,
 Radicum Scillæ,
 Iridis nostratis,

Fili-

Filicis maris ana uncias sex;
 Olei de Mucilaginibus libras quatuor,
 Cerae albæ uncias quindecim:

Radices minutim incisæ per duodecim horas in Succis macerentur : bulliant : cum expressione colentur : postea in molle Extractum, igne leni, assidue agitando evaporent. Cera in Oleo liquefiat ; quibus tepefactis (vase ab igne remoto) paulatim adjice Extractum, & continenter movendo commisce in Unguenti formam.

UNGUENTUM ALBUM, SEU DE CERUSSA.

R Cerae albæ uncias tres;
 Olei rosati libram unam:
 Cera in Oleo liquetur ; tum adde
 Cerussæ pulveratæ uncias quatuor:
 Pistillo ligneo indefinenter agita, donec refrixerint.
Simili modo paretur UNGUENTUM
 DE MINIO.

UNGUENTUM ELEMI, SEU BALSAMUM ARCEI.

R Terebinthinæ,
 Gummi Elemi ana libram unam, & semis,
 Pinguedinis Suillæ libram unam,
 Sebi Hircini libras duas:
 Omnia simul liqua : tum colo trajice.

UNGUENTUM BASILICUM.

R Colophonix,
 Picis navalis,
 Cera flavæ ana uncias sex,
 Olei communis libras duas:
 Simul liquefiant, dein percolentur.

UNGUENTUM CITRINUM, SIVE AUREUM.

R Olei Olivarum libras duas,
 Terebinthinæ libram unam,
 Cera citrinæ,
 Colophonix ana uncias septem,
 Mastiches,
 Olibani pulverati ana uncias duas,
 Croci drachmas duas:
 Cera, Colophonia, Mastiche, & Terebinthina in Oleo
 dissolvantur; quibus colatis, ac tepidis reliqua com-
 misceantur.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

R Olei myrtini libram unam,
 Cera citrinæ, uncias quatuor,
 Mastiches pulveratæ unciam unam:
 His una liquatis addantur ea, quæ sequuntur in pul-
 verem trita:
 Gallarum immaturarum,
 Nucum Cupressi,

Se-

Seminum Plantaginis ,
 Sumach ana drachmas sex ;
 Aluminis rupei unciam semis ,
 Misce omnia in formam Unguenti .

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

R Olei de Mucilaginibus libras tres ;
 Adipis Suilli libras duas ,
 Cerae flavæ libram unam :
 Liquefiant simul omnia ; tum his adde
 Radicis Althææ pulveratæ uncias sex .
 Commisceantur in Unguentum .

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

R Succi Radicum Cyclaminis ,
 Cucumeris agrestis ana libras duas ,
 Butyri Vaccini libram unam ,
 Olei Olivarum libras duas ,
 Colocynthis uncias quinque ,
 Cerae flavæ uncias novem ,
 Fellis Tauri
 Sagapeni ,
 Salis Gemmæ ana unciam unam ,
 Florum Chamæmeli uncias quatuor :
 Colocynthis Pulpam forfice incisam cum integris
 Seminibus per diem , & noctem in Succis macera : tum
 coque ad medias : postea exprime , & ad Extracti for-
 mam exhala Taurino felle adjecto ; atque hæc Cera, &
 Bu-

Butyro in Oleo liquatis, ac repentibus, pistillo ligneo assidue agitando, paulatim immisce: post adde cætera pulverata, & fac Unguentum.

UNGUENTUM DE BOLO.

R Olei Myrtini libras duas,
 Cerae flavæ uncias octo,
 Boli Armeniæ Aceto pluries imbutæ,
 & siccatae uncias sex,
 Sanguinis Draconis veri unciam unam:
 Cera cum Oleo liquetur: quibus tepefactis adde Bolum Armeniam, & Sanguinem Draconis, utraque lævigata: tum omnia accurate, ac tandiu commisce, donec refrigescant.

UNGUENTUM DE LAPIDE CALAMINARI.

R Olei Nucum juglandium libras duas,
 Cerae flavæ uncias quatuor,
 Succı Plantaginis uncias sex,
 Lapidis Calaminaris præparati,
 Boli Armeniæ præparatae,
 Lithargyri præparati,
 Cerussæ,
 Terræ dulcis Vitrioli ana unciam unam, & semis;
 Camphoræ drachmas duas:
 Lapis Calaminaris, Lithargyrus, Cerussa cum Succo Plantaginis, & Oleo, spatha lignea continenter movendo, ad humoris dissipationem, & fere ad Unguenti consi-

consistentiam lente coquantur: tum adjecta Cera liquata inspergantur etiam reliqua in pulverem tenuissimum trita, præter Camphoram, quæ pauculo Oleo soluta repenti Unguento immiscenda est.

UNGUENTUM DE SPERMATE CETI.

R Olei Amygdalarum dulcium uncias tres,
Adipis Cervi unciam unam,
Spermatis Ceti,
Cerae albæ ana semunciam:
Hæc simul omnia liquando, & commiscendo, usus
tempore, Unguentum confice.

UNGUENTUM DE STAPHISAGRIA.

R Axungia Suillæ libram unam, & semis,
Mercurii per corium tra-
jecti unciam unam cum dimidia,
Staphisagriae pulveratæ uncias quatuor:
Mercurius in mortario ligneo cum Axungia diligen-
ter misceatur; adjectaque Staphisagria fiat Unguentum.

UNGUENTUM DE STYRACE.

R Olei Nucum Juglandium libram unam,
Styracis liquidi,
Gummi Elemi pulverati ana uncias octo,
Colophonix uncias quindecim,
Cerae citrinæ uncias octo:
Li-

Liquata igne lenissimo, dein percolata redigantur in Unguentum.

UNGUENTUM DE TUTHIA, SEU DIAPOMPHOLYGOS OFFICINARUM.

R Olei rosati libras duas,
Cerae albæ uncias sex,
Extracti Solani hortensis uncias tres,
Cerussæ,
Plumbi usti,
Tuthiæ,
Olibani ana drachmas decem:

Ceram in Oleo liqua, quibus tepefactis Extractum paucō Vino dilutum immisce: adde his reliqua in pol-
linem lævigata, tum agita, donec frigescent.

UNGUENTUM DE APIO.

R Succi Apii libras duas,
Foliorum recentium Absinthii,
Centaurii minoris,
Solani hortensis,
Verbenæ ana manipulos
duos:

Supra calidos cineres per noctem digestio fiat: postea
levis ebullitio: tum Succus prælo exprimatur, cui adde
Mellis optimi libras duas,
Post unam, vel alteram ebullitionem cola: deinde ad
Mellis crassitiem decoque.

Hisce

Hiscē tepentibus immisce

Terebinthinæ uncias sex :

Demum ea insperge, quæ sequuntur, in pulverem tenuissimum redacta,

Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ,

Radici Aristolochiæ rotundæ,

Iridis Florentinæ,

Cancrorum combustorum . . . ana unciam unam :

Agita, & rite omnia commisce.

UNGUENTUM NUTRITUM, SEU DE LITHARGYRO.

R Lithargyri præparati,
Cerussæ pulveratæ ana uncias tres,
Aceti acerrimi uncias octo,
Olei communis libram unam, & semis :

In mortario plumbeo Lithargyrum, & Cerussam adhibito etiam pistillo plumbeo assidue agita : & modo parum Olei, modo Aceti affunde, & commisce, ut affuso demum toto Oleo, atque Aceto nutritus sit Lithargyrus ad idoneam Unguenti consistentiam.

UNGUENTUM IRINUM.

R Olei Irini,
Amygdalarum dulcium,
Butyri recentis ana uncias sex,
Adipis Gallinæ purgati uncias quatuor,
Gg Cera

Ceræ albæ uncias quinque :
 Hisce una liquatis ; & paullulum refrigeratis insper-
 gantur Pulveres

Radiciſ Iridiſ Florenti-

næ ad unciam unam, & ſemis,

Croci ad ſemunciam :

Accurate miſcendo redigantur in Unguentum.

UNGUENTUM POPULEUM.

R Oculorum ſeu Gemmarum Populi . . . libras duas,
 Pinguediniſ Suillæ purgatae . . . libras quatuor :
 In fictile liqueſiat Pinguedo , in qua deinde Populi
 Gemmæ contuſæ mergantur , & maneat uſque dum
 idoneo tempore cætera adjici poſſint : tum

R Foliorum Papaveriſ erratici ,
 Hyoſcyami albi ,
 Sedi majoriſ ,
 minoriſ . . . ana manipuloſ treſ ;
 Solani hortendiſ manipuloſ ſex :
 Contuſa hæc omnia permiſceantur Pinguedine jam
 liquata una cum Populi Gemmiſ , & per triduum M. B.
 digerantur : poſt lente bulliant ad humoris evaporatio-
 nem , ſpatha lignea aſſidue agitando : mox prælo ex-
 preſſa colentur , & fiat Unguentum.

UNGUENTUM REFRIGERANS.

R Olei roſati libram unam , & ſemiſ ;
 Ceræ

Ceræ albæ uncias sex :
 Ceram in Oleo liqua, spatha lignea agitando, dum
 utraque in Unguentum cogantur: tum Aqua ablue, &
 subige, ut albidum fiat.

UNGUENTUM ROSATUM.

R Axungia Suillæ infusæ, & purgatæ libras sex,
 Rosarum rubrarum } demptis calycibus ana lib.
 Rosarum pallidarum } duas :

Rosis terreæ cucurbitæ inditis liquatam Axungiam
 affunde: operta cucurbita M. B. ad triduum digere: dum
 adhuc calent, prælo exprime, cola, & adjice

Ceræ albæ uncias sex :
 Pone vas supra cineres calidos, & Cera liquata sine
 in Unguentum simul omnia concrefcere: deinde a fæce,
 quæ subsiderit, separa.

UNGUENTUM SANTALINUM.

R Olei Myrtini libras tres,
 Ceræ albæ uncias novem,
 Rosarum rubrarum siccatarum,
 Santali rubri ana uncias quatuor,
 Caphuræ unciam semis :

Ceræ in Oleo liquatæ ac tepesactæ primum Rosarum,
 & Santali Pulvis, postea Camphora pauculo Oleo dis-
 soluta admisceantur.

CAPUT XXI.

DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM AD FRACTURAS.

R Mucilaginis Radicis Althææ,
 Consolidæ majoris,
 Olei myrtini ana libras duas;
 Sebi Hircini,
 Lithargyri præparati ana libram unam,
 Minii uncias sex,
 Terebinthinæ,
 Mastiches pulveratæ,
 Boli Armeniæ præparatæ ana uncias quatuor:
 Cum Mucilagine, Oleo, & Sebo Lithargyrus, &
 Minium assidue subigendo, moderato igne q. s. coquan-
 tur: quibus primum Terebinthina, deinde Bolus, &
 Mastiche perfecte commisceantur.

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINÆ.

R Pellem Arietinam recentem
 Olei Nucum Juglandium libras tres;
 Lithargyri præparati . . libram unam cum dimidia,
 Colophoniæ libram unam,
 Mastiches,
 Benzoini,
 Mumia ana uncias tres;
 Sanguinis Draconis veri,

Alu-

Aluminis puri,
 Hæmatitis præparati.. ana unciam unam, & semis:
 Arietina Pellis frustatim dissecta bulliat in sufficiente
 quantitate Aquæ communis ad liquamen: tum expri-
 matur, & coletur decoctum. Hoc paulatim affunda-
 tur Oleo ferventi una cum Lithargyro, & assidue revol-
 vendo coquantur in Emplastrum, in quo primum Co-
 lophonia, deinde Mastiche liquefiant; atque his vix
 dum repentibus cætera optime pulverata admisceantur.

EMPLASTRUM, SIVE CERATUM DE ALTHÆA.

R Olei Chamæmeli,
 Liliorum alborum,
 Cerae albæ,
 Sebi Hircini ana uncias octo,
 Adipis Gallinæ)
 Medullæ Vituli) utriusq. expurgatæ.. ana unc. tres,
 Radicis Althææ in subtilem pul-
 verem tritæ uncias quatuor;
 Emplastri Diachylonis simpli-
 cis libram unam, & semis:
 Oleum, Cera, Emplastrum, & Adipes simul liquef-
 cant, quibus ab igne remotis addatur Althææ Pulvis:
 tum pistillo ligneo assidue materia agitetur, donec spif-
 fescere incipiat; hinc in tubulos chartaceos effundatur.



EMPLASTRUM, SIVE CERATUM
DE BETONICA.

℞ Succorum Betonicæ,
 Plantaginis,
 Apii vulgaris . . . ana libras duas,
 Foliorum Betonicæ,
 Plantaginis,
 Solani hortensis,
 Millefolii
 Verbenæ . . . ana manipulos duos,
 Terebinthinæ lucidæ . . . libras sex,
 Cerae albæ . . . libras quatuor,
 Resinæ Pini pulveratæ . . . libram unam,
 Gummi Elemi pulverati . . . uncias octo:

Recentium herbarum Folia contusa in Succis, ac Terebinthina diebus octo ad solem macerentur: hæc deinde ad humoris aquosi exhalationem bulliant: tum prælo exprimantur, & colentur; in quibus percolatis liquefiat Cera, deinde Pini Resina, postea Gummi Elemi; atque omnibus perfecte commistis, & refrigeratis fiant Magdaleones.

EMPLASTRUM, SIVE CERATUM
DE CERUSSA.

℞ Cerussæ pulveratæ,
 Olei communis . . . ana libras quatuor,
 Cerae albæ . . . libram unam;
 Coquatur Cerussa in Oleo, Aquam, ut artis est, in-
 sper-

ſpergendo, & ſpatha lignea indefinenter ſubigendo ad conſiſtentiam Emplaſtri: cui tunc adjecta Cera, dum liqueſcit, accurate admiſceatur. Refrigerato Emplaſtro fiant Magdaleones.

EMPLASTRUM DE CICUTA CUM AMMONIACO.

R Succi Cicutæ,
 Olei ejusdem ana libras duas,
 Lithargyri præparati libram unam,
 Terebinthinæ uncias ſex,
 Gummi Ammoniaci pulverati . . . libram unam,
 Camphoræ,
 Salis Ammoniaci ana unciam unam:

In Oleo, & Succo Cicutæ Lithargyrium ad Emplaſtri conſiſtentiam coquatur: tum Terebinthina, & Gummi Ammoniacum addantur. Emplaſtro ab igne remoto, ac reſecto Sal Ammoniacum una cum Camphora ſubtiliſſime pulveratum admiſceatur.

EMPLASTRUM, SIVE CERATUM DE MELILOTO.

R Olei Meliloti libras duas,
 Sebi Hircini libram unam,
 Cera citrinæ uncias octo,
 Terebinthinæ,
 Florum Meliloti ana uncias ſex,
 Gummi Ammoniaci,
 Sagapeni . . . ana unciam unam, & ſemis:
 Oleo,

Oleo, Sebo, Terebinthinæ, & Cera simul liquatis, ac tepefactis adde cætera in pulverem optime trita, & fac Emplastrum.

EMPLASTRUM DE SAPONE.

R Cerussæ pulveratæ
 Minii ana libram unam,
 Olei Olivarum libras tres,
 Saponis uncias octo:

Omnia simul coquantur in Emplastrum spatha assidue versando, & Aquam sensim inspergendo.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA.

R Gummi Tacamahacæ uncias tres,
 Carannæ drachmas sex,
 Balsami Peruviani sicci,
 Terebinthinæ Cypriæ ana unciam unam, & semis:

Igne lenissimo cuncta simul liquecant, & commisceantur.

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

R Radicum, & Foliorum recentium
 Bardanæ,
 Chamæpitrys,
 Valerianæ,
 Angelicæ,
 Helenii,
 Aristolochiæ rotundæ,

Ra-

Raphani rusticani,
 Cucumeris agrestis,
 Scrophulariæ,
 Cyclaminis,
 Chelidonii minoris ana uncias tres,
 Succorum Cicutæ,
 Hormini,
 Chelidonii majoris.. ana libras quatuor,
 Lithargyri præparati . . . libras duas, & semis,
 Olei Olivarum libras quatuor,
 Cerae Citrinæ,
 Terebinthinæ,
 Colophonix,
 Gummi Tacamahacæ,
 Sulphuris vivi ana libram unam,
 Bituminis Judaici,
 Olibani,
 Mastiches,
 Myrrhæ ana uncias sex,
 Euphorbii,
 Caphuræ ana unciam unam, & semis,
 Olei essentialis Caryophyllorum . . semunciam:

Herbas una cum Radicibus mundatas, & in pila mar-
 morea contusas pone in fictile idoneo, quibus Succos
 affunde: biduum macerari finito: deinde ad medias de-
 coque: tum prælo expressum Liquorem cum Lithar-
 gyro, & Oleo continenter agitando ad idoneam consi-
 stentiam redige: adde Ceram, Colophoniam, & Tere-
 binthinam: postea Tacamahacam, Masticem, Euphor-
 bium pulverata. Vas ab igne remove, & cum tepuerit

Emplastrum, reliqua in subtilem pulverem trita, cui Oleū Caryophyllorum instillaveris, accurate permisce.

N. Diabotanium cum Mercurio paratum habebis, si unciam unam Hydrargyri ad singulas Emplastri libras adjeceris. Prius autem Mercurius purificatus pulvere vivi Sulphuris, & adipe viperino extinguendus.

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

R Mucilaginū Radicis Althææ,
Seminum Fœnugræci,
Lini . . . ana libras duas,
Olei Olivarum . . . libras sex,
Lithargyri præparati . . . libras quatuor:
Lithargyrus cum Oleo, assidue agitando, & sensim
Mucilaginem adjiciendo, coquatur ad justam Emplastri
consistentiam.

EMPLASTRUM DIACHYLUM MAGNUM CUM GUMMI.

R Emplastri Diachyli sim-
plicis . . . libras quatuor, & semis,
Terebinthinæ . . . uncias quatuor,
Ceræ,
Œsypi,
Resinæ Pini . . . ana uncias tres,
Ichthyocollæ,
Succi Scillæ . . . ana uncias duas, & semis,
Radicis Iridis . . . uncias sex,
Gummi

Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Bdellii,

Sagapeni ana unciam unam cum dimidia :

Diachylum, Terebinthina, Cera, & Oesypus simul liquefiant : hisce liquatis Ichthyocola in Succis dissoluta, percolata, & humore ejus, quantum satis, vaporatione absumpto addatur : tum Pini Resina, & Gummi pulverata, & cribro serico trajecta commisceantur.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

R Resinae Pini libram unam,
Terebinthinæ uncias sex,
Sandaracæ uncias quatuor,
Gummi Ammoniaci,

Galbani ana uncias tres,

Sulphuris vivi uncias duas:

Pini Resina, & Gummi pulverata cum Terebinthina igne leni liquentur. His paullulum refrigeratis Sulphur in pollinem lævigatum permisceatur.

EMPLASTRUM, SIVE CERATUM EPISPASTICUM.

R Cantharidum uncias duas,
Cerae flavæ,
Colophonix,
Terebinthinæ ana unciam unam, & semis :

Cantharides tritæ cæteris simul liquefactis, percolatis, & ad teporem redactis commisceantur.

EMPLASTRUM, SIVE CERATUM MERCURIALE.

R Lithargyri præparati,
Axungia Suillæ,
Olei Olivarum ana libras duas,
Gummi Ammoniacy,
Ceræ flavæ,
Mercurii per Corium trajecti ana uncias sex,
Adipis Viperini,
Terebinthinæ,
Sulphuris vivi lævigati ana unciam unam, &
semis :

Lithargyrium cum Axungia Suilla, & Oleo, addita identidem Aqua, ad justam Emplastri consistentiam, spatula lignea assidue agitando, coquatur : adde Ceram, & Ammoniacum pulveratum : His liquatis, ac teperefactis Mercurium, qui Adipe Viperino, Terebinthina, & Sulphure extinctus sit, accurate commisce.

N. Emplastrum duplicato, vel triplicato Mercurio conficiatur, addendo singulis Emplastri libris drachmas sex, vel unciam unam, & semis Mercurii.

EMPLASTRUM NIGRUM.

R Cerussæ pulveratæ libram unam,
Lithargyri præparati uncias sex,
Olei Seminum Lini libras duas,
Olei,

Olei e Vitellis Ovorum uncias duas,
 Aceti acerrimi libram unam:
 Igne leni, & semper agitando percoque in Empla-
 strum justæ consistentiæ, & fusci coloris.

EMPLASTRUM, SIVE CERATUM NORIMBERGENSE.

R Olei rosati,
 Aquæ communis ana libras duas,
 Minii,
 Ceræ Citrinæ ana libram unam, & semis,
 Sebi Cervini,
 Camphoræ ana drachmas novem:
 Oleum cum Minio, adjecta sensim Aqua, coque ad
 idoneam crassitudinem: tum adde Ceram, qua liquata,
 cum tepuerit Emplastrum, accurate commisce Cam-
 phoram aliquantulo Olei dissolutam.

EMPLASTRUM, SIVE CERATUM OXYCROCEUM.

R Ceræ flavæ,
 Picis navalis,
 Colophonix ana libram unam,
 Terebinthinæ,
 Galbani in Aceto soluti, & ad ignem lenem spissati,
 Mastiches ana uncias quatuor,
 Croci,
 Myrrhæ,
 Olibani ana uncias duas:
 Cera,

Cera, Colophonia, Pix, Terebinthina, & Galbanum simul liquefiant. His percolatis addantur Mastice, tum Myrrha, & Olibanum pulverata, quæ scilicet ad extremum una cum pulverato Croco tepenti Emplastro admiscenda sunt.


EMPLASTRUM DE LITHARGYRO, VULGO PALMEUM.

R Lithargyri præparati,
 Olei Olivarum ana libras quatuor,
 Adipis Suilli libras duas :
 Adjecta paulatim Aqua communi, ut artis est, percoquantur in Emplastrum.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

R Mucilaginis Radicis Consolidæ majoris...libras sex,
 Olei Nucum Juglandium . . . libras quatuor,
 Minii,
 Lithargyri præparati . . . ana libram unam,
 Lapidis Calaminaris lævigati . . uncias quatuor,
 Sanguinis Draconis veri,
 Terræ dulcis Vitrioli,
 Aluminis rupei . . . ana unciam unam,
 Radicis Aristolochiæ rotundæ unciam unam, & semis :
 Minium, Lithargyrum, & Lapidem Calaminarem cum Oleo, addendo sensim Mucilaginem, coque s. a. in Emplastrum; quo paulum refrigerato cætera in pulverem tenuissimum trita diligenter commisce.

FINIS.



INDEX CAPITUM
SECUNDÆ PARTIS
PHARMACOPŒÆ
TAURINENSIS.

CAPUT I. *De Simplicium quo-*
rundam Medicamentorum Præ-
paratione .. Pag. 63

II. *De Succis . . . 74*

III. *De Infusis . . . 81*

IV. *De Decoctis . . . 85*


V. *De Conservis .. 89*

VI. *De Syrupis 96*

VII.

VII.	<i>De Pulveribus.</i>	Pag. III
VIII.	<i>De Confectionibus.</i>	116
IX.	<i>De Trochiscis</i>	133
X.	<i>De Pilulis</i>	137
XI.	<i>De Aquis</i>	142
XII.	<i>De Spiritibus</i>	155
XIII.	<i>De Salibus</i>	168
XIV.	<i>De Extractis</i>	178
XV.	<i>De Tincturis</i>	185
XVI.	<i>De Calcinatis</i>	195
XVII.	<i>De Præcipitatis</i>	202
XVIII.	<i>De Sublimatis</i>	204
XIX.	<i>De Oleis</i>	209
XX.	<i>De Unguentis</i>	224
XXI.	<i>De Emplastris</i>	236





INDEX RERUM.

A

A Cacia Nostras, v. Rob Prunorum silvestrium	Pag. 182
Acetum distillatum, v. Spiritus Aceti	155
Rosaceum	84
Rutaceum	85
Sambucinum	ibidem.
Saturni	84
Scilliticum	85
Adipum Purgatio, v. Pinguedinum Purgatio	63
Ærugo, five Æs viride	195
Æs Ustum	196
Æthiops Mineralis	112
Agaricus Trochiscatus, v. Trochisci de Agarico	134
Alcohol Vini, v. Spiritus Vini alcoholisatus	162
Aloe Rosata	73
Violata	ibid.
Althææ Radicis Pulveratio.	70
Alumen Purificatum	64
Ustum	196
Antihecticum Poterii, v. Cerussa Antimonii Jovialis	199
Antimonium Diaphoreticum	196
Apum Præparatio	67
Aqua Absinthii	144
Acetosæ	ibid.

Aqua Acetofellæ	Pag. 145
Ad Botium	142
Agrimoniæ	145
Artemisiæ	ibid.
Balsamica	150
Beccabungæ	145
Betonicæ	ibid.
Borraginis	146
Buglossi	ibid.
Calcis	142. 143
Capilli Veneris	145
Cardui Benedicti	ibid.
Carlinæ	146
Centaurii minoris.	145
Cerasorum Nigrorum....	146
Cerefolii	147
Chelidonii majoris, & minoris	145
Cichorii	146
Cinnamomi Albida	ibid.
Spirituosa	150
Citri	147
Cochleariæ	ibid.
Diuretica	150
E Corde Cervi	151
E Typhis Cervi Simplex.	148
Composita	152
Endiviæ	146
Epileptica	151
Erucae	147
Euphrasiæ	145
† Aqua	

I N D E X

Aqua Farfaræ	Pag. 145
Florum Aurantiorum	148
Chamæmeli	ibid.
Lavandulæ	ibid.
Lilii convallium	ibid.
Liliorum Alborū	ibid.
Nymphææ	ibid.
Papaveris erratici	ib.
Pæoniæ	ibid.
Rosarum Albarum	ib.
Pallidar	ibid.
Rubr.	ibid.
Sambuci	ibid.
Tiliæ	ibid.
Violarum	ibid.
Fœniculi	145
Foliorum Aurantiorum	ibid.
Fortis	158
Fumariæ	145
Galegæ	ibid.
Hyssopi	149
Hysterica	152
Imperialis	153
Lactucæ	146
Majoranæ	149
Malvæ	146
Marrubii	149
Melissæ Simplex	ibid.
Composita	153
Mellis, seu Phlegma	156
Melonum	149
Menthæ	ibid.
Nasturtii	147
Ononidis	146
Perficariæ	145
Phagedænica	143
Plantaginis	146
Portulacæ	145
Pulegii	149
Raphani Rusticani	147
Regia	159

Aqua Regina Hungariæ, v. Spiritus	
Vini Anthosatus	Pag. 163
Rutæ	149
Salicis	145
Salviæ	149
Saphyrina	143
Saxifragiæ	146
Scabiosæ	ibid.
Scordii Simplex	149
Composita	154
Scorfoneræ	156
Sempervivi	145
Serpylli	154
Spermatis Ranarum, seu Sper-	
niolæ	149
Styptica	143
Tanaceti	145
Theriacalis	155
Theriacalis Frigida, v. Aqua	
Scordii composita	154
Trifolii Fibrini	145
Arcanum Duplicatum	172
Aurum Fulminans	202

B

B Balsamum Arcæi, v. Unguentum	
Elemi	227
Catholicum cum Vino	192
Cum Vini Spiritu	193
Echini, v. Oleum Distilla-	
tum	222
Innocentianum, v. Catho-	
licum	192. 193
Sulphuris cum Vini Spiri-	
tu	191
Anisatum	192
Fœniculatum	ibid.
Succinatum	ibid.
Terebinthinatum	ib.
Balsa-	

R E R U M.

Balsamum Sulphuris cum Oleo ex-
 pressio Nucum.. Pag. 191
 Anisforum . . . ibid.
 Olivarum . . . ibid.
 Cum Balsamo Copaiba. ibid.
 Cum Oleo crasso Succini. ib.
 Terebinthinæ. ibid.
 Tranquillans, v. Oleum Bufo-
 num 217
Boli Armeniae Præparatio . . . 65
Butyrum Antimonii, v. Cinnabaris
 Antimonii 207
 Cacao, v. Oleum . . 210
 Saturni, v. Unguentum
 nutritum. . . . 233

C

Cancrorū Fluviatilium Ustio. 73
Cantharidum Præparatio . . . 67
Cathecu Purificatio . . . 65
Catharticum Passulatum, v. Con-
 fectio Passulata 118
Ceratum, v. Emplastrum . . .
Cerussa Antimonii 198
 Jovialis 199
 Martialis ibid.
Cinnabaris Antimonii . . . 207
 Artificialis 206
 Nativæ Purgatio . . 65
Colcothar Vitrioli, v. Vitriolum
 calcinatum 201
Colocynthis Pulveratio . . . 69
Condita, v. Conservæ . . . 94
Confectio Alchermes . . . 116
 Anacardina ! ibid
 Cassia 118
 Hyacinthina . . . 117
 Passulata 118
Conserva Cassia, v. Confectio. ibid.

Conserva Florum

Aurantiorum. Pag. 89
 Betonica 90
 Borraginis ibid.
 Buglotii ibid.
 Calendulæ 89
 Chamæmeli. . . . ibid.
 Cichorii 90
 Lili Convallium . . 89
 Malvæ 90
 Nymphææ ibid.
 Pæoniæ ibid.
 Persicorum ibid.
 Rosmarini 89
 Rosarum Damascen. 90
 Pallidarum. ib.
 Rubrarum. 91
 Rubrarum dupli-
 catis Floribus. ib.
 Salviæ 89
 Tiliæ ibid.
 Tunicæ ibid.
 Violarum. ibid.

Conserva Fructuum

Aurantiorum . . . 93
 Ceraforum acidorū. 94
 Citri 93
 Cornorum 94
 Cydoniorum . . . 93
 Cynorrhodon . . . 94
 Limonum. 93

Conserva Herbarum

Absinthii 92
 Acetofellæ. . . . ibid.
 Artemisiæ ibid.
 Cerefolii. ibid.
 Cochleariæ ibid.
 Erucæ ibid.
 Nasturtii. ibid.
 Tanaceti. ibid.

Conserva Radicum

I N D E X

Angelica odorata. Pag. 95	Dentium Apri Pulveratio. Pag. 69
Consolida majoris. 94	Diacrydium, v. Scammonium. 74
Eryngii 95	
Helenii 94	
Satyrii 95	
Coralliorum Præparatio . . . 71	
Cornu Cervi Præparatio Philo- phica 69	
Præparatio simplex. ibid.	
Cornu Cervi Ustio 72	
Cranii Humani Pulveratio . . 69	
Cremor Tartari, v. Tartarum Puri- ficatum 66	
Crætæ Purificatio 65	
Croci Martis Lævigatio . . . 71	
Crocus Martis Astringens . . 200	
Rore Majali præpa- ratus 70	
Sulphure præpara- tus 200	
Crocus Metallorum, v. Antimonii Hepar 197	
Crytalli Tartari, v. Tartarum Pu- rificatum 66	
Crytallus Mineralis, v. Sal Pru- nellæ 173	
D	
D ecoctum Carminans, v. In- fusum 81	
Catholicum 87	
Cornu Cervi 85	
Eboris ibid.	
Emolliens, & Car- minans 88	
Glycyrrhizæ, v. In- fusum 82	
Hordei 86	
Lignorum Stibiati. ibid.	
Pectorale 88	
	E
	E boris Pulveratio Pag. 69
	Echini Ustio 73
	Elæosacchara 221
	Flaterium 183
	Electuarium De Baccis Lauri. . 119
	De Junipero 120
	Diaphœnicum ibid.
	Diascordii ibid.
	Hieræ 121
	Lenitivum ibid.
	Triphæræ Persicæ. 122
	Elixir Bezoardicum 193
	Proprietatis cum Acido. . 194
	Sine Acido. ibid.
	Vitæ 195
	Emplastrum Ad Fracturas . . . 236
	De Ammoniaco, v. de Cicuta 239
	De Althæa 237
	De Baccis Lauri, v. Ele- ctuarium 119
	De Betonica 238
	De Cerussa ibid.
	De Cicuta 239
	De Lithargyro 246
	De Meliloto 239
	De Pelle Arietina. 236
	De Sapone 240
	De Tacamahaca. ibid.
	Diabotanium ibid.
	Diachylum Magnum cum Gummi. 242
	Simplex. ibid.
	Diaphoreticum 243
	Epispasticum ibid.
	Mercuriale 244
	Pal-

R E R U M.

Emplastrum Nigrum . . . Pag. 244.	Extractum Chinachinae . . . Pag. 181
Norimbergense . . . 245	Martis , v. Tinctura
Oxicroceum . . . ibid.	Martis 188
Palmeum, v. de Lithar-	Opii 182
gyro 246	
Stypticum . . . ibid.	F
Extracta ex Floribus	
Chamaemeli . . . 179	F æcula Radicis Ari 81
Croci ibid.	Bryoniae . . . ibid.
Papaveris Erratici ib.	Iridis . . . ibid.
Sambuci . . . ibid.	
Extracta ex Herbis	Ferri Scobis Præparatio 71
Absinthii . . . 178	Flores Antimonii Martiales . . . 204
Centaurii mi-	Benzoini 205
noris 179	Salis Ammoniaci 205
Cerefolii . . . 178	Cum Hamatite . . . 206
Chamædrys . . . 179	Martiales . . . ibid.
Chamæpitys . . . 178	Sulphuris 205
Cochleariæ . . . ibid.	Florum Exsiccatio 68
Melissæ . . . ibid.	
Nasturtii Aq. . . 179	G
Scordii . . . ibid.	
Sennæ 180	G elatina ex Oleo Amygdalarum
Tanacetii . . . 179	dulcium 209
Trifolii Fibrini ibid.	Gelatina Cornu Cervi, v. Deco-
Ex Herbis siccis inodor. 180	ctum 85
Extracta ex Lignis	Cydoniorum, v. Syru-
Guajaci 181	pus 104
Visci Quercini ibid.	Eboris, v. Decoctum 86
Extracta ex Radicibus	Ribium, v. Syrupus 104
Gentianæ 180	Rubi Idæi, v. Syrupus ib.
Helenii 179	Gilla Vitrioli, v. Vitrioli albi puri-
Liquiritiæ . . . 180	ficatio 64
Mechoacannæ . . . ib.	Guttæ Anglicæ 167
Pæoniæ . . . ibid.	
Peucedani . . . 182	H
Rhabarbari . . . 181	
Salsæ Parillæ . . . 180	H æmatitis Præparatio 71
Tormentillæ . . . ibid.	Hepar Antimonii 197
Valerianæ . . . 179	† 3
Extractum Agarici 181	Her-

I N D E X

Herbarum Exsiccatio . . . Pag. 67
 Hyacinthi Lapidis Præparatio . 71
 Hydrargyri Purificatio . . . 66

I

Infusum Carminans . . . 81
 Glycyrrhizæ . . . 82
 Sennæ ibid.

K

Kermes Minerale 202

L

Lac Sulphuris, v. Magisteriū 203
 Lapidis Calaminaris Præparatio 71
 Lapis Causticus 171
 Contrayervæ 135
 Infernalis 177
 Medicamentosus ibid.
 Laudanum liquidum, v. Tinctura
 Anodyna 190
 Laudanum Opiatum 141
 Liquor Camphoræ, v. Sp. Nitri. 157
 Cornu Cervi succina-
 tus 166
 Nitri, v. Nitrū Fixum. 171
 Tartari, v. Sal Tartari 170
 Terræ Foliatæ, v. Terra
 Foliata 175
 Lithargyrii Purgatio 65
 Lixivium e Cineribus
 Absinthii 144
 Genistæ ibid.
 Juniperi ibid.
 Tamarisci ibid.

Lumbricorum Terreſtrium Præpa-
 ratio Pag. 67

M

Magisterium Chinachinæ, v.
 Extractum. 181
 Magisterium Sulphuris 203
 Magnesia Alba 200
 Magnetis Præparatio 71
 Margaritarum Præparatio ibid.
 Matris Perlarum Præparatio . . . 69
 Mel Anthosatum 96
 Mercuriale ibid.
 Rosaceum ibid.
 Rosatum Solutivum ibid.
 Rosatum Solutivum cum Aga-
 rico 105
 Violatum Solutivum 97
 Mercurius Purificatus, v. Hydrar-
 gyri Purificatio 66
 Præcipitatus Albus 204
 Præcipitatus Ruber 200
 Redivivus e Cinna-
 bari 207
 Sublimatus Corroſi-
 vus ibid.
 Sublimatus Dulcis . 208
 Millepedarum Præparatio 67
 Mithridatium 122
 Mivæ, v. Syrupi 104
 Mucilago ex Radicibus
 Althææ 82
 Symphyti Maj. ib.
 Ex Seminib. Cydoniorum . . . 83
 Fœni Græci ibid.
 Lini ibid.
 Psyllii ibid.
 Sumach ibid.
 Myrobalanorum Torrefactio . . . 72
 Nardī

R E R U M.

N

N ardi Indicae Pulveratio. Pag. 70	
Nitrum Fixum	171
Purificatum	64
Stibiatum	173
Nix Martis, v. Flores Antimonii Martiales	204

O

O culorum Cancrorum Præparatio	71
OEsyphi Purgatio	64
Olea per Distillationem	
Absinthii	219
Baccarum Lauri	221
Caryophyllorum	220
Cerae	221
Chamæmeli	219
Ceruleum compositū.	224
Cinnamomi	220
Citri	ibid.
Cornu Cervi, v. Spiritus	164
De Lateribus	222
Echini	ibid.
Florem Aurantiorum	219
Lavandulae	ibid.
Ligni Buxi	223
Guajaci	ibid.
Juniperi	ibid.
Limonum	220
Macis	221
Majoranae	219
Menthæ	ibid.
Nucistæ	221
Origani	219
Philosophorum, v. De Lateribus.	222

Olea per Distillationem

Pulegii	Pag. 219
Radicum Angelicae odor.	220
Peucedani	ibid.
Valerianæ	ibid.
Rosmarini	219
Rutæ	ibid.
Salviæ	ibid.
Saponis	223
Sassafras	220
Seminum Anisi	221
Carvi	ibid.
Fœniculi	ibid.
Succini clarum, v. Spiritus.	165
Succini Empyreumaticum	223
Terebinthinæ	ibid.
Thymi	219
Viperarum, v. Spiritus	165
Olea per Expressionem	
Amygdalarum Amarar.	209
Dulcium	ibid.
Avellanarum	ibid.
Baccarum Lauri	211
Cacao	210
E Vitellis Ovorum	ibid.
Macis	211
Nucis Moschatae	ibid.
Nucleorum Persicorum.	209
Pini	ibid.
Pistaciorum.	ibid.
Nucum Juglandium	ibid.
Seminum Anisi	211
Cannabis	210
Carvi	211
Cucumeris	209
Fœniculi	211
Hyperici	209
Lini	ibid.
Papaveris Albi	ibid.
Olea per Infusionem	
Absinthii	221
† 4	Ane-

I N D E X

Olea per Infusionem

Anethi . . .	Pag. 213
Buſonum . . .	217
Caſtorei . . .	211
Chamæmeli . . .	213
Cheirinum . . .	ibid.
Cicutæ . . .	ibid.
De Capparibus . . .	216
De Catellis . . .	215
De Cucurbita . . .	216
De Mucilaginibus . . .	218
Formicarum . . .	212
Hyrundinum . . .	215
Hyperici . . .	216
Irinum . . .	213
Lacertarum virid. . .	212
Laurinum . . .	213
Liliorum albor. . .	ibid.
Lumbricorum Terre-	
ſtrium . . .	212
Maſtiches . . .	213
Meliloti . . .	ibid.
Menthæ . . .	ibid.
Momordicæ . . .	ibid.
Myrtinum . . .	217
Rofaceum . . .	213
Rutæ . . .	ibid.
Sambucinum . . .	ibid.
Scorpionum compo-	
ſitum . . .	214
Simplex . . .	212
Violaceum . . .	213
Vulpinum . . .	215
Oleum Camphoræ, v. Spiritus	
Nitri . . .	157
Oleum Nitri Fixi, v. Nitrum	
Fixum . . .	171
Oleum Tartari, v. Sal Tartari . . .	170
Oleum Vitrioli, v. Spiritus . . .	158
Opii Torrefactio . . .	72
Oſſis Sepiæ Uſtio . . .	73

Oxymel Scilliticum . . .	Pag. 97
Simplex . . .	ibid.

P

P Anacea Mercurialis . . .	208
Pastilli Contrayervæ, v. Lapis Con-	
trayervæ . . .	135
Phlegma Vitrioli, v. Spiritus . . .	158
Pilulæ Antifcorbuticæ . . .	137
Balsamicæ . . .	138
Catholicæ, ſeu Imper. . .	ibid.
Coccia . . .	ibid.
De Alumine . . .	139
De Ammoniaco . . .	141
De Chinachina . . .	139
De Cynogloſſo . . .	ibid.
De Hiera cum Agarico . . .	140
De Succino . . .	ibid.
De Tribus . . .	ibid.
Martiales . . .	141
Mercuriales . . .	ibid.
Tartareæ, v. de Ammon. . .	ibid.
Pinguedinum Purgatio . . .	63
Plumbi Pulveratio . . .	70
Uſtio . . .	201
Polii Montani Pulveratio . . .	70
Pulvis Ad Botium . . .	111
Ad Guttetam . . .	ibid.
Ari . . .	112
Aſtringens . . .	ibid.
Cornachini . . .	113
Diacarthami . . .	114
Diarrhodon . . .	ibid.
Diaſcordii . . .	115
Diaſennæ . . .	113
Diatragacanthi . . .	ibid.
E Chelis Cancrorum . . .	ibid.
Hieræ . . .	115
Pumicis Præparatio . . .	71

Ra-

R E R U M.

R

R adicum Exsiccatio . . .	Pag. 68
Regulus Antimonii . . .	197
Regulus Antimonii Martialis .	198
Resina Jalappæ . . .	184
Mechoacannæ . . .	ibid.
Scammonii . . .	ibid.
Turpethi . . .	ibid.
Rhabbari Torrefactio . . .	72
Rhodomel, v. Mel Rosaceum .	96
Rob Baccarum Ebuli . . .	183
Juniperi . . .	ibid.
Sambuci . . .	ibid.
Prunorum silvestrium . . .	182

S

S accharum Saturni, v. Sal Satur- ni	176
Sal Absinthii	169
Artemisiæ	170
Cardui Benedicti	ibid.
Centaurii Minoris . . .	ibid.
De Duobus, v. Arcanum Dupli- plicatum	172
Febrifugum Sylvii, v. Sal volat. Ammoniacum	167
Ligni Juniperi	170
Martis	175
Mirabile	172
Ononidis	170
Polychrestum	173
Prunellæ	ibid.
Saturni	176
Tamarisci	170
Tartari	ibid.
Thecæ, & Stipitum Fabar. ib.	
Vegetabile	174

Sal Essentiale

Absinthii	Pag. 168
Acetosæ	169
Acetosellæ	ibid.
Agrestæ	ibid.
Cardui Benedicti	ibid.
Centaurii Minoris	ibid.
Scordii	ibid.

Sal Volatile

Ammoniacum	166
Cornu Cervi	164
Cranii Humani	165
Fuliginis	ibid.
Oleosum	167
Succini	165
Viperarum	ibid.

Salis Ammoniaci Purificatio . . . 64

Salis Marini Decrepitatio . . . 72

 Purificatio 64

Sapa Vini 183

Scammonium Cydoniatum . . . 74

 Glycyrrhizatum. ibid.

Schoenanthi Pulveratio . . . 70

Scillæ Exsiccatio 68

Scillæ Coctio, v. Succus Scillæ. 81

Scobis Ferri Præparatio . . . 71

Seri Lactis Purificatio 64

Sief Album, v. Trochisci Albi. 133

Species, v. Pulvis.

Specificum Stomachicum, v. Cerus-

 fa Antimonii Martia-

 lis 199

Spiritus Absinthii 160

 Aceti 155

 Aluminis 156

 Aluminis Dulcis. 159

 Baccarum Ebuli. . 161

 Juniperi. ib.

 Sambuci. ib.

 Ceraforum nigror. 164

 Spiri-

I N D E X

Spiritus Cerefolii . . . Pag. 164	Iycibus. Pag. 77.
Cochleariæ . . . 163	Succi ex Fructibus
Cornu Cervi. . . 164	Aurantiorum. 79
Cranii Humani . . 165	Berberum. . . ibid.
Fuliginis ibid.	Citrei ibid.
Melissæ. 161	Cucumeris Agre-
Mellis 156	ftis. 80
Nasturtii 164	Cydoniorum . 79
Nitri 156	Ebuli 78
Nitri Dulcis . . . 159	Granatorum . 79
Raphani Rusticani. 164	Limonum. . . . ibid.
Rolarum 161	Mororum. . . . ibid.
Salis 157	Pomorum 80
Salis Dulcis . . . 159	Prunorum silves-
Salis Ammoniaci. . 166	trium 79
Saponis 164	Rhamni Cathar-
Serpylli 161	tici 78
Succini 165	Ribis 79
Spiritus Sulphuris 157	Rubi Idæi ibid.
Tartari dulcis . . . 159	Sambuci 78
Terebinthinæ, v. Oleū. 223	Succi ex Herbis
Vini 162	Absinthii 74
Vini Alcoholisatus. ibid.	Acetosæ 75
Anthosatus 163	Acetofellæ. . . . ibid.
Camphoratus . . . 162	Agrimoniæ. . . . 76
Rectificatus ibid.	Artemisiæ. . . . 75
Tartarisatus. . . . 13	Beccabungæ. . . . ibid.
Viperarum 165	Borraginis ibid.
Vitrioli 158	Buglossi 76
Vitrioli dulcis. . . . 159	Ceretolii. ibid.
Volatilis Oleosus. . . 167	Cichorii. ibid.
Spodium 73	Cochleariæ ibid.
Spongiæ Præparatio 68	Consolidæ Majo. ib.
Ustio 73	Minoris. ib.
Suberis Ustio 73	Endiviæ. ibid.
Succi ex Floribus Persicorum . . 77	Erucae ibid.
Rosarū Pallid. . . . ib.	Erysimi 75
Rubr. ibid.	Galegæ ibid.
Tunicæ. 78	Hederæ terrestr. ib.
Violarum ibid.	Malvæ. 76
Violarum cum ca-	Melissæ 75
	Men-

R E R U M.

Menthæ	Pag. 75	Syrupus De Eryfimo	Pag. 109
Nasturtii	76	De Hedera terrestri	98
Rutæ	ibid.	De Hyssopo	ibid.
Scordii	75	De Mentha	ibid.
Solani	ibid.	De Nymphæa	102
Taraxaci	76	De Papavere Albo	102
Succi ex Radicibus		Erratico. ibid.	
Ari	81	De Peucedano	106
Brionæ	ibid.	De Pomis Solutivus	110
Cichorii	80	De Rosis Siccis	103
Ebuli	ibid.	De Succo Acetosæ	104
Fœniculi	ibid.	Acetofellæ	ibid.
Graminis	ibid.	Agrestæ	ibid.
Helenii	ibid.	Aurantiorum	101
Iridis	81	Berberum	104
Petroselinii	80	Citri	100
Peucedani	ibid.	Citri cum Corti-	
Raphani	ibid.	cibus	ibid.
Scillæ	81	Cydoniorum	104
Succini Præparatio	71	Florum Persic.	101
Succus Concretus Acetofellæ	182	Granatorum	103
Beccabungæ	ib.	Limonum	101
Cardui Bened.	ib.	Mororum	104
Chelidonii Mino-		Rhamni Cathar-	
ris	ibid.	tici	101
Cichorii	ibid.	Ribium	104
Fumariæ	ibid.	Rosarum Pallida-	
Sulphur Auratum Antimonii	202	rum	101
Syrupus Aperiens	107	Rubi Idæi	104
Capilli Veneris	98	De Symphyto	110
De Absinthio	97	De Terebinthina	103
De Althæa Compositus	108	Florum Borriginis	104
Simplex	97	Persicorum	101
De Artemisia	98	Rosarum Pallid.	ib.
De Arundine	106	Damasc.	ib.
De China	99	Tunicæ	104
De Chinachina	ibid.	Violaceus	ibid.
De Cichorio cum Rhabar-		Viperinus	ibid.
baro	108		
De Cochlearia	109		
De Corticibus Citri	99		

Tabellæ

I N D E X

T

T Abellæ Ad Botium . . .	129
De Althæa . . .	ibid.
De Glycyrrhiza . . .	ibid.
De Semine Santon. . .	130
De Tribus . . .	ibid.
Diacarthami . . .	ibid.
Diarrhodon . . .	ibid.
Diarrhodon cum Rha- barbaro . . .	131
Diatragacanthi . . .	ibid.
Perlata . . .	ibid.
Rosata . . .	ibid.
Violaceæ . . .	132
Tartarum Calcinatum . . .	73
Emeticum . . .	177
Tartarum Purificatum . . .	66
Regeneratum, v. Terra Foliata . . .	174
Solubile, v. Sal Veg. . .	ib.
Solubile Martiale . . .	175
Vitriolatum . . .	174
Terra Dulcis Vitrioli, v. Vitriolum Calcinatum . . .	201
Terra Foliata Tartari . . .	174
Terræ Lemniæ Purgatio . . .	65
Theriaca Andromachi . . .	124
Diateffaron . . .	127
Taurinensis . . .	ibid.
Tinctura Absinthii . . .	189
Aloes . . .	185
Anodyna . . .	190
Antimonii . . .	185
Benzoini . . .	ibid.
Cephalica . . .	190
Castorei . . .	186
Croci . . .	ibid.
Hæmatitis . . .	187
Hieræ . . .	185

Tinctura Lacæ . . .	Pag. 187
Ligni, & Gummi Guaj. . .	185
Martis cū Succo Absin. . .	188
Acetosellæ. . .	ib.
Cochlear. . .	187
Fumariæ . . .	188
Nasturtii . . .	ib.
Pomorum . . .	ib.
Cum Tartaro . . .	189
Cum Vino . . .	188
Myrrhæ . . .	186
Salis Tartari . . .	189
Sanguinis Draconis . . .	185
Sarcocollæ . . .	ibid.
Succini . . .	186
Sulphuris, v. Balsamum Sulphuris cum Vini Spi- ritu . . .	191
Terræ Foliatæ Tartari, v. Terra Foliata . . .	175
Tragemata De Chinachina . . .	132
De Sem. Santonic. . .	133
Triphera Persica, v. Electuarium. . .	122
Trochisci Albi . . .	133
Alhandal . . .	134
Alkekengi . . .	ibid.
De Agarico . . .	ibid.
De Capparibus . . .	135
De Minio . . .	ibid.
De Myrrha . . .	136
Hedycroi . . .	ibid.
Scillitici . . .	137
Tuthiæ Præparatio . . .	71

V

V inum Absinthites . . .	83
Emeticum . . .	ibid.
Enulatum . . .	84
Viperarum Exsiccatio . . .	67
Vipe-	

R E R U M:

Viperarum Pulveratio . . .	Pag. 70	Unguentum De Lap. Calam. Pag. 230	
Vitrioli albi Purificatio	64	De Lithargyro . . .	233
Vitrioli Calcinatio	201	De Minio . . .	227
Exsiccatio	69	Desiccativũ, v. De Lapi-	
Vitriolum Martis, v. Sal Martis. 175		de Calaminari. 230	
Unguentum Ad Ambusta	224	De Spermate Ceti. 231	
Ad Hæmorrhoides 225		De Staphisagria . ibid.	
Ad Rachitidem . ibid.		De Styrace . . . ibid.	
Ad Scabiem . . . 226		De Tuthia, seu Dia-	
Ægyptiacum . . . ibid.		pompholigos . 232	
Agrippæ . . . ibid.		Elemi 227	
Albũ, seu de Cerus. 227		Irinum 233	
Arcaei ibid.		Mundificativum. v. De	
Basilicum 228		Apio 232	
Citrinum ibid.		Nutritum, v. De Li-	
Comitissæ ibid.		thargyro 233	
De Althæa 229		Pectorale, v. Irinum. ib.	
De Apio 232		Populeum 233	
De Arthanita . . . 229		Refrigerans . . . ibid.	
De Bolo 230		Rosatum 235	
De Cerussa 227		Santalinum . . . ibid.	
Defensivum, v. De		Ungulæ Alcis Præparatio . . . 69	
Bolo 230		Unicornu Fossilis Præparatio . . 71	

ERRATA CORRIGENDA.

Pag. 25. <i>lin.</i> 26. Flos Terræ <i>adde</i> vel Solis.	doniorum <i>adde</i> Mororum.
Pag. 66. <i>l.</i> 7. <i>espressione lege expres-</i> <i>sione .</i>	Pag. 125. <i>lin. ult.</i> Seseleos <i>lege</i> Sefeli.
Pag. 67. <i>l.</i> 10. <i>clausæ lege clauso .</i>	Pag. 162. <i>l.</i> 16. <i>punctum adde post lit-</i> <i>teram F.</i>
Pag. 68. <i>l.</i> 7. <i>dele ac .</i>	Pag. 166. <i>l.</i> 3. Liquoris <i>lege</i> Liquor is.
Pag. 69. <i>l.</i> 3. albidinē <i>lege</i> albedinem.	Pag. 179. <i>l.</i> 16. & similiū <i>dele</i> , &c.
Pag. 81. <i>lin. penult.</i> Carminans <i>lege</i> Carminans.	Pag. 196. <i>l.</i> 18. <i>post calcina dele duo</i> <i>puncta; & seq. l. revolve lege</i> <i>revolvendo.</i>
Pag. 87. <i>l.</i> 14. Agimonix <i>lege</i> Agri- monix.	Pag. 197. <i>l.</i> 22. <i>detonuerit lege de-</i> <i>tonuerint.</i>
Pag. 104. <i>lin.</i> 4. de Berberis <i>lege</i> Berberum, & <i>lin. seq. post Cy-</i>	Pag. 229. <i>l.</i> 2. drachmas sex <i>lege</i> dra- chmæ sex .

